




Dr. Félix Rodríguez de la Fuente

CUADERNOS DE CAMPO
EL LINCE
Y EL GATO MONTES



Especie
Amenazada

EDITORIAL MARIN S.A.



GATO MONTES

Lince al acecho



*Cuaderno de Campo
del Dr. Félix Rodríguez de la Fuente*



EL LINCE Y EL GATO MONTES 1

LINCE
IBÉRICO



**EDITORIAL
MARIN, S.A.**

NO CIRCULAR DOÑANA Septiembre 77

donativo
017997-02 \$ 500.
990316.

Sumario

Notas de Campo	2
Aspecto del Lince	6
Equipado para la caza	8
La legendaria vista del Lince	10
Distribución ecológica	12
Distribución geográfica	14
Técnicas para detectar lince	16
Escala fón ecológico del Lince	18
Territorialidad	20
Alimentación	22
Técnicas de caza	24
El amor del Lince	26
Cubiles para la reproducción	28
Los cachorros	30
Cohesión familiar del Lince	32
Ciclo anual	34
El Lince, en peligro	36
Linces del mundo	38
El Lince Boreal	40
El Gato Montés	44
Características y distribución	46
Técnicas de caza y dieta	48
Reproducción y cachorros	50
Clasificación, nomenclatura	52

Lince apostado
dominante
paso de sus



Gamo
♀

590
Rod (rojo)
C.T.I.



Pres
huye con
Lince aferrado a su espalda

CUADERNOS DE CAMPO DEL DR. FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE

Idea y diseño de Editorial Marín, S.A.
Coordinación de Joaquín Araujo
Dirección de Félix Rodríguez de la Fuente

© EDITORIAL MARIN, S.A. 1978
Nicaragua, 85-95, Barcelona 29, Spain

ISBN 84-7102-500-0 la colección
ISBN 84-7102-501-9 El Lince y el Gato Montés
Impreso por Artes Gráficas Toledo, S.A.
Depósito Legal: To-678-1977
Distribuido por Marco Ibérica, Distribución de Ediciones, S.A.

Precio de este ejemplar: 100 Ptas.

NOTAS DE
CAMPO

do en lugar
a cacha el
grandes presas



lince se lanza
sobre la espalda
de la presa.



Presa
se detiene.
Lince muerde
en garganta



LINCE



Siempre me han inquietado hasta la desazón, las formas anatómicas o simples colores de los animales, a cuya presencia nose ha encontrado toda vía explicación. ¿De que sirven, por ejemplo, los recios penachos de las orejas de todos los

linceos vivientes? ¿Están al servicio al descomponer la forma "clásica" del pabellón auricular? ¿Cumplen funciones fanéricas, es decir, llamativas, en la comunicación intra-específica? Es posible que no sirvan para ninguna de estas funciones, o que

del mimetismo,



LINCE CARACAL

COLA DE
LINCE



sirvan solo parcial-
mente.

Observando en
plena estepa del

Amboseli a un lince
caracal, mientras el tórri-
do sol africano caía como
plomo sobre la acacia enana
que protegía al felino, pude
comprobar que, con rápidos,
y nerviosos movimientos de las
largas orejas, barría materialmen-
te toda la región de la nuca, los omó-
platos la cabeza y la faz, con los

largos y rígidos penachos que co-
ronan sus pabellones auricu-
lares, operación con la que
mantenia la faz y la parte su-
perior de su cuerpo libre de
moscas y mosquitos, al igual
que un Nu hacia en ese mo-
mento con su cola. ¿No
serán los penachos
auriculares de los lince un
eficaz aparato para despejar
de moscas y mosquitos el campo visual?

Recordemos que el lince tiene
la cola corta.

COLA DE NU

Aspecto del Lince

Gran gato, rechoncho, de cabeza pequeña. Orejas adornadas con largos *pinceles*. Patillas muy prolongadas. Cola corta con borla terminal negra. Colorido pardo amarillento, con profundas motas negras. Difícil de encontrar en campo abierto.

Lince

Lynx pardellus

Longitud total: 80 - 110 cm

Altura cruz: 50 - 70 cm

Peso: ♂ $\bar{X}$ = 20 kg

♀ $\bar{X}$ = 12 kg

Cola: 12 - 13 cm

Cabeza
pequeña



Penachos
auriculares

filas muy
prolongadas

Borla
negra

cola
corta

Muy
moteado

Las hembras son un 20% menores



Equipado para la caza

Los felinos, como animales muy evolucionados, están perfectamente dotados tanto para las más rápidas y audaces acciones de caza como para pasar inadvertidos. Los sentidos del Lince están muy desarrollados, a excepción del olfato.

Salto

Gran potencia muscular y elasticidad sorprendente

Gran potencia y elasticidad

Suelas plantares almohadilladas

Las suelas plantares del Lince, anchas y almohadilladas, le permiten caminar por sus dominios sin producir sonido alguno.

Cráneo

Fórmula dentaria:

$$I \frac{3}{3}; C \frac{1}{1}; PM \frac{2}{2}; M \frac{1}{1}$$

Mandíbulas cortas

Garras retráctiles

Las armas del Lince, como en todos los felinos permanecen enfundadas en cavidades especiales. Sólo aparecen y se despliegan cuando son necesarias.

Garras retráctiles

Penachos 7

Penachos



Descomponen la silueta y espantan a los mosquitos.

Vibrisas

Largos pelos a cada lado de la cara, muy sensibles, informan —sin necesidad de ver— de la presencia de los obstáculos que, durante la noche, ha de sobrepasar.



Vibrisas



Pelaje

Homocromático. Resulta prácticamente imposible descubrir a un Lince si permanece agazapado entre los matorrales.

Oído agudísimo

Oído

Agudo, capaz de captar los más mínimos sonidos.





Paloma

400 m



Corzo

500 m



Conejo

300 m



Ratón

75 m

La legendaria vista del Lince

Desde la antigüedad, el Lince ha sido depositario de leyendas que le relacionaban con poderes prácticamente sobrenaturales.


De hecho, debe su nombre a *Linceo*, personaje mitológico capaz de ver a través de los objetos. Aunque, evidentemente, la vista del Lince no traspasa la materia, sí es de una agudeza tal que distingue a grandes distancias sus posibles presas como demostró Lindeman, en sus famosos experimentos de campo y que representamos aquí esquemáticamente.



Bosque mediterráneo



Las especies vegetales más características del bioma ocupado por el Lince, lo son, a la vez, de nuestra península.



Bosque y matorral



Alcornoque

Distribución ecológica

El Lince mediterráneo o ibérico ocupa, actualmente, un único y exclusivo biotopo dentro de nuestra península: las impenetrables formaciones de matorral y bosque mediterráneo. Necesita, en efecto una gran cobertura vegetal para sobrevivir que hoy sólo encuentra en el maquis, las garrigas y las umbrías inalteradas de nuestras sierras centrales y andaluzas.



Lince mediterráneo



Encinar



Madroño


Retama

Distribución geográfica



Poco más de cien parejas de lince sobreviven, a duras penas, en nuestro país. Hasta hace pocos años se especulaba sobre su presencia en las sierras de Tortosa y Beceite y en algunos enclaves del Pirineo, pero hoy se descarta prácticamente su existencia fuera de las áreas marcadas en el mapa.

Unas 100 parejas
en la Península
Iberica



LINCE ibérico

L. l. balcanicus

Técnicas para detectar lince



LINCE



GATO
MONTÉS



GATO



Como todos los felinos el Lince precisa mantener en perfecto estado sus uñas. Ni muy largas ni muy cortas pero si afiladas, lo cual consigue arañando materiales blandos, como las cortezas de los árboles, donde quedan señales visibles.



cagarrotas

color
ambarino
característico

Fieles siempre a unos mismos puntos en los que depositan sus excrementos, seguramente no hay mejor indicio de la presencia de lince que localizar cagarruterios. Los excrementos son fácilmente reconocibles, sobre todo en los límites territoriales. A veces los entierran.

Estalagmita



La presa más común del Lince es el conejo, del que respetan su piel; suelen darle la vuelta, total o parcialmente, y enterrarla. En cualquier caso, es factible localizar estos restos en el campo, con lo cual tendremos un buen indicio de la presencia del felino.

*Restos de
piel de
conejo*



Estalagmita

Piedra de Lince

Muy buscada hasta tiempos modernos eran las pequeñas estalagmitas que se forman en los puntos —siempre los mismos— donde orinan los lince. Estas piedras de Lince se producen por las concrecciones que arrastra la urea de los felinos y se les atribúan poderes curativos y afrodisíacos.

Muy buscada

Escalafón ecológico del Lince

SUPERPREDADOR

Son muy pocos los animales de nuestra fauna capacitados para ocupar una posición de superpredadores dentro de las comunidades de vertebrados a las que pertenecen. Cazar, no sólo fitófagos de mediano y pequeño tamaño, sino también a otros carnívoros, es un papel reservado sólo a predadores muy organizados



Gineta



Arrendajo



conejo



como el Lobo o muy ágiles como el Lince y Águila. Nuestros grandes felinos manchados actúan, principalmente, sobre roedores y lagomorfos —liebres y conejos—, contribuyendo al equilibrio de las poblaciones de estos prolíficos animales. Pero como sienten especial aversión hacia zorros, vivérridos y otros mustélidos, los expulsan de sus territorios y, muchas veces, los matan, por lo que su papel como controladores de fauna dañina, si es muy abundante, resultaba francamente positivo.

Lince



Zorro



PREDADORES



Corzo

Lirón



Paloma


FITOFAGOS

BOSQUE Y MATORRAL
MEDITERRANEO



Territorialidad

Jesús Garzón estudió los territorios de los linces de una sierra central. Sobre 4.000 Ha., logró establecer los territorios de 12 linces: considera imprescindible, para el asentamiento de estos felinos, la existencia de abundantes refugios, abrevaderos, buenos cazaderos y mucha cobertura vegetal.






Combate territorial

Marcaje olfativo

Los lince pueden orinar mientras caminan, lo cual facilita la demarcación olfativa de sus territorios.


Los Lince son muy exclusivistas. Fuera de la época de celo viven siempre aislados y defienden territorios ampliados, de hasta 10 km², de los que expulsan, a veces tras feroces combates, a todos los individuos de su misma especie.

Orina hacia atrás.




Alimentación

Conejos,
liebres 87%



EXTREMADURA



590
Pod
Q
D1

||||| Conejos 60%

||||| Roedores 24%

Aves (palomas, perdices) 14%

Reptiles 2%

NO CIRCUNANTE

Técnicas de caza

El Lince, aunque merodea con frecuencia es, ante todo, un cazador al acecho. Su potencia muscular le faculta para grandes esfuerzos siempre que sean cortos; es prácticamente incapaz de realizar largas persecuciones. Su técnica principal es batir su territorio de caza hasta localizar a su presa y para ello se detiene con asiduidad. Si se trata de un



1/Camina



2/Escucha y
localiza



3/Acecha




salta

lugar conocido, se dirige a él directamente y a favor de su mimetismo, acecha al borde de los lugares frecuentado por sus presas. En ocasiones, si las víctimas no se ponen a su alcance, inicia sigilosas maniobras de aproximación. Cuando se acorta la distancia, emprende una corta y velocísima carrera que termina en un espectacular salto. Los conejos y piezas medianas mueren, tras ser atrapados por las retráctiles garras, de un fuerte mordisco que les troncha la columna cervical.

5/Mata





Testarazos típicos de cortejo
nupcial




Olisqueo: reconocimiento
olfativo de la receptibilidad

Juegos amorosos
muy ritualizados


El amor del Lince

Únicamente durante el celo, interrumpen su vida de solitarios. Los juegos amorosos de la pareja resultan altamente ritualizados, por la necesaria inhibición de la agresividad. Se producen, entonces, continuas llamadas del macho, con sus roncos maullidos. Es éste, también, el que incita a su compañera a largos correteos y persecuciones e, incluso, a expediciones conjuntas de caza. Una de las pautas más comunes del cortejo nupcial —y luego del reconocimiento entre madre y cachorros— son los *testarazos*, que ambos sexos se propinan con la cabeza ligeramente agachada. También se producen reconocimientos olfativos en los que la hembra levanta la grupa y mueve la cola. La cópula suele producirse mientras el macho muerde la nuca de la hembra.



Hembra se tiende.
Macho muerde
nuca para la cópula


Cubiles para la reproducción



Las guaridas de los lince pueden ubicarse en distintos sustratos. Los grandes *canchales* con mil vericuetos ofrecen excelente refugio, así como las marañas vegetales de zarzas, madroños y brezos. Grandes árboles huecos, tanto caídos como todavía en pie, pueden constituir un excelente refugio para las camadas de Lince.


*Marañas de
vegetales de
zarzas, madroños
y brezos*

Corte de un
viejo árbol
caído



Se han citado cubiles de Lince en
viejos y grandes nidos abandonados
de rapaces o cigueñas.

Corte de una
oquedad
rocosa



Cachorro de 1/2 mes

Dependen de la madre

Ojos
abiertos
a los 8/10
días



Madurez

sexual
altera el
ritmo del
crecimiento

♂♂

♀♀




Juegos a partir
de los 2 meses

Los cachorros

Durante los dos primeros meses son pardos, muy claros. *Patillas* y *pinces* poco desarrollados.

A partir de los 5 meses son muy moteados. Sólo los adultos presentan los largos penachos y barbas.



Cachorro de 4 meses



Hembra avanza seguida
por cachorro



Cohesión familiar del Lince

Los linces se mueven en un mundo cerrado, impenetrable.

Mantener el contacto entre los grupos familiares, cuando se desplazan, resulta imprescindible; pero como no interesa que sea manifiesto, se descarta la posibilidad de hacerlo mediante sonidos, como hacen la mayoría de las aves. Se impone, pues, un medio visual, ya que el olfato de los linces

Orejas
y cola
gachas




Orejas enhiestas,
Manchas blancas
visibles desde
atrás

es pobre. Seguramente por esto tienen, en el envés de sus orejas, una llamativa mancha blanca enmarcada por negro y la punta terminal de la cola resulta igualmente negra, se consigue así que los que marchan detrás –los cachorros– siempre puedan visualizar las conspicuas orejas y rabo de su madre. La mejor demostración de lo llamativos que resultan estos apéndices es que los abaten en cuanto divisan una posible presa.

El año del Lince

- Partos normales: Marzo/Abril
- Pueden adelantarse a Enero y retrasarse a Junio
- Normalmente: 1 a 4 cachorros
Excepcionalmente: 5 cachorros
Más frecuente: 2 cachorros
- Grupos de madre y cachorros hasta Noviembre
- En el sur de España, todo el ciclo se adelanta un mes.




■ Celo

■ Gestación 65/72 días





longevidad
10/15 años



Partos

 Lactancia 3/4 semanas

El Lince en peligro



AGUILA

Ataca principalmente
sobre los cachorros



LINCE

Los cepos de conejos son,
actualmente, los peores enemi-
gos del Lince. No obstante,
si los ejemplares atrapados
son liberados, sobreviven en
su mayor parte.



LOPO


El Lince cuenta con muy pocos enemigos naturales. Son episódicos los casos de cachorros o adultos que han sucumbido bajo las mandíbulas de los lobos o las garras de las águilas. Pero se encuentra al borde del exterminio por la acción de muchos elementos, entre los cuales destacan la excesiva e irracional utilización de venenos y la progresiva reducción de sus biotopos naturales que van siendo sustituidos por repoblaciones artificiales.




CARABOR

BULLDOZER

Destruye los
habitats naturales



CEPO



MIXOMATOSIS



VENENO



Linces del mundo



- Pen.
Ibérica -

Lince Ibérico
Lynx pardellus

- Africa -



Lince Caracal

Lynx caracal

Largo total: 55/75 cm

Cola: 22/33 cm

Altura cruz: 40/45 cm

Bobcat

Lynx rufus

Largo total: 65/95 cm

Cola: 13/19 cm

Altura cruz: 50/60 cm

- Estados
Unidos -

RARAS
EUROPEAS

- Europa -

Lince Boreal

Lynx lynx

(ver páginas
siguientes)



Leonado, mucho más esbelto.
que el resto de los lince.
Cabeza proporcionalmente
menos pequeña. Orejas muy
grandes. Sin patillas.

RAZA AFRICANA



Muy semejante al Lince
Ibérico, pero de tonalidad
algo más rojiza, y más
compacto. Cola corta
pero algo mayor.

RAZAS AMERICANAS

Lince Canadiense

Lynx canadensis

Más grisáceo y grande
que el rojo (Bobcat).
Medidas casi idénticas
que el Lince Boreal.
- Canadá -



El Lince Boreal



Lince Boreal

Lynx lynx

Largo total:	100/130 cm
Altura cruz:	60 cm
Peso:	45 kg
N.º cachorros:	1 a 4
Gestación:	66/74 días

Apariencia de gran gato, desgarbado, de altas piernas y cabeza pequeña. Llamativas orejas, terminadas en *pinceles*. Papada que se alarga en *barba*. Tonos leonados. Pelo largo en invierno, con punteaduras sólo en partes inferiores y no por todo el cuerpo, como en nuestro Lince ibérico.

- Madurez sexual
♂ 33 meses
♀ 21 meses

- Se independizan
al cabo de 1 año


- Se difencian tres
subespecies en
Europa:

L.l. *lynx*: del N. de

L.l. *carpathicus*: de

L.l. *balcanicus*: de los




Distribución geográfica



Europa
los Cárpatos
Balcanes

La subespecie de
los Cárpatos mantiene
territorios de 2.000 Ha.

LINCE BOREAL
Lynx lynx



Existe una relación directa entre la abundancia de liebres árticas y la de lince. El éxito de la reproducción de los felinos guarda tan estrecha relación con la disponibilidad de *lagomorfos* que, los años en que no abundan las liebres, ningún joven Lince llega a sobrevivir.



Liebre ártica

Las técnicas de caza del Lince Europeo no difieren esencialmente de las del Ibérico. Su mayor porte, le potencia para la captura de presas mucho mayores. Renos, corzos y ciervos se incorporan a su dieta. Frecuenta las zonas encharcadas para atrapar a patos y gansos.



Reno joven

La nieve facilita la caza



Cola más gruesa

Punta terminal
más abultada

Cola barreada
en negro

MAS
CORPULENTO

El Gato Montés

Mayor corpulencia que el gato doméstico. Principal diferencia en la cola, que resulta, en el Montés, mucho más gruesa y aparece barreada de negro con la punta terminal abultada e igualmente coloreada.

Dan la sensación de tener más pelo porque resulta siempre más largo que en las razas domésticas.

Gato Montés *Felis silvestris*

Largo total: 100/105 cm
Altura cruz: 35/40 cm
Cola: 34/38 cm
Peso: 6/9 kg

Gato casero



↗
Felis
catus



Hasta hace poco tiempo se especulaba sobre la ascendencia genética de los gatos domésticos. Se les suponía descendientes del Gato de Libia. Hoy tanto este gato, como los monteses y los domésticos están considerados como razas de una sola especie: *Felis catus*. Los cruces y mestizajes entre estos gatos son posibles así como la domesticación de los monteses o el asilvestramiento de los domésticos, fenómeno, este último, cada vez más frecuente.

Gato cimarrón

Gato de
Libia
Felis lybica




Características

Lince

Cráneo

Mayor capacidad craneana los gatos monteses



Pupilas
revelan
costumbres
nocturnas

Fórmula dentaria:

$$I \frac{3-3}{3-3}, C \frac{1-1}{1-1}; PM \frac{3-3}{2-2}; M \frac{1-1}{1-1} = 30$$

Distribución ecológica

Bioma
preferido: bosque
caducifolio
También
presente



en otros bosques
y hasta en la
estepa

Bosque de coníferas



Bosque caducifolio



Bosque mediterráneo



Estepa



GATO
MONTÉS




GATO

HUELLAS

Cubiles inaccesibles, generalmente al final de largas galerías en marañas, roquedos o árboles.

CUBILES




Presente en la mayor
parte del continente
y en muchas islas




Técnicas de caza y dieta

ESPAÑA




Roedores




Conejos




Aves



CENTROEUROPA



Insectívoros y mamíferos



Liebres



Aves



Roedores




Roedores



El Gato Montés caza siempre al acecho o tras ligeras aproximaciones a sus presas.


Las aves de mediano tamaño exigen un mayor esfuerzo pues suelen quedar fuera del alcance de este predador de actividad nocturna.

A sus presas más comunes —los ratones y topillos— suele aguardarlas cerca de sus cubiles.




Reproducción y cachorros

- Son las hembras las que eligen compañero
- Maullidos muy potentes anuncian el celo
- Las hembras tienen 3/4 pares de mamas



- En general cuatro crías del mismo sexo
- Peso al nac
- Período de lactancia corto

1er periodo de celo



2.º periodo de celo



Celo



Gestación 63/68 días



Abren los ojos a los
10 días



Cachorro
de tres
semanas


en 120g
depen-



El año del Gato Montés

Grupos aislados de cachorros

Independencia



2.^a gestación 2.^a lactancia

Lactancia 4 semanas aprox.



Cachorros

CLASIFICACION Y NOMENCLATURA

FAMILIA	GENERO	ESPECIE	CASTELLANO	CATALAN	GALLEGO	VASCUENO
FÉLIDOS	Lynx	<i>L. canadensis</i>	Lince del Canadá			
		<i>L. lynx</i>	Lince Europeo			
			Lince	Linx	Lobo Cerval	Lakoin
			Lobo Cerval	Llop Cerver	Lobo Rabaz	Katamota
		<i>L. pardellus</i>	Gato Clavo Gato Manchado Gatón Gato Lobo	Gat Cerval	Gato Cravo	Lintze
		<i>L. rufus</i>	Lince Rojo Bobcat			
		<i>L. caracal</i>	Lince Caracal			
	Felis	<i>F. lybica</i>	Gato Salvaje Africano			
		<i>F. sylvestris</i>	Gato Montés Gato Silvestre Gato Cimarrón Gato Bravo	Gat Salvatge Gat Silvestre	Gato fero Gato bravo Monteiro	Basa-katu Katu-manu
		<i>F. catus</i>	Gato	Gat	Gato	Katu

FUENTES: Sociedad Española de Ornitología, Societat Catalana d'Història Natural, Angel Cabrera, J. Maluquer i Sostres, Sociedad Galega d'Historia Natural, Grupo de Ciencias Aranzadi, datos del autor y comunicaciones privadas.

Queridos amigos:

Os invito a que, desde ahora, unáis vuestras experiencias de campo a las mías, para mejorar esta información sobre los nombres populares de nuestros animales en sucesivas ediciones de esta **Colección de Cuadernos de Campo**. Escribidme a Editorial Marín, S.A., Departamento de Cuadernos de Campo, calle Nicaragua 85, Barcelona-29 y así, colaborando en darlos a conocer, contribuiremos a proteger su futuro.

Félix Rodríguez de la Fuente

NO CIRCULANTE

Cuadernos de Campo del Dr. Félix Rodríguez de la Fuente

Por fin lo que usted aún no conocía del *Dr. Rodríguez de la Fuente*. Más de 30 años captando los momentos más fascinantes de la vida de los animales en plena naturaleza con *anotaciones personales y únicas*.

Con la Colección **Cuadernos de Campo** la Naturaleza queda al descubierto. Por ello son elemento indispensable en el equipo del excursionista, del aficionado, y en general de todos aquellos, niños y mayores, que tienen curiosidad por saber qué pueden ver cuando pasean por el campo y por conocer los secretos de la vida de los animales.

Cada miércoles en su quiosco o librería

Próximos títulos:

- 2 - Grandes Aguilas
- 3 - El Lobo
- 4 - Rapaces Nocturnas
- 5 - El Jabalí
- 6 - Pájaros Carpinteros

Reserve su ejemplar



EDITORIAL MARIN S.A.