



Dr. Félix Rodríguez de la Fuente

CUADERNOS DE CAMPO

LOS CORVIDOS



EDITORIAL MARIN S.A.



cuervo ataca a Aguila Real en
inmediaciones de su nido.

Cerca de Aljímia (Valencia)

Marzo 1974

Pareja de Cornejas comen
de perro muerto
ca. Antela (orense)


Junio 1965



Cuaderno de Campo
del Dr. Félix Rodríguez de la Fuente

LOS CÓRVIDOS

17



Corneja cenicienta
mismo tamaño
que Corneja
Negra, a la que susti-
tuye ecológicamente
en el Este y Norte
de Europa →

Grajilla prospecta
suelos blandos a la
busca de inver-
tebrados.



EDITORIAL
MARÍN, S.A.



donatelo

Sumario

018013-02 6500
990316

Notas de Campo	2
Aspecto y dimensiones	6
El equipo de los córvidos	12
Distribución ecológica	14
Distribución geográfica	16
Técnica para detectar córvidos	18
Escalafón ecológico de los córvidos	20
Territorios	22
Alimentación	24
Técnicas de caza	26
Técnicas defensivas	30
Paradas nupciales	32
Calendario de la reproducción	36
Nidos	38
Huevos	42
Pollos	44
El gregarismo en los córvidos	46
Córvidos del mundo	48
Cuadro comparativo	50
Clasificación y nomenclatura	52



cuervo



Corneja




Grajilla

CUADERNOS DE CAMPO DEL DR. FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE

Idea y diseño de Editorial Marín, S. A.
Ilustración color CARLOS SALOM/J. M. VARELA
Dibujos negro Juan Manuel Varela
Coordinación Joaquín Araujo
Dirección Félix Rodríguez de la Fuente
© EDITORIAL MARIN, S. A. 1978
Nicaragua, 85-95, Barcelona-29, Spain
ISBN 84-7102-500-0 la Colección
ISBN 84-7102-517-5 Los Córvidos
Impreso por Artes Gráficas Toledo, S. A.
Depósito Legal: To- 220 -1978
Distribuido por Marco Ibérica, D. de E., S. A.
Precio: 100 Ptas.

590
Rod
C
7.17



NOTAS DE CAMPO



Banda de de Grajas
campeando

Villalpando (Zamora)

Febrero 1971

Utracas en carroña

Valverde del Camino
(Huelva)

Enero 1970





Desparasitación: Doñana
Noviembre 1975

Urraca come ciruela
Andújar (Jaén)
Sep. 1975



Los córvidos, como
el hombre mismo,
son animales de con-
ducta "exploradora".

Tal comportamiento
capacita a estas aves para
aprovechar una gran variedad
de recursos alimentarios.



Cuervo come
huevos de
perdiz.
Montejo de la
Vega (Segovia)
Junio 1974

Parasitismo:
Urraca alosa a
Gavilán con
presa

Barbatona
Diciembre
1974



Depredación: Urraca
ataca pollo de Perdi z
Común

Quintos de Mora
(Toledo) Mayo 1976

Urraca estrangula
ratón de campo
Pleguina

Enero 1977



Aspecto y dimensiones

Arrendajo Común

Garrulus glandarius

Altura:	23 cm
Peso:	150-200 gr
Ala:	17-19 cm
Envergadura:	53 cm
Pico:	2,5-5,0 cm
Tarso:	3,5-4,5 cm
Cola:	13-15 cm

Iris azul
claro

Bigotera

Cresta eréctil
(excitación)

Coberturas
alares muy
llamativas
(función fanerica)

Pardo violáceo. Muy llamativas las coberturas alares, barreadas de azul y negro. Mancha alar blanca, así como el obispillo que contrasta con la negra cola. Bigotera ancha y negra. Píleo listado de negro, a menudo eréctil.

Arrendajo Funesto

Algo más pequeño que el Arrendajo Común. Pardo agrisado con tonos, rojizos en alas y cola, que resulta bastante larga. En otoño e invierno, muy sonoro y llamativo.

Librea
poco llamativa



Rabilargo

Cyanopica cyanus

Altura:	33	cm
Peso:	70-75	gr
Ala:	13	cm
Envergadura:	35	cm
Pico:	2	cm
Tarso:	3,5	cm
Cola:	19	cm

El más pequeño de los córvidos europeos. Característicos tonos grisáceos en el dorso. Alas azuladas como su larguísima cola. Vientre blancuzco. Capirote negro muy visible.



Urraca

Pica pica

Altura:	42	cm
Peso:	200-220	gr
Ala:	17-20	cm
Envergadura:	48-53	cm
Pico:	2-3	cm
Tarso:	4,5-5,5	cm
Cola:	20-26	cm

Las irisaciones varían en función de la dirección de la luz

Llamativa y fácil de reconocer por la combinación de blancos y negros. Cola muy larga con irisaciones tornasoladas; vientre blanco, así como los hombros y la punta de las remiges.



Cascanueces

Nucifraga caryocatactes

Altura:	30-34	cm
Peso:	150-200	gr
Ala:	17-19,5	cm
Envergadura:	53	cm
Pico:	4-5	cm
Tarso:	4-5	cm
Cola:	11,5-13,5	cm

Marrón oscuro con profusas manchas blancas.

Infracobertoras caudales muy llamativas, de color blanco.

Alas oscuras y cola negra.



Chova Piquigualda

Pyrrhocorax graculus

Altura:	37-38	cm
Peso:	200	gr
Ala:	25-29	cm
Envergadura:	75-80	cm
Pico:	2,5-3,5	cm
Tarso:	4-5	cm
Cola:	15-17	cm

Grácil y elegante córvido, totalmente negro, a excepción de su pico amarillo y sus patas rojas. Silueta de remiges muy digitadas.

Pico largo, curvo,
de tono
escarlata



Patas
rojas →

Chova Piquirroja *Pyrrhocorax pyrrhocorax*

Altura:	35-38	cm
Peso:	♀ 290	gr
	♂ 350	gr
Ala:	24-30	cm
Envergadura:	75-80	cm
Pico:	4,5-5,5	cm
Tarso:	5-6	cm
Cola:	13-15	cm

Negro lustroso;
plumaje muy
compacto

Negro lustroso uniforme.
Sólo destacan pico y patas rojas.
A veces algo decolorado, el pico
toma tintes naranjas y puede
confundirse con la
Chova Piquigualda, aunque el pico
resulta más largo.
Vuelo con grandes inflexiones.

Pecho, nuca
y mejillas
cenicientas



Ojo azul claro

Grajilla *Corvus monedula*

Altura:	30-32	cm
Peso:	220-250	gr
Ala:	22-25	cm
Envergadura:	67	cm
Pico:	2,6	cm
Tarso:	4,2-4,7	cm
Cola:	12,6-14,0	cm

Muy gregaria, común en todos los
campos. Negro mate uniforme,
pero con nuca y mejillas grises.
Partes ventrales, gris oscuro.
Pico corto.

Base del pico y región
gular

desnudas



Gruja

Corvus frugilegus

Altura:	43-45	cm
Peso:	380-600	gr
Ala:	29,6-33,0	cm
Envergadura:	90	cm
Pico:	3,5-4,9	cm
Tarso:	5,3-5,8	cm
Cola:	15,0-17,5	cm



Corneja Negra

Corvus corone corone

Altura:	45-46	cm
Peso:	450-550	gr
Ala:	30,5-31,0	cm
Envergadura:	92-100	cm
Pico:	3,4-4,2	cm
Tarso:	5,5-6,4	cm
Cola:	17,5-19,0	cm

Uniformemente negra, con un pico fuerte y ancho. Más lenta y pesada que las Grujas. Cola cuadrada.

Corneja Cenicienta

Corvus corone cornix

Altura:	45 cm
Peso:	485 gr
Ala:	33 cm
Envergadura:	100 cm
Pico:	3,7 cm
Tarso:	5,0 cm
Cola:	17,8 cm

De tamaño y actitudes prácticamente idénticas a la Corneja Negra. Se diferencia fácilmente por sus partes dorsales y ventrales de color gris claro, que destacan sobre la cabeza y alas negras.



Pico /
muy
robusto
Barba /
marcada

Cuervo

Corvus corax

Altura:	51-63 cm
Peso:	1000-1400gr
Ala:	38,0-43,6 cm
Envergadura:	117-136 cm
Pico:	7-8 cm
Tarso:	6,4-7,3 cm
Cola:	21-25 cm

Patas
fuertes
→



El más grande de los córvidos y por consiguiente de los pájaros. Uniformemente negro, con cabeza

masiva y pico muy grande y compacto. A veces parece tener una especie de barba.

El equipo de los córvidos



CHOVA
PIQUIREDOJA



CUERVO



URRACA



CORNEJA



CASCANUECES

fuerza y aguzado
para apalancar
las piñas



GRAJA


Bando de Grajillas,
al atardecer,
en vieja torre

EL NEGRO EN LA NATURALEZA

Este cumple un papel
muy señalado en la vida
de los córvidos. En el
cielo son muy visibles,
pero entre la vegetación
prácticamente desaparecen. Doble función,
imprescindible para
todos los animales:

marcar su presen-
cia entre sus conge-
neres y disimularla
ante sus posibles ene-
migos.





Los córvidos de cola larga, se sirven de sus movimientos para la comunicación intraespecífica. Refuerzan esta misión sus colores llamativos

Maniobrabilidad

La cola de todas las aves funciona como un auténtico timón. Su longitud relativa puede darnos una idea de la capacidad de maniobra.

La Urraca y el Rabilargo son los córvidos más hábiles para los giros bruscos, sortear obstáculos y, en definitiva, para escapar a sus perseguidores.

Cráneo

El cráneo de los córvidos, fuerte, compacto y de gran capacidad, revela su alto desarrollo psíquico y la potencia de su pico omnívoro.

Narinas protegidas por mechón de plumas filiformes

Pata

Las patas de los córvidos conservan las características de todos los Paseriformes.

La Urraca, como todos los córvidos, está dotada de pico fuerte, ligeramente curvado en la punta y bordes cortantes, que cumple un amplísimo abanico de funciones. Las garras de los córvidos son prensoras y dotadas de uñas curvas y agudas.





Chova Piquigualda
Sólo el nivel
supramontano de
las grandes
cordilleras.



Arrendajo Funesto
Bosque de conífera
de las altas
latitudes
europeas.

Chova Piquirroja
Roquederos en
niveles medios
Frecuenta
praderías.



Graja
Bosques y sotos
de latitudes
medias siempre
con grandes
espacios abiertos
cercanos.




Cascanueces
Pinares y bosques
caducifolios en
latitudes de
Europa Central
y Septentrional.



Rabilargo
Sólo en bosques
mediterráneos
y de coníferas
en latitudes
medias de Iberia.



Montaña



Bosque de coníferas



Bosque caducifolio



Distribución ecológica



Cuervo

Zonas montañosas, mediterráneo
Frecuenta bosques cercanos a
aclarados o
manchas de
matorral



Cenicienta

Como la
Corneja Negra
en el Este de
Europa.
Penetra también
en bosques de
coníferas.

Urraca

Zonas muy
degradadas
e incluso
desarboladas.

Le bastan algunos
matorrales

aislados o árboles
dispersos. También
en los otros
tipos de bosque.



Arrendajo Común

Todo tipo de
formaciones
arbóreas en
especial los de
hoja caduca.



Corneja Negra
Arbolado disperso
o denso si cuenta
con grandes
claros y zonas
cultivadas.



Grajilla

Muy dúctil.
Presente en todo
tipo de biomas.
con preferencia en

terrenos abiertos.
Ha colonizado
incluso el interior
de las ciudades.

Bosque mediterráneo



Estepa



Ríos, lagos
y marismas



Costa



Distribución

Arrendajo
Funesto




Arrendajo
Común



Rabilargo




Urraca



Cascañueces



Chova
Piquigualda




-  Chova Piquigualda
-  Rabilargo
-  Graja




geográfica



Cuervo



Corneja
Ceticienta




Corneja Negra




Chova
Piquirroja




Grajilla



Graja



Técnicas para detectar Córvidos



Cornejas en
carroña de
perro

Perro
muerto

Restos comida


Un perro muerto es devorado siempre parcialmente por los córvidos.

Carroña

El hallazgo de una carroña en el campo corresponde siempre a los córvidos, quienes por su abundancia y constante prospección, batan todo su territorio con gran periodicidad.

En los animales muertos puede «leerse» la presencia de córvidos porque sólo comen las partes blandas. A la carroña le faltarán los ojos y será abierto siempre por el ano.

Cornejas en carroña
de perro, comen ojos y
partes blandas



← 4-5 cm →

Huellas

Las huellas de sus patas pueden encontrarse en la nieve, en los limos y en las orillas arenosas de los ríos.



Huella de Cuervo

Plumas.

Las plumas, de las que las aves se desprenden al renovarlas, proporcionan una inequívoca fuente de información sobre su presencia. (Datos de épocas de muda en pág. 36.)

← Las egagrópias de los córvidos, más pequeñas que las de las rapaces, contienen con frecuencia restos vegetales, en ocasiones exclusivamente.



Últimos pasos

Señales dejadas al despegar en suelo blando o nieve.

Voces

Todos los córvidos, como sociables que son, emiten señales acústicas con gran frecuencia. Algunas especies como el Cuervo, la Corneja y el Rabilargo pueden ser consideradas como las más «parlanchinas» de nuestra avifauna y son capaces de modular hasta una veintena de sonidos diferentes.

Escalafón ecológico

La clave del éxito evolutivo de los córvidos reside, seguramente, en su posición ecológica dentro de las comunidades a las que pertenecen. Ninguna familia de aves cuenta con tantos miembros, que no sólo mantienen sus efectivos sino que incluso progresan y se expanden hacia nuevas áreas, como estos passeriformes. El omnivorismo

—es decir, la falta de especializaciones alimentarias— ha permitido que Urraca, Corneja, Grajilla y Rabilargo gocen, en la actualidad, de uno de los estatus más favorables de toda la avifauna continental. La Chova Piquirroja, como especialista insectívoro, sin embargo, parece disminuir en todas las comarcas.

LOS OMNÍVOROS



CORNEJA



CUERVO



Frutos



Insectos



Micro-mamíferos



Carroña



Huevos



Polluelos

Estepa


de los córvidos

EL ESPECIALISTA



CHOVA
PIQUIRROJA

Come todo tipo de invertebrados
rupestres entre los que destacan
insectos, arácnidos, anélidos y moluscos





Territorios

Muy locuaces, los córvidos son, tal vez, las aves más sonoras de nuestra avifauna. La Corneja adopta esta postura cuando emite su llamada.

La Corneja y la Urraca mantienen territorios de una gran elasticidad, pues, si bien son aves gregarias en muchas de sus manifestaciones, siempre conservan feudos bien delimitados a la hora de criar.

Los plumajes negros y lustrosos de los córvidos emiten perfectamente los reflejos del sol. Sus señales luminosas pueden ser visibles a gran distancia, proporcionando así una clara información a sus congéneres.

Las flexiones del cuerpo y los movimientos de la cola y las alas originan destellos en el plumaje de córvidos negros, que les hacen muy visibles en sus territorios y completan la información acústica.


Manchas
fenélicas
(llamativas)



Grajas, grajillas, chovas y rabilargos pueden ser consideradas aves coloniales. De todas ellas, el Rabilargo es la que cría menos agrupadamente, aunque sus nidos pueden estar en árboles contiguos y llegar a densidades de 10-12 pares por hectárea.

La colonia de Grajas deja en invierno los nidos abandonados que aparecen muy próximos entre sí.



590
Rod
C.T.17



INSULANTE

Alimentación

CORNEJA




- Basuras - Aves y huevos



Arañas
Larvas de todo tipo de insectos



CHOVA PIQUIRROJA




Técnicas de caza

Adaptables

La gran adaptabilidad de los córvidos se plasma, sobre todo, en sus recursos para sobrevivir. El Rabilargo, por ejemplo, sin ser especialista en nada, puede actuar como otros que sí lo son: puede atrapar insectos en vuelo como los papamoscas y mosquiteros; pica

sobre grandes coleópteros como alcaudones y cernícalos; come fruta como cualquier frugívoro; carroña como los necrófagos y aprovecha además los desperdicios abandonados por los hombres.



El omnivorismo impone técnicas de caza distintas



↑
Atrapa insectos
al vuelo
(hormiga alada)

↙ Pica sobre
coleóptero





CORVIDOS OPORTUNISTAS

La mayoría de los córvidos son oportunistas en su alimentación. Actúan como insectívoros, frugívoros, depredadores, carroñeros, desparasitadores, parásitos o ladrones de nidos, en función de las oportunidades que se les presentan. Para explotar tantos recursos cuentan con picos y garras muy poco especializados pero robustos.



Cuervo come
huevo de perdiz



Grajilla

La Grajilla, bastante insectívora, puede levantar piedras como los limícolas "vuelve piedras" para alimentarse con los animalillos que cobijan.

CÓRVIDO ESPECIALIZADO


La Chova Piquirroja, que es uno de los pocos córvidos de alimentación relativamente especializada, posee pico



¿adecuado para extraer invertebrados de las más variadas cavidades rupestres. Sin embargo, tan sofisticado instrumento, no le permite acceder a la variedad de fuentes de alimentos que exploran sus parientes oportunistas.



Chova
Piquirroja



CORNEJA

Las cornejas lanzan la alarma en cuanto divisan a una rapaz; en muchas ocasiones, son el mejor auxiliar del naturalista para detectar la presencia de los cazadores alados. Si sorprenden, por ejemplo, a un Azor con una presa, no dejarán de hostigarle, a veces a muy corta distancia, hasta que abandone el campo.

Técnicas

La defensa cooperativa, que es común a todos los córvidos, llega en las Cornejas a grados de sublimación. Hemos visto machos sacrificados por sal-



Aguila

Cuervo

Los grandes cuervos se enzarzan frecuentemente en espectaculares combates aéreos con las rapaces. La acción coordinada de la pareja de pájaros consigue, generalmente, su objetivo, es decir, alejar al peligroso merodeador. Prácticamente todos los córvidos son capaces de enfrentarse a las aves de presa, tanto diurnas como nocturnas.

defensivas

var del Halcón a su
pareja o hembras
capturadas por el
Azor cuando
trataban de
defender
a sus crías.

Ardilla



Rabilargo

La Ardilla saquea con cierta frecuencia los nidos de las aves. Los rabilargos de una colonia atacan ininterrumpidamente a estos roedores en cuanto se aproximan a sus nidos. En la defensa pueden participar todos los componentes del grupo colonial.



Cuervo

«FLOCKING»


El llamado efecto defensivo de *flock*, es decir, la agrupación de un número elevado de individuos con intención de oponer la masa del bando a la acción de los predadores, resulta una de las tácticas defensivas más utilizadas por los córvidos.

Paradas nupciales

♂



♂



↑ Parroteo nupcial con
cola abierta y alas
semiplegadas



Alas semiabiertas

Los etólogos han encontrado en los córvidos algunas de las manifestaciones más elaboradas de la conducta animal. Los cortejos de los cuervos, por ejemplo, están adornados de numerosas pautas, algunas de las cuales, por su tremenda delicadeza, podrían ser comparadas a las humanas. Desglosamos aquí los momentos más llamativos de las paradas nupciales del gran Cuervo.

Postura
gallarda, con
cuernecillo
marcado



Se agacha
receptiva



Paroxismo
nupcial


ojo cerrado



Barba
erizada



Gran parte del ceremonial de las Grajas tiene lugar en los nidos o sus alrededores



♀ demanda comida en actitud infantil: flexiona patas, entre abre alas y emite

El macho de Graja transporta las presas hasta las proximidades del nido, como regalo de bodas. La hembra las recibe con una actitud infantil, es decir, como la de los pollos al ser cebados: abre, trémula, las alas, se agacha y pía lastimeramente.


GRATAS

♂ responde a solicitud de ♀ e introduce comida en supico



URRACA


llamadas agudas



Una de las pautas más repetidas por los ♂ de Urraca, durante sus ceremonias nupciales, es su exhibición de flancos.



Cuadro cronológico del ciclo



de la reproducción

Agt.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
------	------	------	------	------

- Celo y constr. nido
- Incubación
- Pollos en nido
- Muda



Arrendajo

Urraca


Cascanueces

Chova Piquirroja

Graja


Cuervo

Rabilargo



CORTADOS
ROCOSOS

Grajilla
Chova Piquirroja
Chova Piquigualda
Cuervo



Grajilla

Nidos

Prácticamente todos los emplazamientos pueden ser buenos para los nidos de los córvidos. A la hora de buscar morada estas aves se muestran tan dúctiles como cuando se trata de alimentarse o defenderse

GRAJILLA →



Urraca
Arrendajo
Rabilargo

MATORRAL

AGUJERO
ARBOL



ARBOLES

Cascanueces

Utraca

Graja

Corneja y Corneja Canicuenta

Rabilargo

Arrendajo

Arrendajo

Fuwesto

CASAS -
EDIFICIOS

Grajilla

Chova

Piquirroja

(raro)




NIDOS

Consumados arquitectos, los córvidos construyen los más acabados nidos de nuestra avifauna.

Cuervo, Grajilla, Urraca y Arrendajo pueden utilizar, en ocasiones, el barro.

La estructura externa se compone de sólidos y bien entramados palitroques, a veces de gran tamaño. El fondo o capa interna del nido, suele contener gran profusión de materiales aislantes, como vegetación seca, lanas o crines. La habilidad para camuflar tan voluminosas construcciones suele ser asombrosa.

Nido de →
Urraca con
techumbre



Nido de
cuervo



Nido de
Graja en
árbol



Muchos de
los nidos de
los córvidos
son utilizados posteriormente por
las rapaces.

Aparte de proporcionar cobijo y termoregulación a los polluelos, los nidos de córvido parecen concebidos para dificultar el robo de huevos o de crías: las Grajillas taponan materialmente las grietas del roquedo. Las Urracas rodean el cuenco del nido de una verdadera barrera espinosa. Los rebilargos, de nidos menos sofisticados, confían a la defensa comunal la seguridad de sus colonias, al igual que las Grajas.

DATOS DE UNA COLONIA DE RABILARGO

Altitud 1250 m

(según J. Araujo)

a/ Nidos ocupados observados = 61 nidos - 100%

b/ Situación general

(Preferente: Pino Negral)

Pino Negral 46%
Castaño 10%
Nogal 9%
Robinia 9%
Castaño de India 6%
Otros 20%

c/ Ubicación

Primera rama: 33%

Horquilla: ... 25%

Resto: 42% (preferente: 1ª rama)

d/ Orientación (Sobre 44 nidos)

Mirando al { NE: 9
(Preferente: Este) { E: 10 total 61%
SE: 8

Otras orientaciones: 17

e/ Disposición:

Pegados al tronco: 49%

Alejados hasta 1 m: 30% (Preferente: pegados)
Más alejados: 21% al tronco

f/ Altura

Desde el suelo

Extremo superior: 18 m

Promedio (55 nidos): 6,6 m

Extremo inferior: 2,5 m

h/ Dimensiones

D = 170 mm

d = 90 mm

h = 56 mm

g/ Densidad

1 nido cada 500 m²

Naves del Marqués
1969/1974 (Avila)



Huevos

Arrendajo Comun

Garrulus glandarius

Número normal: 5 / 7
extremo: 3 / 10

Tamaño: 31,5 × 22,5 mm

Incubación: ♂ ♀ 16 / 17 días

Pollos en nido: 20 días



Arrendajo Funesto


Perisoreus infaustus

Número normal: 4
extremo: 3 / 5

Tamaño: 29,5 × 21,5 mm

Incubación: ♀ 18 / 20 días

Pollos en nido: 24 días



Urraca

Pica pica

Número normal: 5 / 8
extremo: 4 / 10

Tamaño: 34,5 × 24,0 mm

Incubación: ♀ 17 / 18 días

Pollos en nido: 25 días



Corneja Negra

Corvus corone corone

Número normal: 4 / 5
extremo: 6 / 7

Tamaño: 43,3 × 30,3 mm

Incubación: ♀ 20 días

Pollos en nido: 35 días



Cascanueces

Nucifraga caryocatactes

Número normal: 3 / 4
extremo: 2 / 5
Tamaño: 33,5 × 24,5 mm
Incubación: ♀ 17 / 19 días
Pollos en nido: 25 días

Chova Piquigualda

Pyrrhocorax graculus

Número normal: 4
extremo: 3 / 6
Tamaño: 39,0 × 26,5 mm
Incubación: ♀ 17 / 21 días
Pollos en nido: 27 días

Chova Piquirroja

Pyrrhocorax pyrrhocorax

Número normal: 3 / 4
extremo: 2 / 7
Tamaño: 40,5 × 28,5 mm
Incubación: ♀ 17 / 23 días
Pollos en nido: 34 días

Grajilla

Corvus monedula

Número normal: 4 / 6
extremo: 2 / 9
Tamaño: 36,5 × 25,5 mm
Incubación: ♀ 17 / 18 días
Pollos en nido: 32 días

Graja

Corvus frugilegus

Número normal: 3 / 5
extremo: 6 / 9
Tamaño: 40,0 × 28,5 mm
Incubación: ♀ 16 / 20 días
Pollos en nido: 30 días



Rabilargo

Cyanopica cyanus

Número normal: 5 / 7
extremo: 3 / 9
Tamaño: 27,3 × 19,7 mm
Incubación: ♀ 17 días
Pollos en nido: 16 días



Cuervo

Corvus corax

Número normal: 4 / 6
extremo: 3 / 7
Tamaño: 49,5 × 33,5 mm
Incubación: ♀ 20 / 21 días
Pollos en nido: 42 días

POLLOS



URRACA/ CRÍALO

Los nidos de Urraca son frecuentemente parasitizados por el Críalo, una especie de cuco que sólo pone sus huevos en nidos de córvido y, especialmente, en los de la especie mencionada.

Las choras Piquirrojes ubican sus nidos en el interior de oscuras y profundas galerías. Parece que su pito "rojo luminoso" actúa como semáforo-mecanismo desencadenante innato - para que los polluelos localicen a sus padres en el negro paradiiso y abran el pico para ser cebados.



Corneja ceba a
su pollo, de
paladar muy
llamativo.

La mayoría de los pollos de los
córvidos abandonan el nido
cuando todavía no han completado
su crecimiento. La cola de una
Urraca, por ejemplo, no alcanza
su longitud total hasta los dos
meses y medio de edad, si bien
ésta abandona el nido a los
25 días.



Graja
muestra bolsa gular

Para cebar a sus insaciables pollos,
las grajas cuentan con un efectivo
auxiliar: una bolsa dilatante en
sus bocas en la que pueden
transportar hasta el nido grandes
cantidades de alimento.

El gregarismo en los córvidos

Los córvidos son aves generalmente gregarias. La cohesión de los grupos se mantiene gracias a un rico código de posturas y actitudes que todos los componentes de un bando pueden interpretar cabalmente. Mantienen, además, una jerarquía muy definida, subrayada continuamente

mediante pautas de dominancia y sumisión. Evidentemente, el comportamiento social de estas aves les reporta muchos beneficios tales como la defensa comunal —tanto de los nidos como de los bandos— y una búsqueda de recursos compartida.



Bando de Grajas
en pradera

♂ actitud
dominante

♂ de Graja en
actitud dominante



En los córvidos, como todos los vertebrados sociales, la jerarquía es dinámica y sumamente elástica. Las hembras acceden a los más altos niveles por "matrimonio" y los machos se ven obligados a defender constantemente sus puestos en el escalafón. Los combates o intimidaciones sociales están altamente ritualizados.

♂ Grajilla en
actitud sumisa



Córvidos del mundo

Arrendajo Azul Americano *Cyanocitta cristata*

Altura: 29 cm

Aspecto de Arrendajo de tonos grises azulados por el dorso, y blancuzcos en zona ventral, cola y alas de azul oscuro con barras transversales negras. Ocupa la mitad oriental de América del Norte.



Arrendajo Inca *Cyanocorax yncas*

Altura: 27 cm

Uno de los más llamativos córvidos del mundo, verde brillante por el dorso, partes ventrales amarillo limón, larga cola y llamativo antifaz negro, que se prolonga en babero de color negro. Vive en América del Sur.





Urraca China de Pico Rojo

Urocissa erythrorhyncha

Altura: 60 cm

Cola: 45 cm

Peso: 230 gr

Urraca de gran tamaño y cola excepcionalmente larga, cara negra y pico de vivo color amarillo anaranjado. Vive en zonas boscosas de China.



Urraca Azul China

Urocissa sinensis




Altura: 38 cm

Aspecto de Urraca, con pico anaranjado y antifaz negro que destaca sobre el vivo azul celeste de todo el cuerpo.

Alas parduzcas y cola larga.

Vive en el Himalaya y Sur de China, Sureste de Asia y las islas de Sumatra y Borneo.

Cuadro comparativo




de los córvidos



Graja



Corneja
negra



chora
Piquirroja
y chora
Piquigualda



Cuervo

CLASIFICACIÓN Y NOMENCLATURA

FAMILIA	GENERO	ESPECIE	CASTELLANO	CATALAN	GALLEGO	VASCUENCE
	Garrulus	<i>G. glandarius</i>	Arrendajo	Gaig	Pega Marxa	Eskiñoso
			Gayo		Pega Marxa	
			Glayu			
			Rendajo			
	Perisoreus	<i>P. infaustus</i>	Arrendajo Funesto	Gaig Siberiá		
			Rabilargo	Garsa Blava	Pega Azul	Mika-urdin
			Rabito	Blavosenc		
			Mohino			
	Cyanopica	<i>C. cyanus</i>	Urraca	Garsa	Pega Rabilonga	Mika
			Rabilarga	Blanca	Pega	
			Marica			
			Picaraza			
	Nucifraga	<i>N. caryocatactes</i>	Cascañueces	Truncanous	Esmoladoira	Inuxaur-jale
			Chova Piquirroja	Gralla Bec Vermell	Cholia	Bele-txing
			Glava		Biquibermella	
			Chova Piquigualda	Gralla Bec Groc	Cholia	Bele-txing
	Pyrrhocorax	<i>P. grauculus</i>	Gracha		Biquimarsla	moko-ori
			Graja	Gralla	Gralla	Ipar-bele
			Graja			
			Grajilla	Gralla	Corvo Cereixeiro	Bele-triki
	Corvus	<i>C. monedula</i>	Grajilla			
			Gravina			
			Corneja Negra	Cornella Negra	Corvo Viaraz	Bele
			Cuerva		Corvo Común	
	<i>C. corone</i>	<i>C. corone</i>	Corneja Cenicienta	Cornella	Corvo Cinciento	
			cornix	Emmantellada		
			Cuervo	Corb	Corvo Carnazal	Bele-txar
			Cuervo			
	<i>C. corax</i>	<i>C. corax</i>	Graju			

CÓRVIDOS

FUENTES: Sociedad Española de Ornitología. Institución catalana d'Història Natural. Angel Cabrera, J. Maluquer i Sotres, Sociedade Galega de Historia Natural, Grupo de Ciencias Aranzadi, datos del autor y comunicaciones privadas.

NO CIRCULANTE

Cuadernos de Campo del Dr. Félix Rodríguez de la Fuente

Cada miércoles en su quiosco o librería

Títulos de la colección:

- 1 - El Lince y el Gato Montés
- 2 - Grandes Águilas
- 3 - El Lobo
- 4 - Rapaces Nocturnas
- 5 - El Jabalí
- 6 - Pájaros Carpinteros
- 7 - La Cabra Montés y el Muflón
- 8 - Los Pájaros del Bosque (I)
- 9 - Víboras y Culebras
- 10 - Los Buitres
- 11 - El Zorro
- 12 - Aves de la Estepa
- 13 - Pequeños Carnívoros
- 14 - Peces de Río
- 15 - Pájaros de Medio Urbano
- 16 - El Quebrantahuesos y el Alimoche
- 18 - Peces de Lagos y Marismas
- 19 - Halcones y Cernícalos
- 20 - Lagartos y Lagartijas
- 21 - Las Garzas
- 22 - Pequeñas Águilas

Reserve su ejemplar



EDITORIAL MARIN S.A.