



Dr. Félix Rodríguez de la Fuente


CUADERNOS DE CAMPO

HALCONES Y CERNICALOS



Especie
Amenazada

EDITORIAL MARIN S.A.



Aguila Perdicera
parasitiza a
Halcón Común
que había cazado
una Grajilla

Armallones
(Guadalajara)
Primavera 1965



Halcón Gerifalte,
aguarda que liebre ártica
abandone su refugio



*Cuaderno de Campo
del Dr. Félix Rodríguez de la Fuente*

HALCONES Y CERNÍCALOS


*♂ y ♀ de Cernícalo
Patirrojo*

19

*Gran dimorfismo
sexual*



EDITORIAL
MARIN, S.A.



Sumario

Notas de Campo	2
Aspecto y dimensiones	6
Equipados para la caza en vuelo	18
Distribución ecológica	20
Distribución geográfica	22
Técnicas para localizar halcones	24
Pirámides ecológicas de los halcones	26
Alimentación	28
Técnicas de caza	30
Parada nupcial del Halcón Peregrino	36
Ciclo anual de los halcones	38
Nidos	42
Huevos	44
Pollos	46
El entrenamiento de los jóvenes	48
Cuadro comparativo de siluetas	50
Clasificación y nomenclatura	52

Halcón Común ♂
vigila desde
posadero en
roca las
inmediaciones
de su nido

PROCEDENCIA

Donativo

018015-02

B 500

FECHA

990316

CUADERNOS DE CAMPO DEL
DR. FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE

Idea y diseño de Editorial Marín, S. A.

Ilustración color JAN SEMMEL

Dibujos negro Juan Manuel Varela

Coordinación Joaquín Araujo

Dirección Félix Rodríguez de la Fuente

© EDITORIAL MARIN, S. A. 1978

Nicaragua, 85-95, Barcelona 29, Spain

ISBN 84-7102-500-0 la Colección

ISBN 84-7102-519-1 Halcones y Cernícalos

Impreso por Artes Gráficas Toledo, S. A.

Depósito Legal: To 265-1978

Distribuido por Marco Ibérica, D. de E., S. A.

Precio de este ejemplar: 100,- Ptas.

590
120d
C
T. 19



Cernícalo
Común en vuelo
de caza

NOTAS DE CAMPO

Cabeza de
Cernícalo
"diente" muy
marcado
→



Cabeza de Halcón Gerifalte.
Narinas circulares con excrecencia
protectora que evita
que entre el aire
en el aparato
respiratorio
durante los
velocísimos
← picados.



Cabeza de
Azor. →
Pico sin diente
(narinas ovoides)



Ciertamente, mi situación no podía considerarse como normal, ni siquiera segura para un niño de 11 años: calado hasta los huesos por la fina lluvia, temblando de frío y ansiedad, entre los carrizos de una charca perdida en el páramo, a muchos kilómetros de mi casa, me sentía, sin embargo, el más feliz de los mortales. Porque ellos estaban allí, a pocos metros de mi escondite, tan cerca que podía distinguir el verde metálico de sus cuellos y los anaranjados picos.

Al fin lo había conseguido. Tras media hora de mostrarme por el suelo pedregoso, veía de cerca a mis admitidos viajeros.

Lleno de júbilo, salté hacia adelante, grité.





Y toda la bandada se puso en vuelo,
con extraño clamor, salpicando
mi rostro con las gotas de
agua proyectadas por sus
alas. Entonces un silbido
creciente dominó
todo. Una masa
grisacea cayó
como un proyectil
hacia el centro de
la bandada y chocó
con uno de los patos,
derribándolo en tierra,
envuelto en una nubecilla
de plumas.

Con asombro, me percaté de que
aquel bólido mortífero era realmen-
te un ave, que ascendía tan
rápida e inesperadamen-
te como había bajado.



Cera
amarilla

Bigotera
marcada



Dibujó de vermiculaciones
horizontales

Halcón Común
Falco peregrinus

	mín. ♂-♀ máx.
Altura:	38-50 cm
Peso:	570-1000 gr
Ala:	29-37 cm
Envergadura:	83-113 cm
Pico:	18-22 mm
Tarso:	45-50 mm
Cola:	13-16 cm

Diferencias subespecíficas aparte, los Peregrinos se caracterizan por su compacto y aerodinámico perfil, en el que alas y cola parecen trazados con tiralíneas.

Cabeza muy redondeada, ojos negros totalmente circulares,

enmarcados en amarillo anaranjado, que es el mismo color de las patas. Dorsal azul metálico; garganta y vientre blancuzcos, con manchas oscuras; cabeza negra, con profunda mancha del mismo color en las mejillas.

Las ♀♀ resultan una tercera parte más grandes que los ♂♂

Aspecto y dimensiones

Cera
azul
Muy
pardos



epón la muda

Motas
alineadas
longitudi-
nalmente



NEBLI DONCELLA
Falco peregrinus
callidus

Norte de Europa


Grandes, longilíneos.

Muy claros.

Nuca negra.

Babero
muy
blanco.

Muy
migradores



Bigotera
ancha

BAHARI

Falco peregrinus
brookei

Zona mediterránea.

Más corto y propor-
cionado.

Babero blanco;
nuca negra u
ocracea.



TAGAROTE

Falco pere-
grinus pere-
grinoides

Nte. de África
y Canarias

Pequeños, rollizos,
casi pardos. Bigotera
marcada, babero pequeño



forma blanca pueden
llegar a carecer totalmente
de motas

Sin
bigotes

forma gris
la más
común

Anchos de hombros

Halcón Gerifalte

Falco rusticolus

	mín. ♂	♀	máx.
Altura:			60 cm
Peso:			960-2000 gr
Ala:			34,5-43,0 cm
Envergadura:			127-137 cm
Pico:			23-29 mm
Tarso:			50-69 mm
Cola:			19,0-26,5 cm

El más grande y compacto de los halcones, puede presentar varias fases de plumaje que representamos aquí.

La coloración en todas las variedades resulta bastante uniforme, sin bigoteras negras en la cara. Finamente moteado por partes ventrales. Silueta de perfil más redondeado.

forma melánico
poco frecuente



Halcón muy similar en estructura al Común, aunque resulta más rechoncho. Cabeza rosácea y resto del dorso parduzco, moteado. Partes ventrales muy claras con manchas longitudinales. Bigotera poco marcada. Los jóvenes están más barreados en dorso y vientre.

Halcón Sacre

Falco cherrug

min. ♂-♀ máx.

Altura:	43-59 cm
Peso:	800-1300 gr
Ala:	35,0-42,3 cm
Envergadura:	104-125 cm
Pico:	20-25 mm
Tarso:	50-55 mm
Cola:	19-20 cm

(ver joven en pág. 17)



forma clara,
solo algunos
ejemplares
resultan casi
totalmente
blancos

Muy estilizado

Bigotera
potente

Calzas y
base de
cola rojas

Alcotán

Falco subbuteo

mín. ♂-♀ máx.

Altura:	28-38 cm
Peso:	150-340 gr
Ala:	24,0-29,6 cm
Envergadura:	70-86 cm
Pico:	12-14 mm
Tarso:	34-36 mm
Cola:	13-14 cm

Pequeño halcón, sumamente longilíneo y estilizado. Dorso gris metálico; cabeza muy negra, con profundas bigoteras que destacan en las blancas mejillas. Pecho y vientre blancuzco-crema, con profusas manchas longitudinales negras. Llamativa mancha roja en infracobertoras caudales y plumas de las patas. Patas amarillas.

Forma oscura
prácticamente negros

Halcón de Eleonor

Falco eleonorae

	mín. ♂-♀ máx.
Altura:	40-47 cm
Peso:	300-520 gr
Ala:	30,0-36,6 cm
Envergadura:	90-105 cm
Pico:	14-18 mm
Tarso:	44-48 mm
Cola:	17,5-20,0 cm

Francamente parecido al Alcotán, del que puede distinguirse por carecer de mancha roja en abdomen. Resulta algo mayor y menos estilizado. Su *habitat*, exclusivamente marino, evita equivocaciones.

Cola proporcionalmente más larga que en otros halcones.

Joven parduzco
muy moteado



Bigotera muy
contrastada con
mejillas blancas



Forma clara o
normal, muy
parecidos al
Alcotán

Solo en costas



Halcón Borní *Falco biarmicus*

	mín. ♂-♀ máx.
Altura:	40-50 cm
Peso:	550-930 gr
Ala:	31-38 cm
Envergadura:	100-110 cm
Pico:	18-20 mm
Tarso:	47-50 mm
Cola:	15-16 cm

Gran halcón, parece mayor que un Peregrino de tonos muy claros. Cabeza ocrácea, bigotera estrecha, pecho y ventrales blancos con manchas negras. Dorso pardo oscuro; cola barreada, con punta terminal blanca.

Muy claro
con motas
grandes


Esmerejón

Falco columbarius

	mín. ♂-♀ máx.
Altura:	26-35 cm
Peso:	150-260 gr
Ala:	19,5-23,5 cm
Envergadura:	59-69 cm
Pico:	12-14 mm
Tarso:	34-38 mm
Cola:	11,4-12,8 cm

Muy pequeño
Dorso
gris azulado

Mejillas muy
blancas



♂ muy
contrastado


Pequeño, pero robusto halcón.
El macho es azul metálico en el
dorso y blanco en cabeza y
garganta; partes ventrales
ocráceas, muy punteadas de
negro. La hembra, mayor, es
homogéneamente ocrácea.

Sin bigotera



♀ parda muy
moteada





Cernícalo Patirrojo

Falco vespertinus

	min. ♂-♀ máx.
Altura:	23-34 cm
Peso:	130-200 gr
Ala:	22,2-26,2 cm
Envergadura:	65-80 cm
Pico:	12-13 mm
Tarso:	28-30 mm
Cola:	12,0-12,8 cm

Pequeño halcón de gran dimorfismo sexual.

Machos: Gris oscuro, a excepción de infracobertoras caudales de color rojizo.

Hembras: Cabeza y píleo rojizos; vientre algo más claro; dorso gris barredado.

Cernícalo Primilla

Falco naumanni

mín. ♂-♀ máx.

Altura:	26-34 cm
Peso:	120-150 gr
Ala:	22-26 cm
Envergadura:	60-65 cm
Pico:	12-13 mm
Tarso:	30-32 mm
Cola:	13-15 cm



♀
Cola muy barredada

Cabeza azul pizarra

Dorso sin motas →

Bigotera poco marcada

Uñas blancas

Borde cola →
blanco y negro

Cernícalo Común

Falco tinnunculus

mín. ♂-♀ máx.

Altura:	32-40 cm
Peso:	130-260 gr
Ala:	23,0-26,8 cm
Envergadura:	68-92 cm
Pico:	13-15 mm
Tarso:	36-42 mm
Cola:	15-18 cm



Sólo algo más robusto que el Primilla, con bigotera patente y con dorso manchado. Uñas negras en ambos sexos.



♀♀ de Cernícalos también son mayores que ♂♂

JOVENES

Ma's pardo, en el
adulto el dorso es gris azulado



Sin calzas
rojas
Alcotán

Cabeza
muy
clara



Motas oscuras /
muy marcadas

Bigotera
ancha

Sacra ↑

Cera


azul no
amarilla

Pecho pardo /
punteado
de negro

Halcón
común



Equipados para la caza en vuelo



Picos

Corto y provisto de un diente—pequeña protuberancia córnea exclusiva de las falcónidas—que actúa de auténtico *sacabocados*, el pico de los halcones resulta proporcionalmente más fuerte que el de otras rapaces y puede llegar a partir los huesos más duros.



Alas

Las alas presentan una estructura similar: son estrechas y afiladas, como corresponde a su vuelo incisivo, su escasa adaptación al planeo y sus fulgurantes picados.



Plumas remiges muy largas y estrechas: "cuchillos", escotadura pequeña

Garra de
Aguila
Real



No
especializada

Dedos muy cortos gran
potencia muscular. Solo
lagomorfos raramente
aves. Emplumado hasta
dedos

Garras


Las garras están formadas por
largos dedos y afiladas uñas.
En la suela plantar, las
almohadillas están muy
desarrolladas para facilitar la
captura de las escurridizas
presas.

Garra de
Azor

Dedos cortos,
uñas largas.

Depreda sobre
mamíferos, aves
y reptiles.

No especializada




Garra de Halcón

Especializada.

Sólo aves.

Dedos muy largos

Almohadillas palmares
muy marcadas.



Distribución



Halcón Gerifalte



Adaptable, la familia de los halcones ha conseguido colonizar todos los biomas continentales. Es uno de los pocos géneros presentes en todas las latitudes, no sólo de Europa, sino de todo el mundo.



Alcotán



Esmerejón



Cernícalo Patirrojo



Cernícalo Común



Montaña




Bosque de coníferas



Bosque caducifolio



ecológica



que mediterráneo



Estepa




Ríos, lagos
y marismas



Costa



Distribució



Geográfica


ISMAELILLO



Halcón
Borní




Esmerejón



Cernícalo
Patrirojo



Cernícalo
Primilla



Cernícalo
Común



018015

NO CIRCULANTE

Técnicas para localizar halcones



Egagrópila de Cernicelo Común muchos restos de insectos compacto y pequeña



← 4 cm →



← 6/8 cm →

Marcas en restos

En el esternón de las aves puede leerse si han sido o no capturadas y devoradas por un halcón.

Las otras rapaces nunca «mordisquean» los esternones sino que arrancan los músculos limpiamente.

Egagrópilas

El régimen alimenticio de los distintos halcones queda reflejado en la textura, tamaño y color de sus egagrópilas.

Egagrópila de Halcón Común siempre con plumas y huesos de aves. A veces poco formada


Desplumaderos

Durante todo el año los halcones despluman a sus presas en determinados puntos. Allí puede encontrarse todo tipo de plumas y otros restos. Su pertenencia a los halcones puede dictaminarse por observación directa y, sobre todo, porque en estos puntos sólo encontraremos restos de aves.



Excrementos

Aunque muchas de las aves que crían en los cantiles rocosos dejan en ellos las marcas de sus deyecciones, las de Halcón Común pueden detectarse por sus cortas trayectorias y porque suelen bordear cuevas pequeñas.



Pirámides ecológicas

La familia de los halcones se sitúa en el plano superior de las pirámides ecológicas. Como predadores, si los consideramos en conjunto, actúan sobre todos los estratos ecológicos.

Considerados aisladamente nos encontraremos con consumados especialistas, como el Halcón Común, que actúa en especial sobre las comunidades de aves de la estepa.

Es, en definitiva, una de las pocas aves ornitófagas, es decir, que consume exclusivamente otras aves, que al ser generalmente fitófagas, nos plantea una de las más, simples cadenas tróficas.

HALCÓN
PEREGRINO

PREDADOR

Estornino

Perdiz

Paloma

CONSUMIDORES
PRIMARIOS

Cereales y pastizales

PRODUCTORES





CERNÍCALO
COMUN

Ratones



Reptiles



Insectos




Pequeños pájaros



Anfibios

BOSQUE



Alimentación

Las dietas son muy variables, según las localidades y las especialidades de determinados individuos. En cualquier caso, se puede generalizar en el sentido de que en el Centro y Norte de Europa, las falcónidas de pequeño tamaño, como Alcotán y Gernícalo, consumen más roedores y aves, mientras que en el Sur, son más entomófagos.

HALCÓN COMÚN


Palomas 40%
Estorninos 20%
Alondras y pájaros esteparios 10%
Córvidos 8%
Perdices y tortolas 8%
Varios aves 14%

ALCOTÁN

Aves pequeñas 70%
Reptiles 5%
Roedores 5%
Insectos 20%

Aves pequeñas 20%
Reptiles 25%
Coedores 30%
Insectos 25%

CERNÍCALO



GERIFALTE

Perdiz Nival 70%
Liebre Artica 10%
Lemming 5%
Otras 15%



Técnicas de caza

El Halcón Común caza siempre en el aire y a favor de la enorme aceleración de sus picados, para lo cual ha de situarse siempre a considerable altura; en ocasiones incluso varios cientos de metros por encima de sus presuntas presas.

Aunque resulta francamente difícil establecer con seguridad la velocidad que los halcones alcanzan en sus picados, se ha llegado a *estimar* que pueden desarrollar la increíble cifra de 400 km/h.

*Con viento a favor
la trayectoria busca
la cabeza del ave
atacada*



Dirección del viento



Con viento en
contra ataca por
detrás y
por abajo

Dirección
del viento

Con viento en contra, pica desde atrás en una trayectoria que culmina por debajo de la presa, a la que agarra por la parte ventral aprovechando el ángulo muerto de su visión.




Con viento a favor, en ocasiones su trayectoria culmina algo por encima y por delante del camino que sigue la presa. En el último instante una inflexión brusca le permitirá golpear el cuello o la cabeza del ave atacada.

Con viento a favor pica siempre desde atrás y, sin cambiar apreciablemente la trayectoria en que coincidirán cazador y presa, la golpea y hiere generalmente sin trabarla.



Dirección
del viento


Con viento a favor
acuchillamiento
directo, el ave
solo suele
quedar
herida



ADAPTACIONES CINEGÉTICAS DE LOS HALCONES



HALCON
COMUN



GARRAS

Dedos
larguísimos



HALCON SACRE



Dedos
más cortos
pero más fuertes



CERNICALO



Dedos
largos y
finos

ALAS/SILUETAS PREASAS PRINCIPALES

Alas largas y finas



cazan en el aire




Paloma

Alas anchas y largas



cazan tanto en el
aire como en tierra




Perdiz

Roedores




cazan en tierra

Alas muy finas



Insectos

Roedores
pequeñas palomas



Reptiles

Cola
más larga





*Cernícalo
cala sobre
lagarto Ocelado*

Cernícalo

El Cernícalo —de ahí su nombre— explora meticulosamente el terreno *cerniéndose* sobre sus posibles presas.

*Alcotán devora
en vuelo
una libélula*



Alcotán

Su técnica es muy semejante a la utilizada por el Halcón de Eleonor. Apresa en el aire a la mayoría de sus presas, en persecuciones bastante lineales que evidencian su enorme poder de aceleración batiendo alas. Se especializa en hirundinidos y apódidos, aves muy ágiles y maniobreras, y también captura insectos en el aire. Se le han cronometrado velocidades de hasta 250 km/h.



*Cernícalo
explora pastizal
de montaña*

Gerifalte

En la helada tundra, donde predominan los espacios abiertos, el Gerifalte caza siguiendo trayectorias lineales a muy baja altura. En estas persecuciones, las presas recurren con frecuencia a la

ocultación y permanecen inmóviles en cualquier matorral o accidente del terreno. Entonces el Gerifalte se apostea en las cercanías y pacientemente aguarda, incluso horas, a que un movimiento delate a su presa.



CONDUCTA NUPCIAL DEL HALCÓN COMÚN




♂ en posición de reposo

flexiona cuello




Los vuelos raudos, las variadas persecuciones y los fulgurantes picados en las inmediaciones del nido, constituyen las características principales de los prolegómenos de la parada nupcial.

♂ con el cuerpo inclinado hacia adelante cabeza más baja que cola comienza incitación




♂ expectante



♀ con plumas erizadas y cuerpo horizontal emite pitidos lastimeros



↑
Se consuma cópula






♂

El ♂ de Halcón
común acude a la
llamada de la ♀ desde
el futuro nido



♀



♀

♀ con flexiones de
cabeza, inicia
posición receptiva.




♂



♀








Ceba nupcial, el ♂
alimenta a la ♀ en la
plataforma del nido



En los juegos nupcia-
les de Halcón se pro-
ducen intercambios
de las ofrendas ali-
mentarias en posi-
ciones de auténtico
aerodinamismo.


Cuadro cronológico del




Celo
 Incubación
 Pollos
 Muda

ciclo de reproducción

Halcón Gerifalte




Halcón Común




Alcotán




Halcón de Eleonor



Cernícalo Común



CRONOLOGÍA FISIOLÓGICA Y
ETOLÓGICA DE LA REPRODUCCIÓN
DE HALCÓN COMÚN



1

10-20/III

Al iniciarse la época de la reproducción, será el ♂ el que elija el emplazamiento del nido desde el que reclamará la presencia de la ♀

2 20.III/10.IV



Una vez aceptado el emplazamiento por la ♀ ésta adopta posturas peticitorias, para que el ♂ proceda a consolidar las relaciones mediante cebas. A la vez se producen las diferentes secuencias de las paradas nupciales que hemos representado en la página anterior.

3 15.IV/15.V



Tras las cópulas, que van acompañadas de todo el ceremonial ya explicado, la ♀ se dedica exclusivamente a la incubación mientras el ♂ caza para



alimentarla. También

aprovechará este período para realizar la muda pues no precisa de sus plumas para tan quieta labor que prácticamente no interrumpirá.

Sólo cuando la ♀ se ausenta para comer o bañarse, el ♂ la sustituye sobre los huevos.





4

16.V/15.VI

A partir del nacimiento de los pollos se produce un reparto equitativo de la tareas entre los sexos. Así, mientras el ♂ sigue dedicándose a la caza, la ♀ trocea las presas, ceba a los polluelos y defiende los contornos del nido, todo ello gracias a su tamaño que le proporciona una mayor fuerza.



5

16.VI/15.VII

También será la ♀ la encargada de adiestrar a los jóvenes volanderos en el arte de la caza, mientras el ♂ puede por fin proceder a renovar sus plumas.

Nidos



MATORRAL

Esmerejón
Alcotán
Cernícalo Común

ARBOL

Alcotán
Cernícalo Común
Halcón Sacre
Esmerejón
Halcón Peregrino



EDIFICACIONES

Cernícalo Común
Cernícalo Primilla



NIDOS EN CANTIL

Halcón Común
Cernícalo Común
Cernícalo Primilla
Gerifalte
Eleonor
Borni



El Gerifalte
puede llegar a
criar en el suelo

Los halcones no construyen
nidos. Se limitan a poner
los huevos directamente
sobre el sustrato elegido.

SUELO

Halcón Borni
Halcón Peregrino



Huevos

Halcón Común

Falco peregrinus

N.º normal: 3 / 4
extremo: 2 / 6
Tamaño: 52 x 41 mm
Incubación: ♀ (♂) 29 días
Pollos en nido: 40 días



Halcón Gerifalco


Falco rusticolus

N.º normal: 3 / 4
extremo: 2 / 7
Tamaño: 59 x 46 mm
Incubación: ♀ (♂) 30 días
Pollos en nido: 50 días

Halcón Sacre

Falco cherrug

N.º normal: 4
extremo: 3 / 6
Tamaño: 54 x 41 mm
Incubación: ♀ ♂ 28 días
Pollos en nido:



Alcotán

Falco subbuteo

N.º normal: 2 / 3
extremo: —
Tamaño: 41 x 32 mm
Incubación: ♀ (♂) 28 días
Pollos en nido: 30 días

Esmerejón

Falco columbarius

N.º normal: 5 / 6
extremo: 2 / 7
Tamaño: 40 x 31 mm
Incubación: ♀ (♂) 30 días
Pollos en nido: 28 días

Halcón de Eleonor

Falco eleonorae

N.º normal: 2 / 3
extremo: 1 / 4
Tamaño: 42 x 33 mm
Incubación: ♀ (♂) 30 días
Pollos en nido: 30 / 35 días

Cernícalo Primilla

Falco naumanni

N.º normal: 4 / 5
extremo: 3 / 6
Tamaño: 35 x 29 mm
Incubación: ♀ (♂) 28 días
Pollos en nido: 26 / 28 días

Cernícalo Común

Falco tinnunculus

N.º normal: 4 / 5
extremo: 3 / 9
Tamaño: 40 x 32 mm
Incubación: ♀ (♂) 28 días
Pollos en nido: 27 / 29 días

Pollos

Entre los pollos de Halcón Común y los de todas las restantes especies de la familia, la única diferencia apreciable es la presencia en los primeros de una membrana protectora del orificio auditivo.

Los pollos de los halcones, como los de otras rapaces, se muestran bastantes remisos a la hora de abandonar el nido. Han de ser los padres los que, a favor del hambre de sus descendientes, les estimulen con presas cazadas para que los jóvenes volanderos abandonen por primera vez la repisa donde han crecido.

No son raras las disputas entre los hermanos que comparten un nido, sobre todo cuando ya son pollos crecidos.



Jov.

Ad.


La llamativa mancha amarilla que supone la cera del pico de los halcones debe actuar como señal de claro significado fanérico. De hecho esta es la única diferencia entre jóvenes y adultos.

♀ de Halcón Común
aporta un pequeño medor
a su numerosa

prole



El mayor tamaño de las hembras de los halcones responde a su labor puramente defensiva durante la época de nidificación, y sobre todo, a su misión despedazadora de presas para la alimentación de los pollos.



↑ ♀ de Halcón Común
ceba a sus polluelos
ca. Alcalá de Henares
(Madrid 1969)



Pollo de Halcón Común
de 12 días de edad con
el segundo plumón



Pollo de Halcón
Común con 25
días ya prae-
ticamente
cubierto
de plumas
↙



El entrenamiento de

APRENDIZAJE POLLOS

Durante un largo
período que
generalmente se
extiende desde
que los pollos
abandonan

el nido

por primera vez
hasta que se independi-
zcan, (x) la ♀ se dedi-
ca a la enseñanza
de su prole.



(x)

Unos dos
meses

los jóvenes halcones

Joven




Para instruir a los jóvenes en la complicada técnica de la caza al vuelo, la madre hiere aves delante de ellos; para que los pollos las rematen y capturen.





Joven



Cuadro comparativo




HALCÓN COMÚN




HALCÓN GERIFALTE




HALCÓN SACRE








ALCOTÁN





HALCÓN DE ELEONOR



CERNÍCALO PRIMILLA



CERNÍCALO COMÚN



LAS DIMENSIONES SON,
EN TODOS LOS CASOS, LAS MÁXIMAS

CLASIFICACIÓN Y NOMENCLATURA

ORDEN	FAMILIA	GÉNERO	ESPECIE	CASTELLANO	CATALÁN	GALLEGO	VASCUENCE	POPULAR
			<i>Falco rusticolus</i>	Halcón Gerifalte	Grifó	Falcón Albar	Ipar-belatz	
			<i>Falco peregrinus</i>	Halcón Común	Falcó Pelegrí	Falcón Pelengrín	Belatz	Halcón Peregrino, Halcón Real, Halcón Nebli, Halcón Tagarote, Halcón Bahari, Ferre Palomberu.
			<i>Falco cherrug</i>	Halcón Sacre	Falcó Sagrat			
			<i>Falco biarmicus</i>	Halcón Borní	Falcó Llaner	Falcón Borní	Ego-belatz	Halcón Alfaneque
FALCONIFORMES	FALCÓ-NIDAS	Falco	<i>Falco subbuteo</i>	Alcotán	Falcó Mostaxut	Falcón Pequeno	Belatz-prakagorri	Perlamicu Tagarote
			<i>Falco eleonorae</i>	Halcón de Eleonor	Falcó de la Reina		Eleonor-belatz	
			<i>Falco columbarius</i>	Esmerejón	Esmerla	Falcón Pazareiro	Mirotz	
			<i>Falco vespertinus</i>	Cernícalo Patirrojo	Falcó Cama-roig		Belatz-zankagorri	
			<i>Falco naumanni</i>	Cernícalo Primilla	Xoriguer Petit	Buxarelo	Belatz-txikimotz	Cernaera
			<i>Falco tinnunculus</i>	Cernícalo Común	Xoriguer Gros	Lagartieiro	Belatz txiki	Gavilan, Peneireiro, Peñerina

NO CIRCULANTE

Cuadernos de Campo del Dr. Félix Rodríguez de la Fuente

Títulos de la colección:

- 1 - El Lince y el Gato Montés
- 2 - Grandes Águilas
- 3 - El Lobo
- 4 - Rapaces Nocturnas
- 5 - El Jabalí
- 6 - Pájaros Carpinteros
- 7 - La Cabra Montés y el Muflón
- 8 - Los Pájaros del Bosque (I)
- 9 - Víboras y Culebras
- 10 - Los Buitres
- 11 - El Zorro
- 12 - Aves de la Estepa
- 13 - Pequeños Carnívoros
- 14 - Peces de Río
- 15 - Pájaros de Medio Urbano
- 16 - El Quebrantahuesos y el Alimoche
- 17 - Los Córvidos
- 18 - Peces de Lagos y Marismas
- 20 - Lagartos y Lagartijas
- 21 - Las Garzas
- 22 - Pequeñas Águilas

Cada miércoles en su quiosco o librería



EDITORIAL MARIN S.A.