



Dr. Félix Rodríguez de la Fuente

CUADERNOS DE CAMPO

LAGARTOS Y LAGARTIJAS



EDITORIAL MARIN S.A.



Salamanguesa Costera
(Pupilas verticales denotan
actividad nocturna)



Lagarto Ocelado en
actividad defensiva
ante zorro
La Pedriza
(Madrid)
Mayo 1951



Lagartija de Turbera intenta
atrapar una mosca. Asturias 1974



Cuaderno de Campo
del Dr. Félix Rodríguez de la Fuente

LAGARTOS Y LAGARTIJAS 20



*Lagartija Iberica muy
frecuente en tapias y
muros, incluso en*

*Casas
habitadas*



**EDITORIAL
MARIN, S.A.**




Sumario

Notas de Campo	2
Aspecto y dimensiones	6
Equipo	20
Distribución ecológica	22
Distribución geográfica	24
Posición ecológica	26
Alimentación	28
Técnicas de caza	32
Técnicas defensivas	34
Paradas nupciales	36
Cronología de la reproducción	38
Encames, guaridas y huras	40
Huevos	42
Jóvenes	44
Enemigos de los reptiles	46
Clasificación y nomenclatura	48

donativo

018016-02 \$ 500

990316.



CUADERNOS DE CAMPO DEL
DR. FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE

Idea y diseño de Editorial Marín, S. A.

Ilustración color ERNESTO CERRA

Dibujos negro Juan Manuel Varela

Coordinación Joaquín Araujo

Dirección Félix Rodríguez de la Fuente

© EDITORIAL MARÍN, S. A. 1978

Nicaragua, 85-95, Barcelona-29, Spain

ISBN 84-7102-500-0 la Colección

ISBN 84-7102-520-5 Lagartos y Lagartijas

Impreso por Artes Gráficas Toledo, S. A.

Depósito Legal: To- 266 - 1978

Distribuido por Marco Ibérica, D. de E., S. A.

Precio de este ejemplar: 100,- Ptas.

↑
Estilón Tridáctilo
toma el sol.
Almería
Junio 1971

550
Rod
e
T. 20.

NOTAS DE CAMPO



Comadreja se distrae
con la cola de un lagarto
mientras éste se pone
a salvo. Pancorbo (Burgos)
Junio 1972



Combate territo-
rial de Estirzones
Alicante
Abril 1971



Todo hombre de campo sabe que los grandes lagartos ocelados se defienden con extraordinaria bravura de enemigos tan desproporcionados como perros, incluso, los propios seres humanos. Toda la estrategia defensiva de los lagartos gira entorno a la enorme potencia de sus mandíbulas, accionadas por músculos tan poderosos que destacan netamente en la morfología cefálica de este reptil. Pocas personas han tenido la oportunidad, sin embargo, de observar el combate de un lagarto con un mamífero carnívoro de sus dimensiones. Este fué el duelo entre un gigantesco ocelado y una pequeña tucana, que tuvo la oportunidad de ver y filmar, en el cuenco pedregoso y seco de un río chuelo.

Tan pronto como descubre al lagarto, el mustélido trata de romper la férrea



defensa que representa su boca abierta en dirección a su garganta. Gira rápidamente la pequeña turona en torno al reptil. Con agilidad de boxeador, cambia una y otra vez la dirección y el ritmo de sus movimientos. Pese a todo, en el ataque decisivo, cuando el mamífero distiende el largo y musculoso cuello para clavar sus caninos en la cabeza del reptil, éste consigue hacer presa en el hocico de la turona. Las tenazas se cierran herméticamente. Ambos contendientes giran sobre sí mismos, quizá con



el ánimo de fracturar la columna cervical del oponente. Finalmente el musculado mustelido consigue escapar del cepo mortal. Tras otra serie de fintas que duran cerca de un minuto, rompe la guardia del gran lagarto y sus caninos se clavan en la parte lateral de su garganta.

Aspecto y dimensiones

Salamanquesa Costera

Hemidactylus turcius

Longitud: 12 cm.

Coloración muy pálida, aspecto arenoso con algunas manchas pardas. Cola con anillos claros, alternados con oscuros. Cabeza apuntada y muy ancha. Ojos de pupila vertical. Patas desarrolladas, con cinco dedos provistos de uñas muy largas. Su cuerpo llega a ser traslúcido.



Las laminillas de sus dedos le permite una perfecta movilidad en paredes lisas y verticales



Aunque frecuenta paredes y techos, prefiere vivir en el suelo.

Salamanquesa Común

Tarentola mauritánica

Longitud: 15,5 cm.

Coloración muy variable según la luz, aunque dominan los tonos pardos, los grisáceos muy moteados de manchas oscuras y dos bandas longitudinales también oscuras en el dorso. Morro más corto y obtuso que la Salamanquesa Costera. Dedos cortos, de los que sólo tercero y cuarto tienen uñas.

Vive en todo tipo de paredes y en los árboles; frecuente en edificios



Las laminillas y ganchos que adapta su movilidad a cualquier superficie, lisa o vertical



Vive siempre bajo
piedras o en galerías
subterráneas

Culebrilla Ciega

Blanus cinereus

Longitud: 28 cm.

Parece una gran Lombriz de Tierra con el morro redondeado y ojos casi atrofiados. Tonos rosados y blancuzcos. Muy segmentada, con más de 100 anillos en el cuerpo.



Lución

Anguis fragilis

Longitud: 50 cm.

Aspecto de pequeña culebra pues carece de miembros. Cabeza cónica.

En los adultos, el dorso es parduzco claro y de cierto brillo, con una línea negra de la que algunos individuos carecen.

Zona ventral grisácea.



En praderías muy húmedas

Lagartija Colirroja

Acathodactylus erythrurus

Longitud: 20 cm.

Lagartija de gran tamaño y muy gruesa. Patas muy largas. Cabeza pequeña y achatada y cola ancha en la base. Las hembras en celo y las jóvenes resultan inconfundibles por su cola roja. Los adultos presentan una coloración ocrácea con listas longitudinales negras manchadas de blanco. Los machos en época de celo exhiben ocelos amarillos en los costados.

terrenos abiertos, muy
secos, desnudos o con
matorrales



Lagarto Ágil

Lacerta agilis

Longitud: 22 cm.

Pequeño lagarto, de cabeza muy achatada. Patas cortas y cola muy larga. Los machos, en la época nupcial, son verdosos muy moteados de negro con algunos ocelos salpicados de color blanco. Las hembras resultan más parduzcas en el dorso y con manchas irregulares, casi negras.

zonas muy cubiertas
de matorrales junto a los bosques
del Pirineo



Lagartija Ibérica

Lacerta hispánica

Longitud: 16 cm.

Pequeña lagartija muy plana de cola larguísima. La coloración puede variar: los machos tienen el dorso verdoso-claro con una banda negruzca y, en celo, el vientre se les torna rojizo; las hembras son grisáceas con una línea parduzca en el dorso y otra, más clara, en los costados.

Muy ligada
a tapias y muros
de viviendas.
También
en árboles

Lagartija de Valverde

Algyroides marchi

Longitud: 13 cm.

Pequeña y rechoncha lagartija de cola larga y morro bastante prominente. Coloración pardo verdosa, con una línea negruzca en el dorso que se va aclarando en las partes superiores. Zona ventral amarillenta en los machos.

Localizada
exclusivamente en ciertas
zonas de la Sª de
Cazorla y
Algaraz

Sólo en los islotes que rodean las islas de Menorca y Mallorca y en sus

zonas litorales

Lagartija Balear

Lacerta lilfordi

Longitud: 18 cm.

Lagartija que presenta multitud de variaciones locales que dan lugar a muchas subespecies. Puede llegar a ser muy abundante. Morro prominente, cabeza ancha,

patas cortas y cola muy ancha en la base. La coloración también resulta muy variable, desde el pardo claro, hasta el verdoso y el negro. El vientre puede ser rojizo. En los costados suelen aparecer manchas azuladas.

Lagartija Serrana

Lacerta monticola

Longitud: 23 cm.

Muy estilizada, puede alcanzar grandes dimensiones sobre todo debido a la longitud de la cola. Cola achatada. Las hembras son verdosas, con una línea de puntos oscuros en el dorso y costados parduzcos. Vientre blanco con puntitos negros. Los machos resultan más vistosos: verde brillantes con manchas negras más irregulares y los costados, casi negros, con manchas azul verdoso.

Roquetas a gran altura en las cordilleras del Norte y Centro de la península

Lagartija Roquera

Lacerta muralis

Longitud: 20 cm.

Cabeza prominente, cuerpo ancho y deprimido. Coloración variable en la que dominan los tonos

pardos. Costados reticulados en negro en los machos, quienes presentan ocelos azulados en zona ventral y sin manchas en las hembras. El resto del cuerpo está moteado de negro.



Zonas abiertas muy expuestas al sol, casi siempre en paredes rocosas

Lagartija de las Pitiusas

Lacerta pitiusensis

Longitud: 21 cm.


Como la Balear, esta lagartija también presenta poblaciones muy diferenciadas que, prácticamente, constituyen una subespecie distinta en cada islote. Se han contabilizado 35 formas diferentes. Las de Ibiza tienen el morro bastante

apuntado. Algo rechoncha.

Coloración verdosa con amarillos y manchas negras que forman bandas. Partes ventrales muy claras de color amarillento o anaranjado. Hay ejemplares negros.



Islotes de Ibiza y Formentera en los que sólo hay maquis mediterráneo.



Lagarto Verdinegro

Lacerta schreiberi

Longitud: 40 cm.

Estilizado lagarto de cabeza corta. Los machos adultos son verdes muy moteados de negro, como en la especie anterior, en época de celo adquieren una mancha azul en la zona gular.

Las hembras resultan más parduzcas o verdosas, con dos anchas bandas salpicadas de motas negras. Ventralmente ambos sexos son amarillentos, con puntaduras negras. Los jóvenes son pardo-verdosos, con numerosos puntos blancos en el cuerpo bordeados de negro.

Vive en prados
húmedos de zonas
montañas.

Sólo en
la cornisa
cantábrica

Lagartija de Turbera

Lacerta vivipara

Longitud: 180 cm.

Cabeza pequeña y morro achatado. Dorso parduzco con una línea de manchas oscuras y bandas más oscuras en los costados. La zona ventral en las hembras resulta amarillenta y en los machos rojiza con motas negras. Los jóvenes son prácticamente negros.

Zonas muy encharcadas,
prados con matorrales

Lagarto Verde

Lacerta viridis

Longitud: 40 cm.

Lagarto de mediano tamaño, ágil, esbelto y de cabeza alargada. En los adultos domina la coloración verde muy intensa,

con infinidad de máculas negras. En época nupcial, los machos exhiben una mancha azul en la garganta. Zona ventral amarillenta en ambos sexos. Los jóvenes son parduzcos o grisáceos.

Ocupa la mayor
parte de los biomas,
desde la alta montaña
(1.600m) hasta
el litoral



Lagarto Ocelado

Lacerta lepida

Longitud: 60 cm.
máx. 90 cm.

El más conocido y abundante de los lagartos ibéricos, se caracteriza por su corpulencia.

La cabeza es ancha y prominente, sobre todo en los machos.

Dominan en su librea los tonos verdosos claros con abundantes marcas negras. En los costados, se alinean longitudinalmente varias series de grandes ocelos azules. Zona ventral amarillenta.

Los jóvenes son verdinegros con manchas blancas.





Prefiere suelos muy
degradados, con
matorrales dispersos

Lagartija Cenicienta

Psammodromus hispanicus

Longitud: 15 cm.

Pequeña lagartija de cabeza
pequeña y morro poco apuntado.

Parduzca o cenicienta, con
bandas ocráceas a los lados,
tachonadas de blanco y negro.

Vientre amarillento. Los machos,
en primavera, adquieren tonos
verdosos.

Lagartija Colilarga

Psammodromus algirus

Longitud: 27 cm.

Recibe este nombre porque la
cola puede llegar a medir hasta
tres veces más que el cuerpo.

Tonos parduzco-claros con bandas
laterales más claras y zona
ventral blancuzca. En época
nupcial, los machos presentan
manchas azules en la parte
anterior del cuerpo.

Matorrales de tipo
mediterráneo

Muy vegetariano.


Muy parecido al Lagarto Gigante pero considerablemente más pequeño. Muy llamativo por las bandas transversales, de color azul pálido, que lucen los adultos. Los jóvenes sólo tienen dos líneas longitudinales claras sobre un fondo grisáceo. Los machos tienen la cabeza de color castaño y la garganta amarillenta.

Canarión
Lacerta stehlini
Longitud: 45 cm.



En la actualidad viene sufriendo una drástica disminución

En Canarias se cita una rica herpetofauna cuya manifestación más espectacular es el Lagarto Gigante de la isla de Hierro, que podía alcanzar con cierta frecuencia el metro de longitud.



Aunque se le dio por desaparecido afortunadamente han sido localizados unos pocos ejemplares que evidentemente merecen la mayor protección. Son grandes saurios casi negruzcos con algunas manchas amarillos en los costados.

El Lagarto Tizón resulta muy compacto con el morro largo. Tonos pardos oscuros con bandas transversales verdosas y dos hileras de grandes ocelos azules

Tizón

Lacerta galloti

Longitud: 30 cm.

Muy abundante en todos los ambientes isleños



Lagarto de Haria

Lacerta atlántica

Longitud: 24 cm.

Sólo en Fuerteventura y Lanzarote. Ocupa zonas muy degradadas



El lagarto de Haria resulta bastante pequeño y estilizado, con el morro muy largo. El dorso es pardo-oscuro, con algunas motas blanquecinas, en el centro de las cuales aparece una mota

negra que dibuja un llamativo festón al unirse a las bandas claras de los costados. La garganta es blanca y la zona ventral oscura. Los machos en celo presentan grandes ocelos azules.

Eslizón Tridáctilo

Chalcides chalcides

Longitud: 40 cm.

Cuerpo muy largo en el que apenas pueden distinguirse las casi atrofiadas patas. Pardo verdoso, con varias líneas longitudinales negras.

Detalle de
cabeza ↓




No hay ninguna
especie de
Eslizón en
Baleares



Zonas húmedas y
herbosas, preferentemente
en montañas



Detalle de
pata



Muy robusto y redondeado. Tonos verdosos o parduzcos claros con una línea dorsal punteada de ocelos blancos. En los costados aparece otra línea más oscura. El vientre es blanquecino.

Muy abundante
en zonas costeras
mediterráneas



Eslizón Ibérico
Chalcides bedriagai
Longitud: 14 cm.


Eslizón Canario
Chalcides viridanus

Longitud: 23,5 cm.

El menos alargado de los eslizones. Morro bastante achatado, cola bastante corta y patas bastante desarrolladas. El dorso es pardo con múltiples ocelos de color azul enmarcados en negro. Partes ventrales casi negras o grisáceas.

En todas las
islas menos
en La Palma






Equipo

Pupila de Salamandresa

← La pupila vertical de las salamandresas denota su actividad nocturna.


Mandíbulas


Aunque desdentados, el aparato bucal de lagartos y lagartijas presenta fuertes mandíbulas capaces de triturar alimentos y de dar muerte a presas de considerable tamaño.



Muda de Lagarto

Como en el caso de los ofidios, la muda de la piel resulta también imprescindible a los lagartos y lagartijas que por este proceso renuevan el tejido más utilizado.





Disposición de las
escamas cefálicas
en el Eslizón
Canario
←



Patas de Salamandrina

Los sistemas de locomoción han
conformado las extremidades de
los saurios de formas
notablemente diferentes.



Dedos de Salamandrina

Las salamandras pasan la mayor
parte de su vida sobre
superficies lisas y verticales
por las que se desplazan con
toda facilidad gracias a la
especial estructura de sus dedos,
armados, en el caso de la
Salamandrina Costera de finos
ganchos, que desaparecen en
algunos dedos de la Común y
sobre todo, de unas laminillas
completamente plagadas de
minúsculos ganchitos, que tienen
una función adhesiva.




Dedos de Colirroja

Los largos dedos de la Lagartija
Colirroja le permiten correr a
gran velocidad por los suelos
arenosos en los que suele vivir.

Lagarto Verde



Lagarto Verdinegro



Lagartija Roquera



Lagartija de Turbera



Lagarto Ágil



Salamanquesa Común



Lagartija Serrana



Lución



Montaña




Bosque de coníferas



Bosque caducifolio



Bosque mediterráneo



Distribución ecológica

018016.

NO CIRCULANTE



Lagartija Cenicienta



Lagartija de las Pitiusas



Lagartija Colirroja

Lagartija Balear



Culebrilla Ciega



Salamanquesa Costera



Estepa

Ríos, lagos
y marismas

Costa



590
Pod
e
T. 50.

Distribución geográfica:



Península ibérica




Posición ecológica

Los consumidores primarios

Como depredador de insectos la Salamandresa Común ocupa en la pirámide ecológica una posición clásica de consumidora primaria

que puede, a su vez, ser capturada por consumidores secundarios clásicos como las rapaces diurnas, las nocturnas y los mustélidos.



El Lagarto Ocelado

Una de las particularidades más sobresalientes de las cadenas alimentarias en el bioma mediterráneo es la presencia casi constante de reptiles en la dieta de la mayoría de los predadores.

Algunos muy abundantes, como el Lagarto Ocelado, se han convertido —a partir de la disminución de la población de conejos por el catastrófico efecto de la mixomatosis— en una pieza clave de todo el ecosistema.

Ratonero



Aguila Perdizera



Aguila Real



Lagarto Ocelado



Insectos



otros lagartos



Huevos



Pollos

Vegetación mediterránea



Alimentación

A excepción de los grandes lagartos, que son capaces de alimentarse incluso de otros vertebrados, la alimentación de lagartijas, gecónidos y lagartos resulta predominantemente entomófaga.

Lagartija Colirroja


Hormigas 60%
Coleópteros 18%
Ortópteros 5%
Larvas y pupas 10%
Varios 7%



Salamanquesa Común

Tijeretas 25%
Mariposas 15%
Escarabajos 28%
Arañas 5%
Hormigas 6%
Termes 3%
Cigarras 3%
Cochinillas 21%
Humedad 1%





Lagartija Colilarga


Coleópteros 55%
 Hormigas 15%
 Ortópteros 7%
 Varios 23%



Lagarto Ocelado

Huevos
 Pollos
 Coleópteros
 Ortópteros
 Dípteros

} sin %.



Lombrices




ALIMENTACIÓN GRANDES LAGARTOS

El régimen alimentario de los grandes lagartos es básicamente insectívoro, con predominio en él de coleópteros y ortópteros, pero su gama de presas es notablemente amplia, de tal manera que puede considerarse como omnívoro.



Escorpiones



Miriápodos



Pollos
de aves



Salamandras


Otros
lagartos

Técnicas de caza

Lagarto Ocelado

Aunque con mucha menos frecuencia de lo que suele estimarse, el Lagarto Ocelado saquea los nidos de muchas aves.


Lagarto Ocelado
Caza coleóptero.



Eslizón atrapa
a caracol.

Eslizón

Repta por el herbazal para acceder a los pequeños moluscos que constituyen su principal alimento.



Salamanquesa Común


Favorecida por su considerable mimetismo, la inmovilidad es el principal recurso de la Salamanesa para sus nocturnas correrías de caza.



*Culebrilla Ciega
penetra en
hormiguero*

Culebrilla Ciega

Bajo la hojarasca, por entre las piedras y en galerías subterráneas la Culebrilla Ciega se alimenta de larvas, lombrices y, sobre todo, de hormigas.



Técnicas defensivas

Gritos

Las salamanguetas emiten, si son capturadas, unos fuertes y agudos gritos que en muchas ocasiones hacen soltar la presa a sus atacantes. Estos gritos,

que pueden ser transcritos como una especie de «gec-gec», son los responsables de la denominación popular de *gecos* que reciben estos reptiles.



Pérdida de la cola

En muchas ocasiones los predadores de lagarto han de contentarse con su cola, pues pueden desprenderse con toda facilidad de su largo apéndice gracias a que en las vértebras

Lagartija fractura voluntariamente su cola para escapar al ataque del mustélido.

existe un punto por donde pueden producirse una automutilación rapidísima que no entraña peligros para el reptil. Más tarde podrán regenerar el apéndice perdido.

Mimetismo

La dermis de los lacértidos y geos no sólo resulta de la misma coloración que el ambiente donde viven, sino que, en el caso de las Salamanquesas, puede cambiar de tono según la mayor o menor incidencia de la luz contribuyendo aún más a su homocromatismo.

*Salamanquesa
sale de su refugio
en la corteza
levantada de un
árbol.*

Lagarto Ocelado se sube a un árbol

Con cierta frecuencia los lagartos se ponen a salvo de sus perseguidores trepando, con pasmosa velocidad, por los troncos de los árboles.



Zorro



Lagarto

*Lagarto hace
frente y abre
desmesuradamente
sus potentes
mandíbulas.*

Agresividad del Lagarto


Los grandes lagartos pueden presentar una eficaz defensa activa haciendo frente a sus atacantes.

Paradas nupciales



La agresividad ya de por sí alta entre los eslizones aumenta en la época de los apareamientos. Para vencer al competidor basta con que éste adopte una postura de sumisión que consiste en

ofrecer la cola que es el apéndice que en estos combates los eslizones siempre intentan morderse. Resulta muy frecuente, en cualquier caso, la pérdida de la cola en estos enfrentamientos.



Ardorosos, los machos de Salamandresa Común luchan por delimitar sus territorios en la época de apareamiento. Se yerguen con las colas muy levantadas e intentan morderse y se persiguen.

Son muchos los casos de adquisición de una llamativa librea nupcial entre los lagartos y lagartijas. Como sucede entre otros grupos taxonómicos, la principal misión de este cambio en la coloración general del cuerpo cumple la misión de atraer al sexo opuesto.


Dimorfismo sexual muy atenuado.




El dimorfismo sexual resulta también un fenómeno frecuente entre los lagartos. Como regla general, puede afirmarse que, a excepción del Lución, los machos resultan más grandes que las

hembras, tienen la cabeza más ancha y la base de la cola difiere por la presencia de los hemipenes, es decir, los dos penes propios de estos reptiles.

Cuadro cronológico




Salamandresa Común



Lagartija Colirroja



Lagartija Roquera



Lagarto Ocelado







Lagarto Ágil



■ *Letargo*


■ *Epoca de puesta*

del ciclo de la reproducción



■ Incubación ■ Nacimientos


Encames, guaridas y huras



Tapias y muros

También son el refugio
ideal para que los
legionarios instalen sus guaridas

Las huras abandonadas
por los conejos pue-
den ser ocupadas
por los grandes
ejemplares
de lagarto
ocelado






A las Salamandras que generalmente se ocultan en muros o bajo piedras pueden bastarles la corteza parcialmente levantada de un árbol para instalar su guarida



En agujeros de árboles también encuentra refugio el Lagarto ocelado


Huevos TABLA DE PUESTA -

Especie	CUANTIA PUESTA	DIMENSION HUEVOSmm	INCUBACION dias	ASPECTO Observaciones
Salamanguesa Cost.	2-3	10x9	120-130	Lasos y blancos
Salamanguesa Com.	2(Abril)	2(Junio) 13x10	120	Rugosos
Lucián	OVOVIVÍPAROS -		90	La ♀ pare. de 5-25 crías
Culebrilla Ciega	1	27x5	?	Blanco
L ^a Colitroja	6-7	15x9	30-60	-
L ^a Agil	5-14	14x10	40-60	-
L ^a Ibérica	2	12x6	63	-
L ^a Roquera	3-9	12x6	63-77	-
L ^a Tubera	3-15	que ponen poco antes de la (15x19) eclosión o paren a sus crías		
L ^a Ocelado	17-18	22x12	Muy irregular	-
L ^a Verde	6-21	17x10	60-100	-
Eslizón Tridact.	Las ♀ de 4 a 15 crías			



Puesta de
Lacerta
viridis
(Lagarto
verde)
←





Huevo de *Blanus
cinereus*
(Culebrilla ciega)



Parte de *Anguilla fragilis*
(Lución)


Jóvenes



JOVEN DE VERDINEGRO

Francamente diferente a sus progenitores, el Lagarto Verdinegro parece otra especie. Se caracteriza por el verde esmeralda, por la cola pardo rojiza y por las manchas blancas de los costados

← JOVEN DE LAGARTIJA: Muy llamativo por las franjas longitudinales blancas y por la cola roja, que sólo exhiben las ♀♀ en época de celo. Miden 60-70 mm.



← JOVEN DE OCELADO

Tarda un mínimo de tres a cuatro años en alcanzar la madurez sexual.



Los lacértidos cambian sus libreas a medida que van creciendo. Por regla general las coloraciones de lagartos y lagartijas durante los primeros meses de vida resultan mucho más miméticas, como respuesta a una táctica defensiva muy generalizada: pasar inadvertido.

Enemigos de los reptiles




Tejón



Zorro



Ratonero



Ofidios

Prácticamente todos los carnívoros de tamaño apreciable son potenciales depredadores de reptiles. Representamos aquí algunos de los más frecuentes en nuestro continente. Ocasionalmente también algunos inverte-



Meloncillo

brados pueden
causar daños
a las pobla-
ciones de

lagartos y lagar-
tijas en sus fases
de huevos y
jóvenes.



Armiño



Azor

NO CIRCULANTE

CLASIFICACIÓN Y NOMENCLATURA

FAMILIA	ESPECIE	CIENTÍFICO	POPULARES	CATALAN	GALLEGO/BABLE	VASCO
GEKKÓNIDAS	<i>Hemidactylus turcicus</i>	Salamanquesa Costera	Salamanquesa Salamanquina Salharrostro	Dragó		Erube Eruge Apoixali
	<i>Tarentola mauritanica</i>	Salamanquesa Común				
	<i>Tarentola delandii</i>	Perinqué				
ÁNGUIDAS	<i>Anolis fragilis</i>	Lución	Serpiente de Vidrio	Noia Llisona Lliseia Serp de Vidre	Alagüeru Escalibieru Escalamueru Escolancio	Ziraun Suge-itsu Suge-urdin
AMPHISBÁNTAS	<i>Blanus cinereus</i>	Culebrilla Ciega	Anfibrena			
LACÉRTIDAS	<i>Lacerta agilis</i>	Lagarto Agil	Lagarto	Llangardaix	Lagarto	Musker
	<i>Lacerta schreiberi</i>	Lagarto Verdinegro	Fardacho	Lluert	Llagartu	Suge-musker
	<i>Lacerta viridis</i>	Lagarto Verde	Gardacho	Fardaxo		
	<i>Lacerta lepida</i>	Lagarto Ocelado	Garrobo			
	<i>Lacerta atlantica</i>	Lagarto de Haria	Zargatacho			
	<i>Lacerta simonyi</i>	Lagarto Gigante de Hierro	Segardacho			
	<i>Lacerta stehlkini</i>	Lagarto Canarión	Alagarto			
	<i>Lacerta galloti</i>	Lagarto Tizón	Lardacho			
	<i>Lacerta hispanica</i>	Lagartija Ibérica	Lagartija	Sargantana	Lagartixa	Suangilla
	<i>Lacerta bilfordi</i>	Lagartija Balear	Sarganessa		Llagartexa	Sugandilla
	<i>Lacerta monticola</i>	Lagartija Serrana	Segundilla			Sugelinda
	<i>Lacerta muralis</i>	Lagartija Roquera	Zarganessa			Suge-angira
	<i>Lacerta pitiusensis</i>	Lagartija de las Pitiusas	Sigartana			Surangilla
	<i>Lacerta vivipara</i>	Lagartija de Turbera	Sagartana			Txarrangilla
	<i>Acanthodactylus erythrus</i>	Lagartija Colirroja				
SCINCIDAS	<i>Alyroides marchi</i>	Lagartija de Valverde				
	<i>Psammotromus algyrus</i>	Lagartija Colliarga				
	<i>Psammotromus hispanicus</i>	Lagartija Cenicienta				
	<i>Chalcides hadriacqi</i>	Esilzón Ibérico	Esilzón			
	<i>Chalcides chalcides</i>	Esilzón Tridáctilo	Sepeidón			
	<i>Chalcides viridianus</i>	Esilzón Cabarro	Spedón			

Cuadernos de Campo del Dr. Félix Rodríguez de la Fuente

Títulos de la colección:

- 1 - El Lince y el Gato Montés
- 2 - Grandes Águilas
- 3 - El Lobo
- 4 - Rapaces Nocturnas
- 5 - El Jabalí
- 6 - Pájaros Carpinteros
- 7 - La Cabra Montés y el Muflón
- 8 - Los Pájaros del Bosque (I)
- 9 - Víboras y Culebras
- 10 - Los Buitres
- 11 - El Zorro
- 12 - Aves de la Estepa
- 13 - Pequeños Carnívoros
- 14 - Peces de Río
- 15 - Pájaros de Medio Urbano
- 16 - El Quebrantahuesos y el Alimoche
- 17 - Los Córvidos
- 18 - Peces de Lagos y Marismas
- 19 - Halcones y Cernícalos
- 21 - Las Garzas
- 22 - Pequeñas Águilas
- 23 - Las Grullas
- 24 - Liebre y Conejo
- 25 - Los Patos
- 26 - Pájaros del Bosque (II)

Cada miércoles en su quiosco o librería



EDITORIAL MARIN S.A.