




Dr. Félix Rodríguez de la Fuente

CUADERNOS DE CAMPO

PÁJAROS DE LA MARISMA



EDITORIAL MARIN S.A.

♂ de Escribano Palustre
en posadero.

Emite canto nupcial

Pantano del Ebro

Santander

Mayo 1977



Pájaro Moscón
en su nido
recién termina-
do.

Cerca de Arganda
(Madrid) abril
1976



Cuaderno de Campo
del Dr. Félix Rodríguez de la Fuente

PAJAROS DE LA MARISMA

27



Carricerín
Común
Primera
observación
del año 1974
finales de Marzo

Albufera de
Valencia



EDITORIAL
MARIN, S.A.

Sumario

Notas de campo	2
Aspecto y dimensiones	6
Equipo	18
Distribución ecológica del marjal	20
Distribución geográfica	22
Territorios	24
Alimentación	26
Técnicas de caza	28
Paradas nupciales	30
Cuadro cronológico	34
Nidos	36
Huevos	40
Pollos	42
Otros pájaros del carrizal	44
Comparación de siluetas	46
Clasificación y nomenclatura	48



Cola de Buscarb Unicolor
Rasgo útil para la identificación en mano.

Donativo

018073-02 \$500

990316.




Cola de Buitron
Todas las rectrices
tienen una mota negra
subterminal.

CUADERNOS DE CAMPO DEL DR. FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE

Idea y diseño de Editorial Marín, S. A.
Ilustración color NESLÉ SOULÉ
Dibujos negro Juan Manuel Varela
Coordinación Joaquín Araujo
Dirección Félix Rodríguez de la Fuente
© EDITORIAL MARÍN, S. A. 1978
Nicaragua, 85-95, Barcelona-29, Spain
ISBN 84-7102-500-0 la Colección
ISBN 84-7102-527-2 Pájaros de la Marisma
Impreso por Artes Gráficas Toledo, S. A.
Depósito Legal: To- 411 - 1978
Distribuido por Marco Ibérica, D. de E., S. A.

Precio: 100,- Ptas.



♂ de Escribano
Pelustre. Dimorfismo

NOTAS DE CAMPO

♂ de *Buscarla Pintoja*

Postura de exhibición
durante las ceremonias
de cortejo



CANTO DE BUSCARLA

zrrrzrrrzrrrzrrrzrrr...

Canto parecido al de "chicharra" o "grillo". Es la mejor forma de detectar a la *Buscarla Unicolor*. Parece un zumbido de aparato mecánico.

Carricero salta desde su posadero en persecución de un lepidóptero



sexual muy patente



La Naturaleza llega a la mente y al corazón del naturalista a través de todos los sentidos.

Porque la Naturaleza es color, sonido, olor y tacto. Resultaría difícil matizar, en el arcano de los recuerdos de un viejo tramundos, si es una imagen óptica, un recuerdo

acústico, un perfume natural o el simple crepitar de la hierba seca bajo el calzado, la más profunda e impercedera de las impresiones que el amante de la NATURALEZA atesora en la memoria.

Al escribir acerca de las ares de la misma me asalta avasalladoramente la música crepuscular del medio palustre en primavera. En la compleja y a la vez coordinada sinfonía de gorjeos,

llamadas, quejas, desafíos, que emergen del mundo de los carrizos y las espadañas, destacan las estrofas monótonas, imperativas, posesivas, del Carricero Tordal.

Sucanto se destaca en el conjunto del fondo musical de la marisma pero tiene infinitos puntos de contacto con el coro básico: el croar de las ranas y de los sapos.

¿Porqué los Carriceros y las Buscarlas, ciertamente capaces de emitir gorjeos diferenciados, coinciden no obstante en un fondo común que recuerda al croar de los batracios? ¿A caso por una selección implacable de las notas mejor audibles en el medio palustre? En tal caso el biólogo hablaría de una evolución convergente ¿pero no se debería esta evidente coincidencia acústica al hecho de que cuando Carriceros y Buscarlas aprendieron a gorjear llevaban ya millones de años las ranas y los sapos? Porque todo el mundo sabe que los pájaros son imitadores natos.





Carricerín Real

Luscinia melanopogon

Altura:	12 cm
Peso:	11 gr
Ala:	57 mm
Envergadura:	18 cm
Pico:	13 mm
Tarso:	20 mm
Cola:	52 mm

Muy similar al Común, pero con caja blanca, muy ancha, que contrasta con el negro pileo. También resulta más pardo y listado en dorso. Cola cortada y lobulada. Alas muy pequeñas y redondeadas.

El Carricerín Real
es un ave de conduc-
ta tan escondediza que
todavía se desconocen
muchas facetas de su
biología. Los ornitólogos
españoles tienen preci-
samente la oportunidad
de investigar la vida
de este pájaro que
resulta muy abundan-
te en los carrizales
del levante español.

Carricerín Común

Acrocephalus schoenobaenus

Altura:	12 cm
Peso:	12 gr
Ala:	65 mm
Envergadura:	19 cm
Pico:	14 mm
Tarso:	23 mm
Cola:	50 mm

Pequeño, pardo claro. Ceja poco marcada sobre la cabeza y píleo claros. El dorso resulta oliváceo y carece de listas patentes. Pecho y partes ventrales, blancas.



Ceja blanca
muy marcada

Dorso
moteado

Pecho
blanco

Cola
estrecha

Pileo estriado

Alas muy anchas

Cola muy corta

Pecho blanco

Parece estar en expansión en Europa

Buitrón

Cisticola juncidis


Altura:	11 cm
Peso:	8,5 gr
Ala:	48 mm
Envergadura:	13 cm
Pico:	10 mm
Tarso:	16 mm
Cola:	40 mm

Diminuto, pero de conducta llamativa y canto muy fácilmente reconocible. Pardo ocráceo, muy listado en el dorso. En la cabeza se escalonan varias bandas claras y oscuras. Cola, muy corta, redondeada.

Detalle
cola

Infracobertoras cortas

Motas en el extremo




Carricero Polígnota
Acrocephalus palustris

Altura:	13 cm
Peso:	12,5 gr
Ala:	65 mm
Envergadura:	19 cm
Pico:	15 mm
Tarso:	22 mm
Cola:	53 mm

Muy estilizado

Prácticamente idéntico al Común, aunque resulta algo más verdoso. El color de las patas es el único rasgo de campo fiable, pues en este Carricero son rosáceas y en el Común, negruzcas.




Carricero Común

Acrocephalus scirpaceus

Altura:	13 cm
Peso:	14 gr
Ala:	66 mm
Envergadura:	19 cm
Pico:	16 mm
Tarso:	22 mm
Cola:	51 mm

Pardo claro por el dorso. Cola más larga y afilada que otras especies palustres. Puede distinguirse un anillo ocular blanquecino. Pecho y partes ventrales, blancas.

Moño, ligeramente,
marcado
← ceja conspicua
Grande, robusto,
pardo jaspeado.




Carricero Tordal

Acrocephalus arundinaceus

Altura:	19 cm
Peso:	30 gr
Ala:	96 mm
Envergadura:	28 cm
Pico:	23 mm
Tarso:	29 mm
Cola:	75 mm

El más corpulento de los pájaros del carrizo. Ceja bastante marcada. Pardo claro por el dorso. La cabeza da la sensación de estar ligeramente crestada. Pico robusto.



Bigotudo


Panurus biarmicus

Altura:	16 cm
Peso:	14 gr
Ala:	58 mm
Envergadura:	18 cm
Pico:	8 mm
Tarso:	21 mm
Cola:	78 mm

Ave de llamativo dimorfismo sexual. El rasgo más conspicuo es su larga cola. Pardo leonado por el dorso en ambos sexos. El macho tiene la cabeza gris azulada, con dos vistosos bigotes negros. Pico corto y amarillo. La hembra resulta prácticamente parduzca.



Antifaz
del ♂
muy
marcado



Cola
recta

Pájaro Moscón

Remiz pendulinus

Altura:	11 cm
Peso:	8 gr
Ala:	56 mm
Envergadura:	16 cm
Pico:	11 mm
Tarso:	15 mm
Cola:	50 mm

Dorso
pardo

Antifaz poco
desarrollado



Pequeño, de cola relativamente larga. Cabeza grisácea, con antifaz negro. Partes ventrales, ocráceas, claras. Dorso, castaño vivo.

Escribano Palustre

Emberiza schoeniclus

Altura:	14 cm
Peso:	18 gr
Ala:	♂ 80/♀ 75 mm
Envergadura:	24 cm
Pico:	11 mm
Tarso:	20 mm
Cola:	65 mm



Cola corta y
redondeada



Ruiseñor Bastardo

Cettia cetti

Altura:	13 cm
Peso:	14 gr
Ala:	60 mm
Envergadura:	13 cm
Pico:	13 mm
Tarso:	21 mm
Cola:	60 mm

Pequeño, parduzco, muy difícil de localizar. El dorso resulta más rojizo. Cola, algo más larga que en *Buscarla* y *Buitrón*, pero también redondeada. Lista ocular poco patente. Pecho y partes ventrales, blancuzcas.

Pecho
blanco

Pardo homogéneo
en dorso, píleo
y cola.



La cola
del Ruiseñor
Bastardo tiene
sólo 10 rectrices y no 12.

Fuerte, rechoncho, de alas largas y cola recta. El macho tiene, en verano, la cabeza y babero negros con zona intermedia blanca, que se extiende por bigotera y collar. Dorso, pardo rojizo, muy moteado de tonos

ocráceos y negros. Borde de la cola, blanco.

La hembra presenta mismo diseño excepto en la cabeza, que es parda, con ceja y bigoteras blanquecinas.

Equipo Bigotudo



Buitrón



↖
Puede consumir
tanto granos y semillas
como invertebrados



Escribano

Palustre

Pico granívoro

(consume principalmente
semillas)



Carricero



Ruisenon
Bastardo



Colas

La protección que ofrece la gran cobertura vegetal de las zonas palustres no obliga a grandes maniobras, a los pájaros que en ella habitan. Las colas, es decir, los timones direccionales en el vuelo, son muy pequeñas y redondeadas.

Buscarla
Pintoja



Escribano
Palustre




Buitrón



Colores crípticos

Todas las aves del marjal son pardas y pasan fácilmente inadvertidas entre ese mundo de infinitas cañas. Sólo el canto, muy sonoro y variado, permite el reconocimiento intra e interespecífico.

Distribución ecológica del marjal



Bordes de marjal con
vegetación no palustre


Aunque muy sutiles, dada la homogeneidad de las zonas palustres, también los pájaros del marjal se distribuyen por nichos ecológicos diferentes, que permiten un reparto equitativo de los recursos sin que se produzcan graves enfrentamientos.




Riberas herbosas

Distribución


Buscarla Unicolor




Carricerin Común




Buscarla Pintoja




Buitrón



Carricerin Real




Carricero Poliglota



geográfica


Carricero Común




Pájaro Moscón




Carricero Tordal



Escribano Palustre



Bigotudo



Ruiseñor Bastardo




590
Vol
C
127

018023

NO CIRCULANTE

Territorios






Carricero Tordal _____
Bigotudo - - - - -
Buscarla Unicolor x x x x x x x x x x
Buitrón

En las Tablas de Daimiel los territorios de la mayoría de los pájaros del carrizal comprenden no sólo porciones de tierra, sino también de agua. En este mapa hemos considerado tierra firme amplias zonas cubiertas de vegetación palustre que proporcionan soporte suficiente a estas aves, tanto para nidificar como para extender por ellos sus cazaderos.

Alimentación

Los pájaros del carrizo que no migran hacia latitudes de clima más benigno, sufren una transformación fisiológica realmente sorprendente. Cambian, en efecto, la


estructura de su estómago, para poder asimilar los productos vegetales que constituirán su dieta base. El Bigotudo es el más genuino ejemplo de esta adaptación.





BIGOTUDO

INVIERNO




Frutos

Semillas

Y bayas
silvestres

VERANO

Insectos



Larvas



Crustáceos

Puestas de
anfibios



Pequeños

moluscos y crustáceos



Técnicas de caza



CAPTURA EN VUELO

Todo el que dedique algunos momentos a la observación de una zona palustre, verá emerger ocasionalmente alguno de sus moradores alados que, como catapultado, se apresta a capturar algún insecto volador.




CARRICERO
DESPES
CAÑA

Los carriceros
toman de la
superficie del
agua muchos insectos
e invertebrados.
Para alcanzar este tipo
de presas, bajan por las
cañas hasta muy cerca del
líquido elemento.

ESCRIBANO PALUSTRE
EN BARBECHO

La dieta invernal del
Escribano Palustre es básicamente
granívora, hasta el punto de que
puede llegar a ocasionar consi-
derables daños en los
sembrados de
cereal.



Paradas nupciales




CARRICERÍN COMÚN

El Carricerín Común realiza un vuelo nupcial perfectamente reconocible por su trayectoria parabólica.



Buscarla Pintoja

La Buscarla Pintoja macho realiza esta difícil exhibición durante la parada nupcial. Aletea suavemente con las alas semivueltas hacia adelante y muestra, a su futura pareja, la base de la cola, plegándola en dirección contraria a la normal.



Carricero Tordal

Los machos de Carricero Tordal preceden a las hembras en sus viajes migratorios. Una vez alcanzado el paraje de cría, el macho toma posesión de un pequeño territorio y proclama, con su insistente canto, los derechos de propiedad sobre esa porción de marjal, de la que excluirá a otros machos y a la que intentará atraer a una hembra.

BUITRÓN

El Buitrón es una de las aves de las zonas palustres más fácilmente identificables por la trayectoria marcadamente ondulada de su vuelo, que acompaña de un canto monótono que hace coincidir con las fases culminantes del vuelo.

zip!



zip!

zip!

MANIFESTACIONES NUPCIALES

CANTO NUPCIAL DE ESCRIBANO PALUSTRE →

Escribano Palustre

La combinación de la pechera negra y el llamativo canto del macho de Escribano Palustre, actúan como atractivo para la formación de las parejas.



♂ de Escribano
Palustre reclama
desde su visible
posadero




♂

Amenaza de Carricero Tordal

La erección de las plumas occipitales tiene un claro significado de irritación entre los machos de Carricero Tordal, que es el más exhibicionista de los pájaros del carrizal.

*Buscarla Unicolor en
poroxismo nupcial*




BUSCARLA UNICOLOR


Para contrarrestar su homocromatismo, la Buscarla Unicolor procura llamar la atención de su futuro consorte con posturas muy llamativas como ésta, que se realiza enteramente en el suelo, mientras aletea suavemente y levanta alternativamente la cola.

Cuadro cronológico del


Carricerín Común




Carricero Tordal




Bigotudo



Pájaro Moscón



Escribano Palustre





■ Celo y construcción nidos
 ■ Incubación
 ■ Pollos

ciclo de reproducción



Julio Agosto Sept




Julio Agosto Sept




Julio Agosto Sept



Julio Agosto Sept



Julio Agosto Sept





Nidos

Nido de *Buscarla Unicolor*

$H = 6 \text{ cm}$


$h = 2 \text{ cm}$

$D = 12 \times 10 \text{ cm}$

$d = 7 \times 8 \text{ cm}$



Directamente sobre el
suelo muy cerca del agua.
A veces consta de un ligero
techo.



Nido de *Escribano Palustre*

$H = 7 \text{ cm}$

$h = 3 \text{ cm}$

$D = 15 \times 12 \text{ cm}$

$d = 8 \times 9 \text{ cm}$

Directamente en el
suelo al amparo de la
vegetación ribereña.



Nido de Carricero Común

Aprovecha como
soporte los tallos
de las plantas
palustres. Muy
alargado. →



Nido de Carricero Tordal

Grande sólidamente
anclado a tallos
que suele trabar
de dos en dos. ←



Nido de Buitrón

A muy poca altura
del suelo. Generalmente
construido con telas de
araña y briznas vegetales

$H = 9\text{ cm}$


$h = 6\text{ cm}$

$D = 4 \times 4\text{ cm}$

$d = 4 \times 4\text{ cm}$



El nido más sofisticado de todos los contruidos por aves europeas es, sin duda, el del Pájaro Moscón. Utilizando borra de los chopos y pelusa de origen vegetal, va conformando una sólida bola a la que dota, finalmente, de un tubo de acceso.



Nido terminado




PAJARO MOSCÓN

1ª fase
Elección
de soporte



2ª fase. Dura
hasta la construc-
ción de la bolsa
que servirá de
cámara donde
se alojarán
huevos y pollos



3ª fase

El largo túnel de
acceso al nido es
la última parte
construida



Túnel
→

Entrada
al túnel
de acceso
→

Cámara
←

Huevos



Buscarla Unicolor *Locustella luscinioides*

N.º normal: 4/5
extremo: 3/6
Tamaño: 20×14 mm
2.ª puesta: Sí
Incubación: ♀ 12 días
Pollos vuelan a: 14 días



Buscarla Pintoja *Locustella naevia*

N.º normal: 6
extremo: 4/7
Tamaño: 18×14 mm
2.ª puesta: Sí
Incubación: ♂♀ 13/15 días
Pollos vuelan a: 12 días

Carricerín Real *Luscinola melanopogon*

N.º normal: 3/4
extremo: 5/6
Tamaño: 17×13 mm
2.ª puesta: Sí
Incubación: ?
Pollos vuelan a: 12 días



Carricerín Común *Acrocephalus schoenobaenus*

N.º normal: 5/6
extremo: 3/8
Tamaño: 18×13 mm
2.ª puesta: No.
Incubación: ♀♂ 13/14 días
Pollos vuelan a: 12 días



Buitrón *Cisticola juncidis*

N.º normal: 4/6
extremo: —
Tamaño: 15×11 mm
2.ª puesta: Sí. Hasta 3.ª.
Incubación: ♂♀ 10 días
Pollos vuelan a: 10/12 días

Carricero Políglota *Acrocephalus palustris*

N.º normal: 4/5
extremo: 3/7
Tamaño: 20×14 mm
2.ª puesta: No.
Incubación: ♂♀ 12 días
Pollos vuelan a: 14 días



Carricero Común
Acrocephalus scirpaceus

N.º normal: 4
extremo: 3 / 6
Tamaño: 18 x 13 mm
2.ª puesta: No.
Incubación: ♂ ♀ 11 días
Pollos vuelan a: 13 días



Bigotudo
Panurus biarmicus

N.º normal: 5 / 7
extremo: 12
Tamaño: 18 x 14 mm
2.ª puesta: Sí. Hasta 3.ª
Incubación: ♀ 13 días
Pollos vuelan a: 13 días



Carricero Tordal
Acrocephalus arundinaceus

N.º normal: 4 / 6
extremo: 3
Tamaño: 23 x 16 mm
2.ª puesta: No.
Incubación: ♂ ♀ 14 días
Pollos vuelan a: 13 días



Pájaro Moscón
Remiz pendulinus

N.º normal: 6 / 8
extremo: 5 / 10
Tamaño: 16 x 11 mm
2.ª puesta: Rara.
Incubación: ♀ 13 días
Pollos vuelan a: 18 días

Escribano Palustre
Emberiza Schoeniclos

N.º normal: 4 / 5
extremo: 6 / 7
Tamaño: 20 x 15 mm
2.ª puesta: Sí. Hasta 3.ª
Incubación: ♀ 13 días
Pollos vuelan a: 13 días



Ruiseñor Bastardo
Cettia cetti

N.º normal: 4
extremo: 3 / 5
Tamaño: 18 x 14 mm
2.ª puesta: No.
Incubación: ♀ 13 / 15 días
Pollos vuelan a: 12 / 14 días

Pollos



Escribano Palustre

Estimulada por las llamativas fauces de sus polluelos, la ♀ de Escribano Palustre se apresta a cebarlos.

Joven Bigotudo.

Carece de las manchas faciales de los adultos.

No completa el desarrollo de la cola hasta los dos meses de edad.





Esquema bucal del pollo de Bigotudo

Resaltan las punteaduras blancas del velo del paladar y el contraste entre las comisuras amarillentas con el resto de la cavidad bucal rojiza.

Cuco en nido de Carricero

Una de las víctimas más frecuentes del aprovechado Cuco es el Carricero Común, que se afanará para alimentar a su hijo forzoso por mucho que éste apenas quepa en el nido.

Pollo de
Cuco



Nido de
Carricero
apenas pue-
de soportar
a pollo de
Cuco.



Otros pájaros del carrizal

Buscarla de Pallas
Locustella certhiola

Proviene de
Asia y aparece
taramente en
Europa.
Prácticamente
idéntica a la
Pintoja pero
con ceja que
le hace parecer
un Carricerín.



Buscarla Fluvial
Locustella fluviatilis

Del Este de Europa
especialmente en la
Unión Soviética. Muy
parda con algún
matiz oliváceo.
Pequeña lista
ocular



Carricerín Ojudo
Acrocephalus paludicola

Península Itálica
y Europa del
Este. Cea
y lista ocular
negras.
Muy parecido al
Carricerín Común




Carricero Agrícola
Acrocephalus agricola

Solo en el Delta del
Danubio y Volga.
Parecido al Carricero
Común pero más
verdoso y con
lista ocular
más marcada.



Cuadro comparativo de siluetas

Ruisenor Bastardo



Cola: 60 mm
Envergadura: 13 cm


Buitrón

Cola: 40 mm
Envergadura: 13 cm




Pajaro Moscón

Cola: 50 mm
Envergadura: 16 cm




Carricerín Común

Cola: 50 mm
Envergadura: 19 cm



Poliglota

Bigotudo



Cola: 78mm Envergadura: 18cm

Buscarla
Pintoja


Cola: 55mm
Envergadura: 21cm
→



Carricero Común
y Poliglota

Cola: 51-53 mm
Envergadura: 19cm
En vuelo son prácticamente
indiferenciables.


FORMULAS ALARES CARRICEROS



Común



Agrícola



Blyth



Tordal

CLASIFICACIÓN Y NOMENCLATURA

FAMILIA	GENERO	ESPECIE	CASTELLANO	CATALAN	GALLEGO	VASCIENCE	POPULARES
Locustella		<i>luscinioides</i>	Buscarla Unicolor	Boscaler	Salón do Sur	Txarlatazale	
		<i>flaviatilis</i>	Buscarla Fluvial				
		<i>naevia</i>	Buscarla Pintoja	Boscaler Piniat	Salón do Norte	Txarlatazale	Chicharra
		<i>certhiola</i>	Buscarla de Pallas	Boscaler de Pallas		Nabar	
SILVIDOS		<i>agricola</i>	Carricero Agrícola				
		<i>palustris</i>	Carricero Poliglota	Boscarla Menjamosquits		Lezakxori-Ankagorritza	
		<i>scirpaceus</i>	Carricero Común	Boscarla de Canyar	Fulepa Lixeira	Lezakxori	Carricera
	Acrocephalus	<i>arundinaceus</i>	Carricero Tordal	Balquer	Fulepa Grande	Lezakxori Aundi Carriza	Buixeret Carraci,
		<i>schoenobaenus</i>	Carricetin Común	Boscarla	Fulepa das Xunqueiras	Benarriz	
Luscinola		<i>paludicola</i>	Carricetin Cejudo	Boscarla d'Aigua		Ur-Benarriz	
		<i>melanopogon</i>	Carricetin Real	Boscaler Mostaxut	Fulepa Payuda	Benarriz-Kaskobellz	
	Cettia	<i>cetti</i>	Ruiseñor Bastardo	Rosinyol Bastard	Reisehor da Auga	Errekatzindor	Charreta
	Gisticola	<i>juncidis</i>	Buitrón	Trist	Picaxuncos		Salón
TIMALIDOS	Panurus	<i>biarmicus</i>	Bigotudo	Mallerenga de Bigotis	Rabilongo das Canaveiras	Txinutx	
PARIDOS	Remiz	<i>pendulinus</i>	Pájaro Moscón	Teixidor	Ferreirño Garello	Dilindari	Mitjaira
EMBERICIDOS	Emberiza	<i>schoeniclus</i>	Escribano Palustre	Repicatalons	Escribenta das Cenaveiras	Zingir-Beróantz	Touladi de Canyar, Capucha, Gorrión de Monte

FUENTES: Sociedad Española de Ornitología. Institución Catalana d'Historia Natural. Angel Cabrera, J. Malluquer i Sotres. Sociedad Galega d'Historia Natural. Grupo de Ciencias Aranzadi, datos del autor y comunicaciones privadas.

Cuadernos de Campo del Dr. Félix Rodríguez de la Fuente

Cada miércoles en su quiosco o librería

Títulos de la colección:

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| 1 - El Lince y el Gato Montés | 31 - Las Cigüeñas |
| 2 - Grandes Águilas | 32 - Peces de Mar |
| 3 - El Lobo | 33 - Palomas y Tórtolas |
| 4 - Rapaces Nocturnas | 34 - Aves Marinas |
| 5 - El Jabalí | |
| 6 - Pájaros Carpinteros | |
| 7 - La Cabra Montés y el Muflón | |
| 8 - Pájaros del Bosque (I) | |
| 9 - Víboras y Culebras | |
| 10 - Los Buitres | |
| 11 - El Zorro | |
| 12 - Aves de la Estepa | |
| 13 - Pequeños Carnívoros | |
| 14 - Peces de Río | |
| 15 - Pájaros de Medio Urbano | |
| 16 - El Quebrantahuesos y el Alimoche | |
| 17 - Los Córvidos | |
| 18 - Peces de Lagos y Marismas | |
| 19 - Halcones y Cernícalos | |
| 20 - Lagartos y Lagartijas | |
| 21 - Las Garzas | |
| 22 - Pequeñas Águilas | |
| 23 - Las Grullas | |
| 24 - Liebre y Conejo | |
| 25 - Los Patos | |
| 26 - Pájaros del Bosque (II) | |
| 28 - Aves Viajeras (I) | |
| 29 - Pájaros de Río | |
| 30 - Aves Marinas Coloniales | |

Reserve su ejemplar



EDITORIAL MARIN S.A.