




Dr. Félix Rodríguez de la Fuente

CUADERNOS DE CAMPO
RAJAROS
DE CAMPO ABIERTO



EDITORIAL MARIN S.A.



Alondra Común
correteos por
pastizales.
Campo Azañero
(Segovia)
Mayo 1977
←

♀ de Tarabilla Común
en posadero de caza
Santillana del Mar
(Santander) Diciembre
1974
→



Vuelo nupcial de
Totovía.
Dehesa Boyal.
Akobendas
(Madrid)
Marzo 1966



*Cuaderno de Campo
del Dr. Félix Rodríguez de la Fuente*

PAJAROS DE CAMPO ABIERTO

38

*Collalba Negra ♂
presta a iniciar
exhibición de su
blanco obispillo
Tobernas
(Almería)
Febrero 1972*



NO CIRCULANTE



EDITORIAL
MARIN, S.A.

Sumario

Notas de Campo	2
Aspecto y dimensiones	6
Equipo	22
Distribución ecológica	24
Papel ecológico de la Alondra	26
Alimentación	28
Técnicas de caza	30
Técnicas defensivas	32
Paradas nupciales	34
Cuadro cronológico del ciclo reproductor	36
Nidos	38
Huevos	42
Pollos	44
Aláudidos ocasionales o raros	46
Clasificación y nomenclatura	48

Estructura
del pico y
cabezas



Bisbita
Común



PROCEDENCIA

Sumario.

018034-02

500 Alondra

FECHA

59 03 16.

CUADERNOS DE CAMPO DEL
DR. FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE

Idea y diseño de Editorial Marín, S. A.

Ilustración color CARLOS SALOM

Dibujos negro Juan Manuel Varela

Coordinación Joaquín Araujo

Dirección Félix Rodríguez de la Fuente

© EDITORIAL MARÍN, S. A. 1978

Nicaragua, 85-95, Barcelona-29, Spain

ISBN 84-7102-500-0 la Colección

ISBN 84-7102-538-8 Pájaros del Campo Abierto

Impreso por Artes Gráficas Toledo, S. A.

Depósito Legal: To- 532 - 1978

Distribuido por Marco Iberica, D. de E., S. A.

Precio: 100 - Ptas

590
rod
0
2.38



Triguero



Collalba

NOTAS DE CAMPO

Collalba Gris persigue
a un abejorro
en vuelo
S^e de los Tilabres
(Almería)



Cogujada Común atrapa
insectos congregados en
un excremento de caballo
(Mohedas de la Jara)
Toledo





Para el profano en los temas de la naturaleza la estepa aparece como un medio monótono, carente de vida e infinitamente menos atractivo que el monte o la selva. El tópico, como todos, es sólo aparente. Las más altas biomasa, es decir, el peso de seres vivos por unidad, se dan en las estepas del Serengetti en Africa.

En lo que se refiere a la biomasa ornítica, podríamos afirmar otro tanto, pero sin irnos, en este caso, a las remotas mesetas africanas. La estepa cerealista ibérica, en algunas zonas de ambas Castillas y de Extremadura, con sus

ayutardas, sus sisonas, alcaravanes, gangas, ortegas, estorninos, grullas, bisbitas, codornices, perdices y aláudidos, es más rica en número de individuos y en peso de materia viva que cualquier bosque o monte de la península.

Pero no cabe duda de que la vida se traduce también en sonido, no solamente en volumen de materia organizada. En ese aspecto, el torrente de trinos que se despeña desde el cielo en una mañana primaveral en las mesetas castellanas, medido con un audífono, resultaría también más intenso y extenso que el clamor que se produzca en cualquier masa forestal.

Como saben, hasta los niños, los protagonistas del fantástico concierto de las estepas son los aláudidos, particularmente, alondras y calandrias. Pero lo que ya no resulta tan conocido es el dato heroico - bajo el punto de vista del hombre - de que los ♂♂ de las alondras que cantan suspendidos en el cielo mientras la ♀ incuba entre los terrones, no solamente defienden el territorio de los otros ♂♂ competidores, sino que actúan de señuelos vivos, de auténticos pilotos suicidas, para atraer sobre sí el ataque del Halcón Peregrino o el Alcotán, que surcan el cielo como proyectiles.

Aspecto y dimensiones

Calandria


Melanocorypha calandra


Altura:	18 cm
Peso:	65 gr
Ala:	♂ 127-♀ 121 mm
Envergadura:	39 cm
Pico.	18 mm
Tarso:	28 mm
Cola:	21 mm



El más grande de los aláudidos. Alas anchas y largas; cola corta y recta con borde externo blanco. Dorso pardo muy moteado. Grandes manchas negras en la base del cuello. Partes ventrales blancas. Borde interno del ala blanco. No tiene cresta.

Muy abundante en Andalucía y Extremadura.






Terrera Común

Calandrella cinerea

Altura:	13,5 cm
Peso:	19-25 gr
Ala:	♂ 95-♀ 89 mm
Envergadura:	27 cm
Pico:	11 mm
Tarso:	20 mm
Cola:	58 mm

Prefiere
zonas sin
cultivar



Tonos muy pálidos; escasamente moteada en el dorso y prácticamente blanca en partes inferiores. Pico muy corto, de color amarillo. Carece de cresta pero, como todos los componentes de la familia, tiene los bordes de la cola blancos.

Terrera Marismeña

Calandrella rufescens

Altura:	11,5 cm
Peso:	17-23 gr
Ala:	93 mm
Envergadura:	25 cm
Pico:	9 mm
Tarso:	18 mm
Cola:	56 mm

Muy similar a la
Terrera Común

Cola corta
y estrecha




pecho
moteado

Partes
ventrales
blancas

Prácticamente idéntica a la
anterior pero con motas en los
lados del pecho y en la cabeza.

Prefiere zonas del
litoral y perimaris-
meñas.





Cogujada Común

Galerida cristata


Altura:	17 cm
Peso:	45 gr
Ala:	♂ 108-♀ 98 mm
Envergadura:	34 cm
Pico:	18 mm
Tarso:	27 mm
Cola:	65 mm

← Muy moteada

Compacta
y robusta

↑
Bordes de la
cola más claros
que el resto de
las rectrices
← Uñas traseras
muy largas

Prefiere campos
cultivados y la cer-
canía de núcleos
de población



Característica por la gran cresta, que siempre permanece desplegada. Muy parda por encima y finamente moteada en los lados de garganta y cuello. Las rectrices externas no son totalmente blancas, pero sí mucho más claras que el resto de las plumas de la cola.

Cogujada Montesina *Galerida theklae*

Altura:	17 cm
Peso:	35-45 gr
Ala:	♂100-♀95 mm
Envergadura:	36 cm
Pico:	14 mm
Tarso:	25 mm
Cola:	68 mm

*Cresta muy
desarrollada*
→



*Moteado más
oscuro y grande
que en la Común*

*zonas montañosas y
áridas, a veces con
bastante vegetación*

De aspecto igualmente rechoncho que la anterior, aunque algo más oscura. Las motas del pecho resultan algo más grandes y oscuras que en la Cogujada Común. Pueden darse variedades muy claras.



Moño poco
visible

Totavía
Lullula arborea

Altura:	15 cm
Peso:	30 gr
Ala:	♂ 94-♀ 90 mm
Envergadura:	30 cm
Pico:	12 mm
Tarso:	21 mm
Cola:	51 mm


Pequeña y
rechoncha

Cola
corta
↓

Zonas semi arbo-
radas. Muy abundante

Aláudido que frecuenta también las zonas abiertas de los bosques. Más pequeña y rechoncha que alondras y cogujadas. Sólo muy ligeramente crestada. Franja ocular bastante marcada. Moteada en dorso y pecho. Cola corta con blanco en la punta en vez de en las rectrices externas.

*Es la especie que
penetra más en las
zonas boscosas*



Alondra Común

Alauda arvensis


Altura:	16 cm
Peso:	36-40 gr
Ala:	♂ 112-♀ 102 mm
Envergadura:	35 cm
Pico:	12 mm
Tarso:	22 mm
Cola:	59 mm


Cresta bastante
desarrollada




El más abundante y conocido de los componentes de la familia: caracteres poco diferenciados. Bastante grande y rechoncha. Cola larga con rectrices externas blancas. El moño sólo resulta visible ocasionalmente. Coloración terrosa clara, muy moteada en dorso y pecho. Vientre blanco. Vuelo muy característico: se mantiene en un mismo punto del cielo, inmóvil, batiendo alas.

Muy abundante
en todo tipo de
campos cultivados





Sólo en zonas de
Tundra o Alta
Montaña



Alouatta Cornuta

Eremophila alpestris

Altura:	17 cm
Peso:	40 gr
Ala:	♂ 110-♀ 103 mm
Envergadura:	31 cm
Pico:	13 mm
Tarso:	22 mm
Cola:	70 mm

Contorno y actitudes muy similares a los de la Alouatta. Común aunque algo más clara y menos moteada. Vista a corta distancia resulta inconfundible por el diseño de la faz, negro y amarillo, coronado con unos cuernecillos en el macho.

Bisbita Común

Anthus pratensis


Altura:	14 cm
Peso:	19 gr
Ala:	♂ 81-♀ 76 mm
Envergadura:	25 cm
Pico:	12 mm
Tarso:	21 mm
Cola:	59 mm



Muy frecuente en
España durante el
invierno.

Los bisbitas pueden confundirse con las alondras y afines pero resultan mucho más esbeltos y carecen de cresta, aunque también tienen las rectrices externas de color blanco.


El Común se diferencia del Campestre por el punteado del pecho y costados. Uña trasera muy larga.




Bisbita Campestre

Anthus campestris

Altura:	16 cm
Peso:	20-30 gr
Ala:	♂ 93-♀ 85 mm
Envergadura:	27 cm
Pico:	16 mm
Tarso:	28 mm
Cola:	70 mm




Algo mayor y de tonos más claros.
Carece totalmente de motas
negras en pecho y flancos. Cola
algo más larga que su pariente.
Ceja blanca, ligeramente marcada.



Tarabilla Norteña
Saxicola rubetra

Altura:	12 cm
Peso:	18 gr
Ala:	♂ 77-76 mm
Envergadura:	24 cm
Pico:	14 mm
Tarso:	22 mm
Cola:	46 mm

Pequeño pájaro muy estilizado y grácil pese a su corta cola y a sus alas pequeñas y redondeadas. El macho tiene mejillas negras, ceja blanca, pecho de color castaño vivo y mancha alar blanca; la hembra carece del negro en la faz y exhibe menos castaño en pecho. Dorso de ambos sexos, pardo muy moteado.



También en zonas montañosas del Centro de la Península Ibérica.




Tarabilla Común *Saxicola torquata*

Altura:	12 cm
Peso:	14 gr
Ala:	♂ 66 - ♀ 64 mm
Envergadura:	20 cm
Pico:	14 mm
Tarso:	22 mm
Gola:	47 mm

♀ pecho
menos
llamativo
sin gran-
des con-
trastes



Algo más rechoncha que la anterior. El macho tiene cara negra, lista blanca en el cuello, pecho castaño rojizo, vientre blanco y dorso pardo oscuro con mancha alar blanca. La hembra no tiene negro en la cabeza ni el cuello blanco y resulta menos oscura en el dorso. La mancha alar y el pecho son del mismo color que en el macho.



Precisa zonas húmedas

Antifaz negro

Collalba Gris

Oenanthe oenanthe

Altura:	14 cm
Peso:	26 gr
Ala:	♂95-♀93 mm
Envergadura:	24 cm
Pico:	17 mm
Tarso:	26 mm
Cola:	56 mm

Dorso
gris
azulado

Pecho
pardo
claro

Obispillo y
base de
la cola
blancos

Ceja marcada

Alas pardo
oscuras

En Europa del
Sur prefiere zonas
de montaña



El macho presenta dorso, píleo y frente gris azulado, lista ocular blanca, mejillas negras, pecho y zona ventral de tonos crema claro, obispillo y región basal de la cola, blancos; resto de la cola, negro. La hembra es pardo claro, con el diseño de la cola igual al del macho.


Obispillo y base
Cola blancos

de garganta
blanca

Alas /
oscuras

Collalba Rubia
Oenanthe hispanica

Altura:	15 cm
Peso:	22 gr
Ala:	♂ 90-♀ 88 mm
Envergadura:	27 cm
Pico:	17 mm
Tarso:	23 mm
Cola:	62 mm



Estos pequeños pájaros, de zonas generalmente muy degradadas y con escasísima vegetación, resultan fácilmente identificables por los tonos leonados sobre los que destacan las alas y parte terminal de la cola, negras, en contraste con el obispillo y base de la cola, blancos. Las hembras carecen de negro en mejillas. Hay dos variedades, sólo en machos: los que tienen la garganta negra y los que carecen de este color en la zona gular.

Muy frecuente encampos sin cultivar

Collalba Negra *Oenanthe leucura*


Altura:	19 cm
Peso:	35 gr
Ala:	♂98-♀93 mm
Envergadura:	
Pico:	21 mm
Tarso:	27 mm
Cola:	67 mm

Obispillo y base
de la cola blancas



Única Collalba de color negro de Europa. El obispillo y el borde anterior de la cola son totalmente blancos. Las hembras resultan parduzcas.

Zonas estepáricas muy degradadas, con roquedos y terraplenes.



Pico grueso



Dorso
ocraceo muy
moteado



Triquero

Emberiza calandra

Altura: 18 cm

Peso: ♂♂ 55-84 gr

♀♀ 42-52 gr

Ala: ♂ 103-♀ 94 mm

Envergadura: 30 cm

Pico: 14 mm

Tarso: 25 mm


Cola: 71 mm

Cola
larga

Todo tipo de
campos cultivados

♀ de Collalba
Negra, más
parda y
pequeña
que el ♂


Pájaro muy visible en zonas
abiertas de todas las latitudes
por su costumbre de utilizar
posaderos altos. Compacto, de
cola larga un poco ahorquillada.
Pico grueso. Pardo muy moteado.
Ligera lista ocular blanca.
Vuela con las patas colgantes.



Equipo



Bisbita



Collalba



Alondra



Triguero

Picos

Claramente insectívoros en el caso de collalbas y tarabillas y omnívoros en los restantes, los picos de los pájaros de campo abierto responden, como siempre, a su especialización trófica.



Bisbita



Triguero



Alondra

Patas

La larguísima uña trasera de los aláudidos es una adaptación a la vida terrestre que, por evolución convergente, aparece también en los Bisbitas muy separados fitogenéticamente de aquéllos.



Totovía



Bisbita



Alondra



Collalba

El esquema cromático y la estructura de la cola permiten diferenciar a las familias, géneros y especies de las aves del Campo Abierto.

Baño de arena

Todos los aláudidos se bañan exclusivamente en arena. No utilizan, pues el agua. Con ello no sólo limpian su plumaje de parásitos sino que le proporcionan una fina capa de polvo que contribuye a su mimetismo.





018034



590
Rod
© 2.38

BIBLIOTECA
JISMAE

ULANTE

Distribución ecológica





Aunque la mayor parte de las especies que aquí tratamos encuentran su biotopo más adecuado en las zonas estepáricas, bajo el concepto de campo abierto queremos englobar a otras aves que crían en las zonas desarboladas de latitudes medias y altas que corresponderían, estrictamente, a biomas diferentes del estepario.

Papel ecológico de la Alondra

En el bioma estepario las alondras constituyen una biomasa potencial de gran importancia porque el tamaño de este pájaro resulta apropiado para numerosos depredadores —como puede verse— que procuran acecharlas, tanto en el aire como en tierra. El papel ecológico resulta, pues, el de un consumidor primario que canaliza la energía obtenida de las semillas y granos —en primavera también es insectívora— hasta los depredadores.

DEPREDADORES
QUE CAPTURAN
A LA ALONDRA
CUANDO VUELA

Alcotán



Halcón
Común



Esmerejón



ALONDRA

DEPREDADORES QUE
CAPTURAN A LA
ALONDRA CUANDO
ESTA POSADA



Aguilucho
Cenizo

Gavilán




ALONDRA




Gineta



Zorro



Comadreja




Alimentación

Granos, Cereales

Semillas silvestres

Pequeños Invertebrados



Ortópteros

Anélidos

Coleópteros

Semillas silvestres

	Granos	semillas silvestres	Pequeños moluscos	Ortopléros	Coleópteros
 Cogujada Común	+	+	+	+	+
 Cogujada Montosina	+	+	+	+	+
 Bisbita Común	+	+		+	+
 Bisbita Campestre		+	+	+	+
 Tarabilla Común			+	+	+
 Tarabilla Norteña			+	+	+

Los aláuidos y los bisbitas deben ser considerados como omnívoros ya que a lo largo del año su dieta varía de acuerdo con la disponibilidad de alimentos. En primavera y verano recurren a los numerosísimos

insectos que pululan por los campos abiertos sin desechar las semillas de las gramíneas silvestres que, en otoño e invierno, constituirán junto con los granos, las bases de su alimentación.

Técnicas de caza



DESDE APOSTADERO

La mayoría de las presas de los tábilas son pequeños insectos a los que atrapan tras cortas persecuciones o picando directamente sobre ellos. La acción suele partir desde un posadero dominante.

PROSPECCIÓN

La prospección de las pastojeras, de los campos cultivados y de los pastizales en busca de granos y semillas, es la técnica de caza principal de los aláudidos.



INSECTOS ATROPELLADO

Las cogujadas aprovechan
los pequeños insectos atropellados
por los automóviles y los que se
dan cita en los excrementos
del ganado; de ahí su continua
presencia en caminos y
carreteras



Técnicas de defensa

*Alóudido
agazapado
entre matorros*



Agazaparse

Ante la proximidad de cualquier peligro los alóudidos se agazapan confundiéndose aún más con el terreno.



Mimetismo

Pocas aves se confunden con su entorno como los alóudidos pues sus tonos terrosos se corresponden con los del ambiente.

FLOCK

Durante sus vuelos migratorios las alondras sufren el acoso de depredadores alados ante los cuales recurren a la táctica, ya descrita para otras aves gregarias, de agruparse estrechamente para ofrecer la compacta masa del bando que nunca el cazador osará atacar.

Halcón →



Flock de alondras



Paradas nupciales

La trayectoria de vuelo de las totovías en celo consta, generalmente, de una ascensión vertical, varios desplazamientos circulares y un retorno al suelo con descenso muy tendido y descripción de círculos antes de tomar tierra.

Vuelo nupcial de la Totovía

Cogujada Común ♂ en postura de exhibición ante la ♀, inmediatamente posterior al vuelo nupcial que suelen realizar juntos los dos sexos



Alondra en canto de celo
mientras se cierne sobre
su territorio



La más conocida manifestación nupcial de la Alondra macho es su vuelo de marcaje territorial. Tras elevarse sobre su parcela comienza a vibrar en un punto del firmamento, con lo que consigue permanecer prácticamente detenida en el aire. Lo verdaderamente llamativo de esta manifestación es que cumple,

además de las consabidas funciones de atracción sexual y de fijación del territorio frente a otros machos, un importante papel defensivo para la nidada al servir de auténtico señuelo viviente que atraerá sobre sí los ataques de los cazadores alados.



Vuelo de marcaje de
Bisbita Común.

Tras un vuelo remontante se deja caer en un vuelo semiplaneado comparable al descenso de un paracaídas




Cuadro cronológico


 Celo y nido





Calandria




Totovía




Alondra




Bisbita Campestre




Triguero




Tarabilla Norteña



Collalba Gris



■ Incubación
 ■ Pollos en el nido
 ▨ Desplazamiento




Nidos

ESQUEMAS DE UBICACION Y ESTRUCTURA DEL NIDO DE LA COLLALBA RUBIA




- 1) Al amparo de un pequeño matojo o roca, la Collalba Rubia excava una ligera depresión, donde más tarde construirá su nido.

- 2) La Collalba Rubia construye ante su nido una extraña plataforma de palitroques que parece tener finalidad defensiva según algunos ornitólogos o de andamiaje según otros, ya que estas collalbas suelen anidar en zonas muy empinadas.



3/ Entre dos matorrales
convenientemente vaciados
en el centro, la Collalba recibe
una gran protección.



Según Suárez Cardona

BISBITA
COMÚN

Estructura
endeble de
hierbas secas
y raicillas



TARABILLA
COMÚN



Sobre el suelo o
muy cerca, literal-
mente empotrados
entre vegetación
densa.

Más cuidado que los de
otras especies al forrar-
lo de crines, lana y
plumas.





COLLABA GRIS

← Siempre en el suelo, al amparo de piedras o vegetación. Utilizan frecuentemente pequeñas agujas o rocas. En ocasiones, acumulan piedrecillas en la entrada.




ALONDRA

→ Sobre ligeras depresiones y protegidos por vegetación herbácea. 12 cm de diámetro.

TRIGUERO →

Una copa de raicillas y gramíneas secas de poco grosor. Al amparo de acumulos de vegetación generalmente entrelazada en su extremo.



Huevos

Calandria

Melanocorypha calandra

N.º normal:	4 / 5
extremo:	7
Tamaño:	24 × 18 mm
2.ª puesta:	Sí.
3.ª puesta:	No.
Incubación:	14 / 15 días
Pollos en nido:	19/21 días



Cogujada Común

Galerida cristata

N.º normal:	3 / 5
extremo:	6
Tamaño:	23 × 17 mm
2.ª puesta:	Sí.
3.ª puesta:	Rara
Incubación:	♀ 12 / 13 días
Pollos en nido:	18 días



Terrera Común

Calandrella cinerea

N.º normal:	3 / 5
extremo:	6
Tamaño:	19 × 14 mm
2.ª puesta:	Sí.
3.ª puesta:	No.
Incubación:	♀♂ 13 días
Pollos en nido:	11 / 12 días

Totavía

Lullula arborea

N.º normal:	3 / 4
extremo:	1 / 6
Tamaño:	22 × 16 mm
2.ª puesta:	Sí
3.ª puesta:	Rara
Incubación:	♀ 12 / 16 días
Pollos en nido:	14 días



Alondra Común

Alauda arvensis

N.º normal:	3 / 4 días
extremo:	5 / 7
Tamaño:	24 × 17 mm
2.ª puesta:	Sí
3.ª puesta:	Sí
Incubación:	♀ 11 días
Pollos en nido:	20 días



Bisbita Común

Anthus pratensis

N.º normal:	3 / 5
extremo:	7
Tamaño:	20 × 14 mm
2.ª puesta:	Sí
3.ª puesta:	No
Incubación:	♀ 11 / 15 días
Pollos en nido:	14 / 17 días



Bisbita Campestre
Anthus campestris

N.º normal: 4 / 5
extremo: 6
Tamaño: 22 x 16 mm
2.ª puesta: Sí
3.ª puesta: No
Incubación: ♂ 13 / 14 días
Pollos en nido: 14 / 18 días



Tarabilla Común
Saxicola torquata

N.º normal: 5 / 6
extremo: 3 / 8
Tamaño: 19 x 14,5 mm
2.ª puesta: Sí
3.ª puesta: Rara
Incubación: ♂ 14 / 15 días
Pollos en nido: 12 / 13 días



Collalba Rubia
Oenanthe hispanica

N.º normal: 4 / 5
extremo: —
Tamaño: 20 x 15 mm
2.ª puesta: Sí
3.ª puesta: No
Incubación: ♀ 13 / 14 días
Pollos en nido: 14 días



Collalba Gris
Oenanthe oenanthe

N.º normal: 5 / 6
extremo: 3 / 8
Tamaño: 21 x 16 mm
2.ª puesta: Sí
3.ª puesta: No
Incubación: ♂ 14 días
Pollos en nido: 15 días



Collalba Negra
Oenanthe leucura

N.º normal: 3 / 6
extremo: —
Tamaño: 24 x 17,5 mm
2.ª puesta: Sí
3.ª puesta: No
Incubación: ♀ 16 días
Pollos en nido: 15 días



Triguero
Emberiza calandra

N.º normal: 4 / 6
extremo: 1 / 7
Tamaño: 23 x 18 mm
2.ª puesta: Sí
3.ª puesta: Rara
Incubación: ♀ 12 / 14 días
Pollos en nido: 14 días



Pollos

La mayoría de los pollos de las aves del campo abierto abandonan el nido algunos días antes de poder volar.



↑
Torrera Común

Libreas más crípticas, que contribuyen al mimetismo durante el crítico periodo del aprendizaje, son una constante en todos los pollos y jóvenes volanderos de aláudidos, tarabillas, collarbas y bisbitas.



↑
Tarabilla Común

INMADUROS DE LAS
AVES DE CAMPO ABIERTO

Alondra
cornuda
→



Collalba
gris
←



Tarabilla Norteña
←



Bisbita
Campestre
→



Aláudidos ocasionales


ALONDRA DE DUPONT →
Chersophilus duponti

Algo mayor que la Terrera. Difícil de observar, por su conducta eminentemente terrestre. Ha criado y seguramente cría en la España árida. Propio de los desiertos africanos



COLLALBA ISABEL
✓ Oenanthe isabellina

Grande, de tonos terrosos y llamativa. Ceja blanca. Ojispillo y base de la cola blanca. Ha sido vista en Europa Occidental. Área de cría en zonas estepáricas rusas.



BISBITA DE RICHARD
Anthus novaeseelandiae

Bisbita grande y compacta. Muy moteada con cola larga y ceja marcada. Ave siberiana que aparece ocasionalmente en el oeste de Europa.



CALANDRIA
NEGRA

Melanocorypha
yeltonensis

En las estepas Euroasiáticas vive esta robusta calandria inconfundible por su librea negra con un tado blanco en el extremo de las cobertoras.



♂



COLLARBA PÍA
Oenanthe pleschanka

♂♂ muy contrastados con cabeza y patas inferiores de color ante y mejillas, dorso y alas negruzcos. Estepas Euroasiáticas



♀

ALONDRA IBIS
Alcedon alaudipes

19 cm.

Grande con pico largo y curvado. Pecho moteado. Aparece en el sur de Europa proveniente de las zonas desérticas del Norte de África



NO CIRCULANTE

CLASIFICACIÓN Y NOMENCLATURA

FAMILIA	ESPECIE	CASTELLANO	CATALÁN	GALLEGO/BALE	VASCUENCE
ALAUDIDAS	<i>Alauda arvensis</i>	Alondra Común	Alosa, Torróla	Laverca, Calandre	Pirripio
	<i>Chersophilus duponti</i>	Alondra de Dupont	Alosa Becuda		Portugalko Pirripio
	<i>Eremophila alpestris</i>	Alondra Cornuda	Alosa Banyuda		Elur Pirripio
	<i>Lullula arborea</i>	Totovia	Cotollu	Cotovia Pequena, Cotta	Pirripio Egazabal
	<i>Calandrella cinerea</i>	Terrera Común	Terreroia	Calandriña Común	Txorandre Izatamotz
	<i>Calandrella rufescens</i>	Terrera Marismas	Terreroia Rogenca	Calandriña Apincharada	Txorandre Pizpoleta
	<i>Ammomanes deserti</i>	Terrera Sahariana			
	<i>Ammomanes cincturus</i>	Terrera Colingra			
	<i>Melanocorypha calandra</i>	Calandria, Rascachera	Calandria	Calandra	Txorandre
	<i>Melanocorypha yeltoniensis</i>	Calandria Negra	Calandria Negra		
	<i>Galerida cristata</i>	Cogujada Común, Moñuda, Copetuda	Cogullada	Cotovia dos Camiños, Crestellina	Txodandre Tontordun
	<i>Galerida theklae</i>	Cogujada Montaña	Cogullada Fosca	Cotarís dos Árbores	Txorandre Mokomotz
	<i>Emberiza calandra</i>	Triguero, Escrubano	Cruixidell	Trigalla, Rayon	Gari Berdantx
	<i>Redocephys githaginea</i>	Camschuelo Trompetero	Pinsá Trompeter	Chinco Rubia	
	<i>Carpodacus erythrinus</i>	Camschuelo Carminoso	Pinsá Carminat		[par Gallupa
MOTACILIDAS	<i>Anthus campestris</i>	Bisbita Común	Titella	Pica dos Prados, Chis	Gurita
	<i>Anthus campestris</i>	Bisbita Campestre	Trobai, Titeta	Pica Papuda, Tordina	Zelai Gurita
	<i>Anthus gustavi</i>	Bisbita del Petchora	Piula del Petchora	Pria del Petchora	Petchora Gurita
	<i>Anthus hodgsoni</i>	Bisbita de Hodgson	Piula de Hodgson	Pica de Hodgson	Hodgson Gurita
	<i>Anthus cervinus</i>	Bisbita Gorgirrojo	Piula Gola Roja		Gurita Lepagorri
	<i>Anthus novaeseelandiae</i>	Bisbita de Richard	Piula Grossa		Richard Gurita
	<i>Saxicola rubetra</i>	Torabilla Norteña	Bitxac Rogenc	Chasca Colipinta, Btrchu	Pitxar txar
	<i>Saxicola torquata</i>	Torabilla Común, Merico Engelapastores	Bitxac Comú	Chasca Común, Charchar	Pitxarixar kaskabeltz
	<i>Oenanthe oenanthe</i>	Collalba Gris, Cudiblanca	Collit Gris, Cudiblanca	Pedreiro Cincento, Vicha	Ipuzuri
	<i>Oenanthe hispanica</i>	Collalba Rubia	Collit Rojo, Aurita, Stapagina	Pedreiro Marelo, Vicha Careia	Ipuzuri Ori
TÓRDIDAS	<i>Oenanthe leucura</i>	Collalba Negra	Merla de Cua Blanca	Pedreiro Negro	Ipuzuri Belta
	<i>Oenanthe isabellina</i>	Collalba Isabel	Collit Pálid		
	<i>Oenanthe pleschanka</i>	Collalba Pía	Collit de Pit Negro		
	<i>Oenanthe deserti</i>	Collalba Desértica	Collit del Desert		

FUENTES: Sociedad Española de Ornitología, Institut Catalana d'Història Natural, Angel Cabrera, J. Matuquer i Sostres, Sociedade Galega d'Historia Natural, Grupo de Ciencias Aranzadi, datos del autor y comunicaciones privadas.

Cuadernos de Campo del Dr. Félix Rodríguez de la Fuente

Cada miércoles en su quiosco o librería

Títulos de la colección:

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1 - El Lince y el Gato Montés | 31 - Las Cigüeñas |
| 2 - Grandes Águilas | 32 - Peces de Mar |
| 3 - El Lobo | 33 - Palomas y Tórtolas |
| 4 - Rapaces Nocturnas | 34 - Aves Marinas |
| 5 - El Jabalí | 35 - Abubilla, Carraca
y Abejaruco |
| 6 - Pájaros Carpinteros | 36 - Rapaces del Bosque |
| 7 - La Cabra Montés y el
Muflón | 37 - Aves de la Costa |
| 8 - Pájaros del Bosque (I) | 39 - La Gineta y el Meloncillo |
| 9 - Víboras y Culebras | 40 - Somormujos y Zampullines |
| 10 - Los Buitres | 41 - Pájaros del Bosque (III) |
| 11 - El Zorro | 42 - Anfibios |
| 12 - Aves de la Estepa | |
| 13 - Pequeños Carnívoros | |
| 14 - Peces de Río | |
| 15 - Pájaros de Medio Urbano | |
| 16 - El Quebrantahuesos y el
Alimoche | |
| 17 - Los Córvidos | |
| 18 - Peces de Lagos y
Marismas | |
| 19 - Halcones y Cernícalos | |
| 20 - Lagartos y Lagartijas | |
| 21 - Las Garzas | |
| 22 - Pequeñas Águilas | |
| 23 - Las Grullas | |
| 24 - Liebre y Conejo | |
| 25 - Los Patos | |
| 26 - Pájaros del Bosque (II) | |
| 27 - Pájaros de la Marisma | |
| 28 - Aves Viajeras (I) | |
| 29 - Pájaros de Río | |
| 30 - Aves Marinas Coloniales | |

Reserve su ejemplar



EDITORIAL MARIN S.A.