





Dr. Félix Rodríguez de la Fuente

CUADERNOS DE CAMPO

**PAJAROS DEL BOSQUE
(III)**



EDITORIAL MARIN S.A.



Curruca capirotada ♂
come un higo
Mataró (Barcelona)
Septiembre 1977



Curruca sarda ♂
Formentera (Balears)
Junio 1970

Cuaderno de Campo
del Dr. Félix Rodríguez de la Fuente

PAJAROS DEL BOSQUE (III)

*Macho de Curruca
Mosquitera en
canto nupcial*

*Vera de
Bidasoa
(Guipúzcoa)*

*Mayo
1971*

41



EDITORIAL
MARIN, S.A.

N.º CIRCULANTE

Sumario

Notas de campo	2
Aspecto y dimensiones	6
Equipo	28
Distribución ecológica	30
Territorios	32
Alimentación	34
Técnicas de caza	36
Paradas nupciales	38
Cuadro cronológico	40
Nidos	42
Huevos	44
Pollos	48
El anillamiento científico	50
Clasificación y nomenclatura	52

Cabezas



Mosquitero

donativo

018037-02 \$ 500

99 03 16



Papamoscas

CUADERNOS DE CAMPO DEL DR. FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE

Idea y diseño de Editorial Marín; S. A.
Ilustración color NESLÉ SOULÉ
Dibujos negro Juan Manuel Varela
Coordinación Joaquín Araujo
Dirección Félix Rodríguez de la Fuente
© EDITORIAL MARÍN, S. A. 1978
Nicaragua, 85-95, Barcelona-29, Spain
ISBN 84-7102-500-0 la Colección
ISBN 84-7102-541-8 Pájaros del Bosque (III)
Impreso por Artes Gráficas Toledo, S. A.
Depósito Legal: To- 674 - 1978
Distribuido por Marco Ibérica, D. de E., S. A.

Precio: 100,- Ptas.




Curruca

590
Rod
e
T.41

NOTAS DE CAMPO

Actitud agresiva de Petirrojo que defiende un territorio



Machos de Curruca capirotada combaten por la posesión de una parcela de bosque

Papamoscas cerrojillo a la entrada de su nido, situado en un pino. →

Navefria (segovia)

Julio 1974




Petirrojo



Todo aficionado al campo, sin que haya llegado necesariamente a la categoría de ornitólogo, habrá observado que, a mediados de agosto, en los sotos, en las arboledas que circundan los caminos, en los árboles frutales de los huertos, en los frescos y antañones cenadores de los jardines, aparecen unos pájaros nuevos. Quizá lo que más les distinga de los bullangueros gorriones, de los notorios carboneros, de los pinzones y de los populares jilgueros, todos ellos comunes pobladores de nuestras arboledas, sea su aparente falta de interés por todo lo que pueda representar un peligro. Posados en las ramas despejadas de cualquier árbol de mediano o gran porte, emiten unas llamadas monótonas y repetidas, mientras balancean la cola y entreabren las alas de tal manera que llaman la atención del más distraído de los paseantes, como si la amenaza que se deriva de la presencia del hombre no fuera con ellos. Estos pájaros conspicuos, aparentemente empeñados en llamar la atención, son los más madrugadores de los viajeros alados que pasan por España. Por su llamativa técnica de caza, que les capacita para "papar" dípteros en pleno vuelo, ante los ojos de cualquier transeúnte, se les denomina Papamoscas.

y lo trágico de estos pobres papamos-
cos, que tratan constantemente de ha-
cerse notorios a sus congéneres -por que
son territoriales durante la migración ya
que cada uno precisa un pequeño coto
para "papar" sus moscas -es que la escopeta
de gases comprimidos del moza/bete, el ti-
rachinas del rapaz pueblerino, el cebo
ceado con hormiga de ala del pajarero,
causan tremendas bajas entre sus filas
migradoras. Recién llegados de países
ornitológicamente más cultos, sujetos
a unas pautas de conducta que les obli-
gan a descubrir su presencia, jóvenes
inexptos la mayor parte, vienen a
engrosar con sus trémulos cuerpecí-
llos, fritaugas y pajaritadas en los
campos ibéricos.



Aspecto y dimensiones

Petirrojo


Erithacus rubecula

Altura:	13 cm
Peso:	16 gr
Ala:	♂ 72-♀ 70 mm
Envergadura:	22 cm
Pico:	14 mm
Tarso:	26 mm
Cola:	58 mm



Inconfundible por ser el único pájaro que tiene rojo en la cara y todo el pecho, formando un amplio babero, del mismo color. El dorso resulta homogéneamente pardo oliváceo. Vientre blanco y ojos negros.

Los jóvenes carecen de la mancha roja y están profusamente moteados de pardo oscuro.




Bisbita Arbóreo
Anthus trivialis

Muy estilizado


Altura:	15 cm
Peso:	22 gr
Ala:	♂ 87-♀ 84 mm
Envergadura:	26 cm
Pico:	14 mm
Tarso:	20 mm
Cola:	60 mm

*Dorso pardo
grisáceo*

Pecho moteado




Es el único componente del género *anthus* que se instala en formaciones arbóreas; todos los demás son propios de los campos abiertos. Grácil y estilizado, con cola bastante larga. Pardo, muy moteado en pecho y flancos. Vientre blanquecino. Ceja poco llamativa.





Curruca Gavilana
Sylvia nisoria

Altura:	16,5 cm
Peso:	26-30 gr
Ala:	86 mm
Envergadura:	26 cm
Pico:	16 mm
Tarso:	24 mm
Cola:	74 mm




Una de las mayores. Los machos adultos tienen llamativas vermiculaciones grises sobre fondo claro en pecho y costados. Las hembras resultan algo más pardas. El dorso y cabeza es gris oscuro. Cola larga, con ápice blanco. Ojos amarillentos, sin anillo ocular.

Cabeza
— negra

Pardo
grisáceo
en dorso

Curruca Mirlona *Sylvia hortensis*

Altura:	15 cm
Peso:	21 gr
Ala:	♂ 80-♀ 76 mm
Envergadura:	21 cm
Pico:	17 mm
Tarso:	23 mm
Cola:	67 mm




De tamaño casi idéntico a la anterior. Todas las demás currucas resultan sensiblemente menores. El macho tiene la cabeza negra y la garganta blanca. Pecho ligeramente sonrosado, dorso gris pardo. Cola larga, negra con borde blanco. La hembra más parda y sin la cabeza negra.


Curruca Mosquitera

Sylvia borin

Altura:	14 cm
Peso:	19,5 gr
Ala:	♂ 78-♀ 77 mm
Envergadura:	22 cm
Pico:	13 mm
Tarso:	21 mm
Cola:	54 mm




Se trata de una de las currucas más escondedizas y difíciles de identificar. No presenta contrastes apreciables en su cuerpo. Su coloración —pardo grisácea en dorso y cabeza y las partes ventrales pálidas— contribuye a distinguirla de sus congéneres más vistosas.




Curruca Zarcerilla

Sylvia curruca

Altura:	12,5 cm
Peso:	12 gr
Ala:	366-463 mm
Envergadura:	19 cm
Pico:	11 mm
Tarso:	20 mm
Cola:	54 mm




Una de las currucas más pequeñas. Dominan en su plumaje los tonos grises en dorso y cabeza. Las mejillas del macho son negras y la garganta blanca. Partes ventrales, ante claro.



Curruca Tomillera
Sylvia conspicillata

Altura:	12,5 cm
Peso:	10 gr
Ala:	57 mm
Envergadura:	-
Pico:	12 mm
Tarso:	20 mm
Cola:	53 mm



El macho exhibe cabeza gris, con llamativo anillo ocular blanco. Garganta blanca y pecho y costados, ante claro. Dorso gris claro y cobertoras alares marrones. La hembra resulta mucho menos contrastada y de coloración más apagada. Cola con rectrices externas blancas.


Curruca Sarda

Sylvia sarda

Altura:	13 cm
Peso:	7,5-12 gr
Ala:	56 mm
Envergadura:	-
Pico:	12 mm
Tarso:	20 mm
Cola:	64 mm



Pequeña curruca, de cola muy larga. El macho es gris-pizarra, con la única excepción del anillo ocular rojizo y vientre algo más claro. La hembra tiene la garganta pálida con punteaduras y las partes ventrales más claras que el macho. Como resulta muy difícil de localizar visualmente, conviene recordar su reclamo que podría transcribirse como un *tsrgir*.



Bigotera
blanca


Curruca Carrasqueña
Sylvia cantillans

Altura:	12 cm
Peso:	10-14 gr
Ala:	59 mm
Envergadura:	-
Pico:	10 mm
Tarso:	19 mm
Cola:	52 mm

Pecho
castaño



El macho presenta un plumaje vistoso, en el que las partes dorsales, grises, contrastan con la garganta, el pecho y los costados castaños. Exhibe, también, una conspicua bigotera blanca. Cola corta y región subcaudal blanca. La hembra es parda olivácea en dorso y color ante en partes ventrales. Su anillo ocular es blanco y el del macho rojizo.






Curruca Capirotada
Sylvia atricapilla

Altura:	14 cm
Peso:	20 gr
Ala:	74 mm
Envergadura:	23 cm
Pico:	13 mm
Tarso:	22 mm
Cola:	51 mm

Capirote pardo
↙



Curruca bastante compacta, con llamativo dimorfismo sexual, basado en el distinto color del capirote que en el macho es negro y en la hembra castaño. El dorso, en ambos sexos, es pardo oliváceo y las partes ventrales más claras, dominando en el macho los tonos grises y en la hembra los pardos.



Curruca Rabilarga *Sylvia undata*

Altura:	13 cm
Peso:	8-9 gr
Ala:	53 mm
Envergadura:	
Pico:	12 mm
Tarso:	19 mm
Cola:	64 mm



Recuerda a la Sarda, aunque más coloreada y de mayor tamaño. El macho, de cola larguísima, tiene la cabeza y el dorso gris-pizarra. Garganta, pecho y costados son de unos tonos vinosos, con ligeras punteaduras blancas. Anillo ocular rojo. La hembra repite prácticamente el mismo esquema, con una tonalidad general de menor intensidad.



Curruca de Rüpell
Sylvia rüppelli

Altura:	14 cm
Peso:	13,5 gr
Ala:	♂ 71-♀ 67 mm
Envergadura:	-
Pico:	13 mm
Tarso:	21 mm
Cola:	62 mm

Podría confundirse con una Mirlona, pero el iris rojo del macho, junto con su bigotera blanca y garganta y pecho negros, evitan cualquier confusión. La hembra no tiene negro en la cabeza.






Curruca Zarcera *Sylvia communis*

Altura:	14,5 cm
Peso:	15 gr
Ala:	67-70 mm
Envergadura:	22 cm
Pico:	12 mm
Tarso:	22 mm
Cola:	60 mm



La hembra puede parecer una Curruca Mosquitera, aunque algo más parda y con partes ventrales pálidas. El macho puede diferenciarse fácilmente por su cabeza grisácea, que destaca sobre la blanca garganta y las pardas partes ventrales. Dorso marrón claro. Cola corta, con bordes blancos. Ambos sexos exhiben anillo ocular blanco.



Anillo ocular rojo

cabeza negra

♂

cola larga


Partes inferiores blanquecinas

Curruca Cabecinegra
Sylvia melanocephala

Altura:	13 cm
Peso:	14 gr
Ala:	60 mm
Envergadura:	
Pico:	12 mm
Tarso:	21 mm
Cola:	60 mm

Sin negro en la cabeza

♀




Pequeña, algo rechoncha y de cola corta. El macho exhibe un llamativo anillo ocular rojo, en contraste con el resto de la cabeza, que es completamente negra. Garganta blanquecina. Partes ventrales, gris claro; las dorsales, gris oscuro. La hembra es parduzca y carece de negro en cabeza, pero conserva el anillo ocular rojo.



Mosquitero Común *Phylloscopus collybita*

Altura:	11 cm
Peso:	8 gr
Ala:	♀ 64-♂ 67 mm
Envergadura:	17 cm
Pico:	10 mm
Tarso:	20 mm
Cola:	47 mm



Como sus congéneres, es muy pequeño, rechoncho, con cola y pico cortos. Los caracteres para diferenciar a los mosquiteros en el campo resultan poco fiables por la tremenda similitud de todas las especies. El Común tiene las patas generalmente claras. Pardo oliváceo por encima, amarillo verdoso en pecho y cabeza —ésta con ceja amarilla— y partes ventrales blanquecinas. Canto repetitivo inconfundible zip-zap, zip-zap.

Mosquitero Musical
Phylloscopus trochilus

Altura:	11 cm
Peso:	8 gr
Ala:	♂ 68-♀ 65 mm
Envergadura:	18 cm
Pico:	11 mm
Tarso:	20 mm
Cola:	49 mm

Ceja algo
marcada


← Dorso Verde
amarillento



Partes
inferiores pálidas

Patas
generalmente
claras

Prácticamente idéntico al anterior, aunque con las patas más oscuras o negras.
Reclamo distintivo: *chuit*.



Mosquitero Papialbo
Phylloscopus bonelli

Altura: 11 cm
Peso: 7-8 gr
Ala: ♂ 60- ♀ 66 mm
Envergadura: 18 cm
Pico: 9 mm
Tarso: 19 mm
Cola: 45 mm

sin ceja


obispillo
claro / amarillo

Partes
inferiores
muy blancas



Algo más claro que los anteriores, especialmente en cabeza, dorso y partes ventrales. Obispillo amarillento.


Vive principalmente en zonas boscosas con alto grado de humedad



Mosquitero Silbador
Phylloscopus sibilatrix

Altura:	12 cm
Peso:	10 gr
Ala:	♂ 76-74 mm
Envergadura:	21 cm
Pico:	12 mm
Tarso:	18 mm
Cola:	51 mm


Ceja llamativa
/



NO CIRCULANTE

Su reclamo
recuerda a un
canto silbido

Mayor tamaño que
otros congéneres



Resulta de mayor tamaño que los anteriores y claramente teñido de amarillo en mejillas y pecho. Ceja, muy marcada, de color amarillo. Vientre blanco.

Plumaje invernal

Marrón claro

Muy claros en
partes inferiores
frente
blanca

Papamoscas Cerrojillo

Ficedula hypoleuca

Altura: 13 cm

Peso: 13 gr

Ala: ♂ 79-♀ 77 mm

Envergadura: 22 cm

Pico: 11 mm


Tarso: 17 mm

Cola: 52 mm

Plumaje
Primaveral

Partes
inferiores
blancas

Franja alar
blanca




Muy llamativo por su conducta poco escondidiza y por su contrastado diseño. El macho tiene cabeza y dorso completamente negros, a excepción de una mancha alar blanca. Todas las partes inferiores son blancas. Las hembras, los jóvenes y los machos fuera de la época de reproducción resultan pardos, con franja alar más clara.




Papamoscas Gris *Muscicapa striata*

Altura:	13,5 cm
Peso:	16 gr
Ala:	84 mm
Envergadura:	24 cm
Pico:	13 mm
Tarso:	15 mm
Cola:	61 mm

De mayor tamaño que el anterior, pero notablemente distinto. Pardo grisáceo homogéneo en cabeza, dorso y alas. Frente y pecho, moteados. El resto de las partes inferiores, blanquecinas.






Papamoscas Collarino
Ficedula albicollis


Altura:	13 cm
Peso:	10 gr
Ala:	82 ♂ 80 mm
Envergadura:	24 cm
Pico:	10 mm
Tarso:	17 mm
Cola:	51 mm

Plumaje
invernal

Pardo —
homogéneo



El macho repite el esquema cromático del Cerrojillo, aunque con mayor profusión del blanco, que se extiende desde la garganta formando un collar. Frente blanca. Mancha alar de mayores dimensiones. Hembra idéntica a la del Cerrojillo, pero con más blanco en las alas.



Papamoscas Papirrojo *Ficedula parva*

Altura:	11,5 cm
Peso:	10 gr
Ala:	67 mm
Envergadura:	20 cm
Pico:	10 mm
Tarso:	17 mm
Cola:	50 mm

Su diminuto tamaño evita confundirle con un Petirrojo, que además tiene rojo en la cara. Anillo ocular blanco. Dorso grisáceo. Vientre blanco y región basal de la cola, blanca.

Equipo

Pico de insectívoro

Atrapar pequeños insectos es la principal misión de los picos de todas las aves de este cuaderno, que, sin embargo, pueden también acceder a frutos y otras materias vegetales.



Curruca



Petirrojo



Papamoscas



Mosquitera

Patas

Claramente indiferenciadas, las patas de estos insectívoros pueden realizar funciones diferentes como caminar, saltar y sujetar, tanto en el suelo como sobre las ramas.




← Papamoscas

← Petirrojo

Alas

Pequeñas y redondeadas confieren a estas aves un vuelo sostenido y eficaz en sus larguísimas singladuras migratorias.





A/a de Curruca




A/a de Petirrojo

Distribución ecológica




Aunque presentes en la mayor parte de los biomas forestales, las aves comprendidas en este cuaderno presentan una distribución ecológica netamente diferenciada, como corresponde a un grupo orrmítico de apetencias tróficas muy similares —todos estos pájaros son insectívoros— y que, por tanto, deben evitar la competencia mediante la explotación de pequeños nichos. Capítulo aparte suponen las diversas currucas que son propias de las formaciones de matorral y que aquí aparecen asimiladas a sus congéneres por razones expositivas.



Territorios

En un mundo cerrado como el del bosque, donde la visibilidad resulta mínima, donde los mil claroscuros convierten a todos sus pobladores en miméticos, el reconocimiento interspecífico se consigue mediante manifestaciones sonoras.


De aquí que, prácticamente, todas las aves comprendidas en este cuaderno posean cantos muy variados y melodiosos, que contribuyen al mantenimiento de límites territoriales.




CURRUCA
CAPIROTADA





CURRUCA
MOSQUITERA



PETIRROJO





♂♂ de
curruca Capiro-
tada combaten
por un territorio →



MOSQUITERO
COMÚN
←

PARAMOSCAS
CERROJILLO
→



PARAMOSCAS
GRIS
←

Alimentación

	Insectos pequeños	Larvas	Arañas
 Petirrojo	C	D	D
 Curruca Capinada	B	D	C
 Curruca Rabilarga	D	B	A
 Mosquitero Común	A	C	D
 Papamoscas cerrojillo	C	C	C

A = + del 50% **B** = del 25 al 50%

Anélidos	Pequeños Moluscos	Dipteros	Granos, frutos y bayas
+	B	D	+ / A en otoño
+	D	D	+ / A en otoño
+	+	+	+
+	D	B	+
+	D	A	

C = del 15 al 25% D = - del 10%

+ = Indicios

Técnicas de caza

Curruca

Durante el otoño y el invierno, las currucas y petirrojos remodelan su régimen alimentario dando cabida en él a todos los frutos y bayas que entonces menudean en los campos.



Los mosquiteros capturan la mayor parte de sus presas en las hojas de los árboles





Papamoscas Gris

El Papamoscas Gris utiliza siempre el mismo posadero como punto de partida y de retorno en sus acciones predatorias.

Papamoscas

El Papamoscas atrapa al vuelo dípteros y otros pequeños insectos voladores. Su técnica consiste en interceptar la trayectoria de sus presas partiendo de un posadero y yendo, después, a posarse a otro del que partirá de nuevo.



Paradas nupciales DE PETIRROJO

Canto desde posadero
prominente




Los ♂♂ de Petirrojo
llegan a los territorios
de cría con antelación
a las ♀♀. Se instalan y,
desde los más visibles
puntos de su territorio,
cantan infatigable-
mente invitando
las a unírseles.

Ofrenda nupcial: el ♂ alimenta a la
♀ que adopta posturas petitorias
semejantes a las de los pollos




La coloración del pecho actúa como el principal estímulo desencadenante de agresividad entre los petirrojos, como demostró experimentalmente



Lack al provocar los enconados o ataques de petirrojos hacia un simple burrito de plumas de ese color

CORTEJO CURRUCU ZARCERA: Cuando una ♀ decide aceptar la compañía del ♂ afincado, este emprende una violenta persecución con un pedazo de hierba en el pico.

La ♀ contesta con despliegue de alas y cola, a la vez que salta hacia el ♂ como para intimidarle.



Cuadro cronológico




Petirrojo

Enero Febrero Marzo Abril Mayo



Curruca Mosquitera

Enero Febrero Marzo Abril Mayo



Curruca Cabecinegra

Enero Febrero Marzo Abril Mayo



Mosquitero Común

Enero Febrero Marzo Abril Mayo



Mosquitero Musical

Enero Febrero Marzo Abril Mayo



Bisbita Arbóreo

Enero Febrero Marzo Abril Mayo










Papamoscas Cerrojilla

Enero Febrero Marzo Abril Mayo



■ Celo y construcción nido
 ■ Incubación
 ■ Pollos en el nido



Nidos

Nido de Curroca Zarcera

Bien oculto entre
densa vegetación
herbácea o arbus-
tiva. Muy raros
en árboles



Nido de Petirrojo

Generalmente muy cerca
del suelo. Acúmulo
perfectamente
entrelazado de
raíces, hojas y
crines ligeramente
amparado en
una cavidad o matorral.

$D = 14 \times 10 \text{ cm}$

$d = 10 \times 9 \text{ cm}$

$H = 7.5 \text{ cm.}$

$h = 5 \text{ cm.}$



Nido de Papamoscas Cerrojillo

Las dimensiones resultan muy variables aunque prefiere los orificios pequeños que no permitan el acceso a los predadores.



Nido de Mosquitero Papialbo

Siempre muy cerca del suelo al amparo de vegetación densa. Compuesto por brianas de materiales vegetal y pequeños hierbas. Cerrados por encima con un pequeño orificio de entrada.

$D = 10 \times 8 \text{ cm}$

$d = 9 \times 7 \text{ cm}$

$H = 6 \text{ cm}$

$h = 4 \text{ cm}$



Huevos



Petirrojo

Erithacus rubecula

N.º normal: 5 / 6
 extremo: 3 / 9
 Tamaño: 20 x 15,5 mm
 Segunda puesta: Si. 3.ª rara
 Incubación: ♀ 12 / 15 días
 Pollos en nido: 16 días



Bisbita Arbóreo

Anthus trivialis

N.º normal: 4 / 6
 extremo: 8
 Tamaño: 21 x 15,5 mm
 Segunda puesta: Si
 Incubación: ♀ 12 / 15 días
 Pollos en nido: 13 días



Curruca Gavilana

Sylvia nisoria

N.º normal: 5
 extremo: 4 / 6
 Tamaño: 21 x 14 mm
 Segunda puesta: Si
 Incubación: ♀♂ 12 / 15 días
 Pollos en nido: 14 días



Curruca Mosquera

Sylvia borin

N.º normal: 4 / 5
 extremo: 3 / 7
 Tamaño: 20 x 15 mm
 Segunda puesta: Rara
 Incubación: ♀♂ 11 / 12 días
 Pollos en nido: 10 días



Curruca Mirlona

Sylvia hortensis

N.º normal: 4 / 5
 extremo: 6
 Tamaño: 20 x 15 mm
 Segunda puesta: Si
 Incubación: ♀♂ 14 días
 Pollos en nido: 14 / 16 días



Curruca Zarcerilla

Sylvia curruca

N.º normal: 4 / 6
 extremo: 3 / 7
 Tamaño: 17 × 13 mm
 Segunda puesta: Si
 Incubación: ♀♂ 10 / 11 días
 Pollos en nido: 11 días



Curruca Tomillera

Sylvia conspicillata

N.º normal: 4 / 5
 extremo: 3 / 6
 Tamaño: 17 × 13 mm
 Segunda puesta: Si
 Incubación: ♀♂ 12 / 14 días
 Pollos en nido: 13 días



Curruca Carrasqueña

Sylvia cantillans

N.º normal: 3 / 4
 extremo: 5
 Tamaño: 16 × 13 mm
 Segunda puesta: Si
 Incubación: ♀♂ 11 / 12 días
 Pollos en nido: 12 días



Curruca Rabilarga

Sylvia undata

N.º normal: 3 / 4
 extremo: 6
 Tamaño: 18 × 14 mm
 Segunda puesta: Si. 3.ª rara
 Incubación: ♀♂ 12 / 13 días
 Pollos en nido: 12 días



Mosquitero Musical
Phylloscopus trochilus

N.º normal: 6 / 7
extremo: 3 / 9
Tamaño: 16 × 12 mm
Segunda puesta: Rara
Incubación: ♀ 14 días
Pollos en nido: 15 días



Curruca Capirotada
Sylvia atricapilla

N.º normal: 5
extremo: 4 / 6
Tamaño: 19 × 15 mm
Segunda puesta: Si
Incubación: ♀ 12 / 13 días
Pollos en nido: 14 días



Mosquitero Común
Phylloscopus collybita

N.º normal: 4 / 9
extremo: 3 / 5
Tamaño: 15 × 12 mm
Segunda puesta: Si
Incubación: ♀ 14 días
Pollos en nido: 13 días



Papamoscas Cerrojillo
Ficedula hypoleuca

N.º normal: 4 / 7
extremo: 1 / 1
Tamaño: 18 × 13 mm
Segunda puesta: No
Incubación: ♀ 12 / 13 días
Pollos en nido: 15 días

Mosquitero Silbador
Phylloscopus sibilatrix

N.^o normal: 6 / 7
 extremo: 8
 Tamaño: 16 × 12 mm
 Segunda puesta: Rara
 Incubación: 13 días
 Pollos en nido: 11 / 12 días



Papamoscas Gris
Muscicapa striata

N.^o normal: 4 / 5
 extremo: 7
 Tamaño: 18 × 14 mm
 Segunda puesta: Si
 Incubación: 13 días
 Pollos en nido: 13 días



Papamoscas Collarino
Ficedula albicollis

N.^o normal: 6 / 7
 extremo: 4 / 5
 Tamaño: 17 × 13 mm
 Segunda puesta: No
 Incubación: 12 / 13 días
 Pollos en nido:



Papamoscas Papirrojo
Ficedula parva

N.^o normal: 5 / 6
 extremo: 4 / 7
 Tamaño: 16 × 12 mm
 Segunda puesta: No
 Incubación: 12 / 13 días
 Pollos en nido: 13 días

Pollos

*Cutruca Zarcera cebando
a sus pollos*

El período de estancia de los
pollos en el nido resulta muy
corto debido a un constante
aporte de comida por parte
de los progenitores



La mayoría de los jóvenes de los
pájaros del bosque tienen un
plumaje muy discreto que les
protege de los predadores,
al contribuir a su camuflaje.

ALGUNOS JOVENES

Papamoscas
Gris



Curruca
Rabilarga



Petirrojo




El anillamiento científico

Dentro de la variada gama de facetas que comprende la investigación ornitológica, tal vez la más llamativa y popularizada sea la del anillamiento. Hace ya más de ochenta años que los ornitólogos capturan aves vivas, colocan en sus tarsos una anilla metálica en la que figura una inscripción en dave-compuesta generalmente por una o varias letras y una numeración seriada - y tras anotar escrupulosamente especie, lugar y fecha, liberan al ave que continuará su vida normal con un ligero adorno en sus patas. Si, más tarde, una de estas aves es hallada muerta o capturada, toda persona podrá dar noticia del suceso pues en las anillas figura siempre un remite postal. Las comunicaciones de recuperación de aves marcadas permiten a los investigadores obtener información sobre la duración de la vida de las aves, sus rutas migratorias, sus zonas de cría e invernada, su capacidad de desplazamiento e, incluso, la velocidad del vuelo.

Colaborar en la difusión de estos hallazgos es una elemental tarea de todo naturalista. Los Centros de Ani-

llamamiento de todo el mundo agrade-
cen estas comunicaciones proporcionan-
do al comunicante la historia complé-
ta del ave recuperada



Ornitólogo toma medidas de un pájaro recién
capturado, antes de liberarlo.

CLASIFICACIÓN Y NOMENCLATURA

FAMILIA	GENERO	ESPECIE	CASTELLANO	CATALÁN	GALLEGO	VASCUENCE
	Muscicapa	<i>M. striata</i>	Papamoscas Gris	Papamosques Gris	Papamoscas Apardado, Mosquera	Euli-txori Gorritza
MUSCICAPIDAS	Ficedula	<i>F. albicollis</i>	Papamoscas Collarino	Papamosques de Collar		Euli-txori Papar-zuri
		<i>F. hypoleuca</i>	Papamoscas Cerrojillo	Mastagataixes, Blanqueta	Papamoscas Negro, Pitu, Tordilla	Euli-txori
		<i>F. parva</i>	Papamoscas Papirrojo	Papamosques Menut		Euli-txori lapar-gorri
TURDIDAS	Eritacus	<i>E. rubecula</i>	Pedríojo, Pisco	Pit-róg, Ropit	Paparrubio, Raizin, Papirroyo, Peizoque	Txantxangorri
MOTACILIDAS	Anthus	<i>A. trivialis</i>	Bisbita Arbóreo	Piula dels Arbres	Pica das Arbres, Calandria Pequena	Zuatz-gurita
SYLVIA		<i>S. nisoria</i>	Curruca Gavilana	Tallarol Esparverenc	Papuxa Ollobranca, Xiblat	Zozo-txinbo
		<i>S. hortensis</i>	Curruca Mirloña	Tallarol Emmascarat	Papuxa Apardada, Papuda	Txinbo
		<i>S. borin</i>	Curruca Mosquitera	Tallarol Gros	Papuxa Careta	Sasi-txinbotxo
		<i>S. curruca</i>	Curruca Zarcerilla	Tallarol Xerraire	Papuxa Patimarela	Exkai-txinbo
		<i>S. conspicillata</i>	Curruca Tomillera	Tallarol Trencamates	Papuxa Paparrubia, Papuda Roxa	Txinbo Papagorritza
		<i>S. cantillans</i>	Curruca Carrasqueña	Tallarol de Garriga	Papuxa das Amoras, Barbuda, Capirote	Txinbo Kaskabeltz
		<i>S. atricapilla</i>	Curruca Capirotada	Tallarol de Casquet	Papuxa Cabecinegra	Txinbo Burubeltx
		<i>S. melanocephala</i>	Curruca Cabecinegra	Tallarol Capnegre	Papuxa Sarda	Sasi-txinbo
		<i>S. sarda</i>	Curruca Sarda	Tallareta Sarda	Papuxa Común, Papoxa	Ota-txinbo
		<i>S. communis</i>	Curruca Zarcera	Tallareta	Papuxa de Ruppell	
SILVIDAS		<i>S. undata</i>	Curruca Rabilarga	Tallareta Cuallarga	Papuxa Montés, Cotoyria	
		<i>S. ruppellii</i>	Curruca de Ruppell	Tallarol Golanegre	Papuxa de Ruppell	Txiio
		<i>Ph. collybita</i>	Mosquitero Común	Mosquiter Groc Petit	Picafollas, Ployria	Txiio Ori
		<i>Ph. trochilus</i>	Mosquitero Musical	Mosquiter Groc Gros	Picafollas Cantor, Ployria de Rio	Txiio Lepozuri
		<i>Ph. bonelli</i>	Mosquitero Papialbo	Mosquiter Pallid	Picafollas Abuado, Ployria de Monte	Txiio Txistulari
	Phylloscopus	<i>Ph. sibilatrix</i>	Mosquitero Silbador	Mosquiter Xiulaire	Picafollas Asubiador, Ployria	

FUENTES: Sociedad Española de Ornitología, Institución Catalana d'Història Natural, Angel Cabrera, J. Maluquer i Sostres, Sociedade Galega d'Historia Natural, Grupo de Ciencias Aranzadi, datos del autor y comunicaciones privadas.

Cuadernos de Campo del Dr. Félix Rodríguez de la Fuente

Cada miércoles en su quiosco o librería

Títulos de la colección:

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1 - El Lince y el Gato Montés | 31 - Las Cigüeñas |
| 2 - Grandes Águilas | 32 - Peces de Mar |
| 3 - El Lobo | 33 - Palomas y Tórtolas |
| 4 - Rapaces Nocturnas | 34 - Aves Marinas |
| 5 - El Jabalí | 35 - Abubilla, Carraca
y Abejaruco |
| 6 - Pájaros Carpinteros | 36 - Rapaces del Bosque |
| 7 - La Cabra Montés y el
Muflón | 37 - Aves de la Costa |
| 8 - Pájaros del Bosque (I) | 38 - Pájaros del Campo
Abierto |
| 9 - Víboras y Culebras | 39 - La Gineta y el Meloncillo |
| 10 - Los Buitres | 40 - Somormujos y Zampullines |
| 11 - El Zorro | 42 - Anfibios |
| 12 - Aves de la Estepa | 43 - Perdices y Codornices |
| 13 - Pequeños Carnívoros | 44 - Pájaros Cantores |
| 14 - Peces de Río | 45 - Milanos y Aguiluchos |
| 15 - Pájaros de Medio Urbano | 46 - Becadas y Becacinas |
| 16 - El Quebrantahuesos y el
Alimoche | |
| 17 - Los Córvidos | |
| 18 - Peces de Lagos y
Marismas | |
| 19 - Halcones y Cernícalos | |
| 20 - Lagartos y Lagartijas | |
| 21 - Las Garzas | |
| 22 - Pequeñas Águilas | |
| 23 - Las Grullas | |
| 24 - Liebre y Conejo | |
| 25 - Los Patos | |
| 26 - Pájaros del Bosque (II) | |
| 27 - Pájaros de la Marisma | |
| 28 - Aves Viajeras (I) | |
| 29 - Pájaros de Río | |
| 30 - Aves Marinas Coloniales | |

Reserve su ejemplar



EDITORIAL MARIN S.A.