




Dr. Félix Rodríguez de la Fuente

CUADERNOS DE CAMPO

**PAJAROS DE
MONTANA**



EDITORIAL MARIN S.A.



Iberiano Hortalano ♂
en canto nupcial

S^a de Alcaraz
(Albacete)

Mayo 1974



Colirrojo Real ♂
en el acceso de
sonido.

Pinar del Horquillo
(Cuenca)

Junio 1975

*Cuaderno de Campo
del Dr. Félix Rodríguez de la Fuente*

PAJAROS DE MONTAÑA

47

*Acentor común
en zona de
invernada
La laguna
(Jaén)
Marzo 1972*



**EDITORIAL
MARIN, S.A.**

NO CIRCULANTE

Sumario

Notas de Campo	2
Aspecto y dimensiones	6
Equipo	18
Distribución ecológica	22
Reparto ecológico de la montaña	24
Territorios	26
Alimentación	28
Técnicas de caza	30
Paradas nupciales	32
Cuadro cronológico	38
Nidos	40
Huevos	42
Pollos	44
Otros pájaros de montaña y tundra	46
Clasificación y nomenclatura	48

Cabezas de
Pájaros de Montaña



Gorrion
Alpino



Pechiazul



Acentor
Alpino



Treparriscos



Roquero

PROCEDENCIA

Donativo.

018043-02

\$ 500

FECHA

99 03 16.

CUADERNOS DE CAMPO DEL
DR. FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE

Idea y diseño de Editorial Marín, S. A.

Ilustración color ISIDRO MONÉS

Dibujos negro Juan Manuel Varela

Coordinación Joaquín Araujo

Dirección Félix Rodríguez de la Fuente

© EDITORIAL MARÍN, S. A. 1978

Nicaragua, 85-95, Barcelona-29, Spain

ISBN 84-7102-500-0 la Colección

ISBN 84-7102-547-7 Pájaros de Montaña

Impreso por Artes Gráficas Toledo, S. A.

Depósito Legal: To 816 - 1978

Distribuido por Marco Iberica, D. de E., S. A.

Precio: 100,— Ptas.

590
Rod
e
2.47

NOTAS DE CAMPO



Combate entre ♂ y ♂ de
Treparriscos-Peñavieja. Pícor de Europa
(Santander)

Durante el invierno los
bandos de escribanos
nirales frecuentan las playas
y dunas costeras

Junio 1970



Muchos etólogos se preguntan si el cerebro humano que ha evolucionado a expensas de los suaves estímulos generados en la naturaleza y en sus sencillas comunidades durante millones de años no se estará saturando como consecuencia del monstruoso incremento de las imágenes, de los sonidos, de los olores y de las emociones que le bombardean en la cultura tecnológica de nuestros días.

Quizá, quienes mejor podemos apreciar estos matices somos quienes hemos tenido la oportunidad de pasar de una infancia agreste y aldeana a una madurez en el seno de cualquier megápolis; al profundizar en los matices que fueron construyendo nuestra fantasía en los días infantiles de la naturaleza, en mi caso se destacan algunos hitos que no podré olvidar mientras viva.

Para el niño de pueblo, libre de la infinidad de estímulos - auténtico lavado de cerebro - que llegan hoy a los muchachos a través de la televisión, de los anuncios, de las revistas y de la turbamulta urbana, la naturaleza es la fuente inagotable que va nutriendo su curiosidad. Y en ella las formas más atractivas, tanto por su belleza como por su movimiento y su sonido, son, precisamente, las aves. Quizá, por ello, nos dijeran a

los niños de pueblo, distraídos, que tenía
mos la cabeza llena de pájaros.

Pues bien, entre los pájaros que fueron
llenando mi cabeza durante los primeros
años de mi vida, hay uno que permanece
vivo, definido, rutilante, en el ya desbor-
dado archivo de mi memoria: me refie-
ro al Roquero Rojo.

La soleada ladera que trepa hacia los altos
farallones rocosos que separan el Paíamo de
Poza de las feraces tierras de la Bureba; la
suave brisa del mes de Mayo; el pardo uni-
verso de los tomillares y aliagares; las ás-
peros bloques de berroqueña desprendidos,
del farallón; y de pronto, como una aparición,
un ave compacta, roja, azul y blanca; un ave
que se destaca sobre la arista de una ca-
liza, que alza la cabeza y emite un tri-
no singular.

Y el niño montaraz y solitario se queda
quieto, como transfigurado. Algo
así debió sentir el nombre
de Altamira

antes de
reproducir
las inmortales
imágenes de sus
bisontes en el techo
cósmico de la caverna.



Aspecto y dimensiones



Dorso
oscuro

Bisbita Ribereño Costero

Anthus spinoletta petrosus

Bisbita Ribereño Alpino

Anthus spinoletta spinoletta

Pecho
muy
moteado

Bisbita
Ribereño Costero

Altura:	16 cm
Peso:	23 gr
Ala:	♂ 90-♀ 85 mm
Envergadura:	28 cm
Pico:	15 mm
Tarso:	24 mm
Cola:	68 mm

Dorso
claro




Pocas
motas

Bisbita Ribereño
Alpino

Este pequeño pájaro presenta dos variedades de plumaje correspondientes a la raza *costera* que vive en los acantilados marinos y la *alpina*, que prefiere las altas cotas montañas. Resultan más grandes que sus congéneres, de los que hablamos en el cuaderno de los Pájaros del Campo Abierto. Son gráciles, con la cola larga y plumaje gris en partes dorsales y más claro en las ventrales.

El *Alpino* carece de punteaduras y es más pálido, mientras que el *Costero* resulta notablemente más oscuro y tiene el pecho y los costados muy moteados.



Ceja marcada

Pechiazul

Luscinia svecica

Altura:	13 cm
Peso:	14-22 gr
Ala:	♂ 73-♀ 70 mm
Envergadura:	23 cm
Pico:	13 mm
Tarso:	25 mm
Cola:	49 mm

La mota del
centro del pecho
puede ser
blanca en
las razas del
centro y sur
de Europa.

Cola rojiza
por
encima




Partes ventrales
blancas



Pájaro de aspecto muy similar al familiar Petirrojo y que, como éste, ostenta en el pecho su plumaje más conspicuo. Un gran babero azul orlado de tres finas estrías: negra, blanca y rojiza caracteriza al macho. En el centro de la mancha azul tienen una pequeña mota blanca o roja, según las razas, pero que en los ejemplares del Este de Europa llega a desaparecer.

La hembra sólo conserva ligeros vestigios del contrastado plumaje del macho. Ambos sexos tienen la cabeza y las partes superiores pardo oscuras y la ceja blanca.



Cabeza y
pecho grises

Acentor Alpino
Prunella collaris

Altura:	16,5-18 cm
Peso:	40 gr
Ala:	102 mm
Envergadura:	30 cm
Pico:	15 mm
Tarso:	24 mm
Cola:	64 mm

Alas
marrones


Babero
finamente
punteado

Partes ventrales
blanquecinas

Rechoncho
bastante
grande

Ave rechoncha y apreciablemente mayor que otros pájaros de montaña. Su librea, pardo grisácea con motas blancas, le hace muy mimético. En la garganta tiene ligeras motas negras sobre fondo blanco. Flancos castaños y mancha alar negra.

Invierna frecuentemente en roquedos del litoral mediterráneo



Acentor Común

Prunella modularis

Altura: 14,5 cm

Peso: 20 gr

Ala: 68 mm

Envergadura: 21 cm

Pico: 14 mm

Tarso: 20 mm

Cola: 58 mm

Dorso
pardo con
estrias
negras


Ojos castaño
vivo

Pecho
gris.

Poco
llamativo

Muy frecuente en nuestro país
durante el invierno

Pajarillo francamente muy poco
conspicuo con cabeza y partes
ventrales grisáceas y las
dorsales pardas con motas
oscuras. Flancos listados.






Roquero Rojo *Monticola saxatilis*

Altura:	18 cm
Peso:	63 gr
Ala:	♂ 123-♀ 119 mm
Envergadura:	35 cm
Pico:	24 mm
Tarso:	27 mm
Cola:	63 mm

Tamaño de mirlo pero con la cola muy corta. El macho luce un plumaje nupcial vistoso.

La cabeza y el cuello son de un color azul celeste que en el dorso se oscurece. Obispillo blanco y alas negras. Las partes inferiores y la cola resultan rojo-anaranjadas provocando un llamativo e inconfundible diseño cromático. La hembra sólo conserva un poco de rojo en la cola; el resto de su plumaje es pardo claro con punteaduras blanquecinas.




Roquero Azul *Monticola solitarius*

Altura:	20 cm
Peso:	68 gr
Ala:	126 mm
Envergadura:	35 cm
Pico:	28 mm
Tarso:	29 mm
Cola:	82 mm



Tamaño de Mirlo
pequeño

Algo mayor y con cola más larga que su congénere. El macho de Roquero Solitario tiene plumaje totalmente azul-cobalto con alas y cola más oscuras, pico y patas negros. La hembra puede lucir un plumaje idéntico al del macho, aunque la mayor parte de los ejemplares resultan pardos muy oscuros con moteado claro.






Colirrojo Real

Phoenicurus phoenicurus

Altura:	13,5 cm
Peso:	15 gr
Ala:	♂ 78-♀ 75 mm
Envergadura:	23 mm
Pico:	14 mm
Tarso:	24 mm
Cola:	54 mm



Pequeño y vivaracho pajarillo. Ambos sexos tienen la cola de intenso color castaño. El resto del plumaje de la hembra resulta poco llamativo con partes superiores pardo claras e inferiores cremosas. El macho luce, sin embargo, una espléndida librea con pileo y dorso gris-azulados, frente blanca, mejillas y garganta negras y región ventral castaña.



Mancha
alar blanca

Muy oscuro



Colirrojo Tizón *Phoenicurus ochrurus*

Altura:	15,5 cm
Peso:	17 gr
Ala:	♂ 86-♀ 83 mm
Envergadura:	26 cm
Pico:	14 mm
Tarso:	22 mm
Cola:	61 mm


El macho es casi totalmente gris-oscuro con negro en mejillas, pecho y garganta. Mancha alar blanca y cola rojiza como la de la hembra, que resulta homogéneamente pardo oscura.

cola rojiza

cola
llamativa →



Parda oscura




Escribano Nival

Plectrophenax nivalis

Altura:	16,5 cm
Peso:	32 gr
Ala:	♂ 108-♀ 103 mm
Envergadura:	29 cm
Pico:	11 mm
Tarso:	22 mm
Cola:	67 mm



Cabeza y partes inferiores blancas




Fisionomía de escribano típico con la notable peculiaridad de tener el pico bastante más pequeño que el de sus congéneres. El macho, en plumaje primaveral, resulta inconfundible. Tiene cabeza, partes ventrales y alas blancas, exceptuando las remiges primarias. Dorso y cola negros, ésta con los bordes blancos. La hembra siempre y el macho en invierno ostentan una librea más apagada, con dominio de los tonos terrosos y profusas motas en el dorso.




Escribano Hortelano

Emberiza hortulana

Altura:	14 cm
Peso:	24 gr
Ala:	♂ 89-♀ 84 mm
Envergadura:	25 cm
Pico:	11 mm
Tarso:	20 mm
Cola:	65 mm



El macho parece encapuchado por el contraste que provoca su cabeza, cuello y pecho verdosos con el resto del plumaje pardo rojizo. La garganta es amarilla, la espalda está muy moteada y el pico resulta rosáceo. La hembra es pardo-oscuro con el pecho listado de negro.




Pico
amarillo



Cabeza de
♂ en invierno

Corrión Alpino *Montifringilla nivalis*

Altura:	16 cm
Peso:	40 gr
Ala:	♂ 124-♀ 116 mm
Envergadura:	33 cm
Pico:	13 mm
Tarso:	22 mm
Cola:	72 mm



Pájaro grande y robusto. Los adultos tienen blanco en la cola y alas —a excepción de las remiges primarias— y una franja central y el extremo de las rectrices, que son negras. Partes ventrales blanquecino-grisáceas, cabeza gris y dorso pardo. En la garganta aparece una mancha oscura.

Treparriscos

Trichodroma muraria

Altura:	13,5 cm
Peso:	19 gr
Ala:	♂ 101-♀ 98 mm
Envergadura:	26 cm
Pico:	29 mm
Tarso:	22 mm
Cola:	57 mm

Pico largo y decurvado

Plumaje
del cuerpo
↓ gris
oscuro

Alas
carmesí


Vuelo
mariposeante

Grandes
lunares
blancos en
las alas



Bandas rectrices
blancas

El Treparriscos es una de las aves más peculiares de la montaña. Difícil de observar cuando permanece posado sobre las rocas por su plumaje gris oscuro, a excepción de la garganta y cola que son negras, ésta última con el extremo blanco. Las alas son de vivo color granate con las remiges negras. En las primarias tiene grandes manchas blancas.




TREPARRISCOS



Pico largo y decurvado, apto para extraer pequeños insectos de las más pequeñas grietas

En la morfología de los treparriscos encontraremos rasgos que ya conocemos en los trepadores y que responden a la adaptación a una vida desarrollada constantemente sobre superficies verticales.



ALAS

Alas anchas y redondeadas proporcionan al Treparriscos un vuelo boyante, aunque no incisivo.


PATAS

Largas, fuertes y afiladas uñas que se sujetan a cualquier mínimo saliente.



COLA

Cola corta, ancha y recta, sirve como apoyo en las superficies de los cantiles.



El cambio de plumaje según las estaciones

ESCRIBANO NIVAL

En invierno



En primavera



GORRIÓN ALPINO



En invierno

En primavera



Los cambios de plumaje según las estaciones responden a dos principales motivaciones. Por una parte a la imperiosa necesidad de los machos de resultar muy llamativos de cara a las obligaciones reproductoras durante la primavera; y por otra todo lo contrario, es decir ser miméticos durante el invierno, para pasar inadvertidos a los predadores.

Equipo

PICOS Y CABEZAS



Gorrión Alpino



Acentor Alpino



Pechiazul




Rojero
Rojo

Colirrojo
Tizon




Los pájaros de la Alta Montaña pertenecen a diferentes familias dentro del orden de los paseriformes, por lo que su estructura corporal difiere notablemente. Especificamos aquí los rasgos anatómicos más sobresalientes, en especial los de especies no tratadas anteriormente.



ALAS


Roquero Rojo

Colirrojo
Tizon




PATAS

Gorrion Alpino




saltadoras
marchadoras
prensoras



Pedicular





Distribución ecológica



Roquero Solitario

* *



Acentor Común



**Bisbita Ribereño
Costero**

Bosque mediterráneo



Costa



Hemos agrupado en este cuaderno un conjunto de aves propias del bioma de Alta Montaña con algunos de sus congéneres que viven en otros ecosistemas.

Para evitar cualquier posible error de interpretación señalamos las especies que figuran aquí sólo por razones de parentesco sistemático.

* En el sur de Europa sólo en Alta Montaña.

* * Siempre.

(*) En todo tipo de roquedos a cualquier altitud incluso en casas y tapias

NO CIRCULANTE

590
Pol
C
L.47

018043

Reparto ecológico de la montaña




Las duras condiciones de la Alta Montaña, provocan una considerable uniformidad a su sistema ecológico caracterizado, además, por cortísimos periodos de actividad biológica, escasez de formas vivas y muy bajas densidades poblacionales. Las pocas especies que han elegido este inhóspito habitat se reparten los limitados recursos mediante la explotación de nichos claramente diferenciados. El esquema intenta plasmar esta sutil zonificación.


DETALLE DE REPARTO DE UNA ZONA ACANTILADA

- Gorrión Alpino
- Colirrojo Tizón
- Pechiazul
- Acentor Alpino
- - - Treparriscos


1.500 m

2.000 m






Territorios



TERRITORIO MEDIO EN ZONA DE MONTAÑA

Pechiazul 5 H² - Acentor Común 1 H²
Acentor Alpino (varias parejas en 1 H²)



Pechiazul, canta desde posadero, exhibiendo su llamativo babero. Semaforos sonoro y óptico de posesión y marcaje territorial

El bioma de montaña impone una actitud claramente exclusivista por parte de los pájaros que en él habitan.

La falta de lugares apropiados para nidificar, el paisaje abierto y los limitados recursos, obligan a los machos de todas las especies a una constante exhibición, tanto de sus fanéricos plumajes como de sus melodiosos cantos.

Colirrojo Tizón 1/2 H₂ - El Bisbita Común se diferencia del Alpino por estar muy disperso en pastizales con agua

Alimentación

Moluscos

Arañídeos



Pechiazul



3 1 1

Treparriscos



1 2 2 1



Roquero Solitario

1 3 1 3

Acentor Alpino



2 3 2 3



Colirrojo Tizón

3 3 3 3

Bisbita Ribereno



2 3 3 2




Escribano Nival

2 3 2 3


Azul: Primavera
Verano

Rojó: Otoño
Invierno

Dípteros	Coleópteros	Semillas	Frutos
			
2 1	1	3 2	
2 1	2 1		
1 3	2	3 1	1
2 3	1 2	3 3	
2 3	1 3	+	
2 3	1 3	+	
3 2	1 2	1 1	1 +

1 : Muy importante 3 : Poca
 2 : Relativ. importante presencia

Técnicas de caza




COLIRROJO TIZÓN

El Colirrojo Tizón
captura pequeños insectos - tanto en vuelo como
en el suelo - acechándolos desde un posadero.



Roquero Solitario

Durante el otoño el
Roquero Solitario
consume grandes
cantidades de
frutos.





Treparriscos

El decurvado
pico del Treparriscos alcanza
pequeños molus-

cos e insectos que se
refugian en los inters-
ticios de la roca.

ESCRIBANO NIVAL

El Escribano Nival pasa el invierno
en las playas, frecuentando la zona
de dunas a la busca de
pequeñas semillas



Paradas nupciales


Caída con cola levantada

♂ cae lentamente con la cola levantada.



Vuelo circular

Levanta el vuelo con trayectoria ascendente y dibuja círculos en el cielo.



GORRIÓN ALPINO

canto territorial



El ♂ se hace patente a las ♀♀ y las atrae hacia su territorio desde un punto dominante


Canto desde
posadero



PECHARZUL


Exhibición medalla


La virriopinta pechera
del Pechiazul es
exhibida constante-
mente durante la
parada
nupcial.



Danza entorno

Alas caídas y cola
abierta en abanico,
el ♂ despliega to-
dos sus ornamentos





Pelea de machos

Durante la época nupcial,
los ♂♂, sostienen
enconados combates
para dilucidar cual
de ellos queda en
posesión de la
parcela nupcial,
así como de la
♀ en disputa



Treparriscos
en cantil en
postura de
exhibición
de plumaje
nupcial



VUELO DE CORTEJO


El ♂ despliega toda
su vistosidad volando
en círculos ante el
posadero de la ♀

ACENTOR COMÚN




1/ Salta de
rama en rama

La parquedad en
colorido del plumaje
del Acentor Común
determina en gran
manera una conduc-
ta más movida duran-
te las ceremonias de
cortejo.



2/ Abre pico
y esponja
plumaje



3/ Alas temblo-
ras y agita
cola


ROQUERO SOLITARIO



Señales fonéricas del macho

El brillante azul del Roquero Solitario, lanza destellos en todas direcciones desde su posadero, así como cuando realiza su característico vuelo, informando a sus congéneres y también a las ♀♀ de su presencia y situación territorial.


♂




Cuadro cronológico



Acentor Alpino




Roquero Rojo




Treparriscos




Pechiazul









Bisbita Ribereño Alpino



Colirrojo Tizón






 Pollos en nido

Nidos

NIDO DE COLIRROJO
TIZON



NIDO DE ROQUERO
SOLITARIO



NIDO DE
ESCRIBANO
HORTELANO





NIDO DE PECHIAZUL

En el suelo, esmerada construcción.



NIDO DE TREPARRISCOS

En fisuras y oquedades situadas en cantiles extraplomados, o veces en construcciones. Resulta muy voluminoso.

Construcción bien acabada

Huevos



Bisbita Ribereño
Anthus spinoletta

N.º normal: 4 - 6
Tamaño: 21 x 15 mm
2.ª puesta: En el Sur
Incubación: ♀ 14 días
Pollos en nido: 14 - 16 días



Acentor Alpino
Prunella collaris

N.º normal: 3 - 6
Tamaño: 23 x 16 mm
2.ª puesta: Sí
Incubación: ♂♀ 15 días
Pollos en nido: 20 días



Roquero Rojo
Monticola saxatilis

N.º normal: 4 - 6
Tamaño: 26 x 19 mm
2.ª puesta: No
Incubación: ♀ 14 - 15 días
Pollos en nido: 14 - 16 días



Colirrojo Real
Phoenicurus phoenicurus

N.º normal: 4 - 10
Tamaño: 18 x 13 mm
2.ª puesta: Sí
Incubación: ♀ 11 - 14 días
Pollos en nido: 14 - 20 días



Colirrojo Tizón
Phoenicurus ochruros

N.º normal: 4 - 6
Tamaño: 19 x 14 mm
2.ª puesta: Sí, a veces 3
Incubación: ♀ 12 - 16 días
Pollos en nido: 19 días



Escribano Nival
Plectrophenax nivalis

N.º normal: 4 - 8
Tamaño: 22 x 16 mm
2.ª puesta: Sí
Incubación: ♀ 10 - 15 días
Pollos en nido: 10 - 14 días

Roquero Solitario
Monticola solitarius

N.º normal: 4 - 6
Tamaño: 27 x 20 mm
2.ª puesta: Rara
Incubación: ♀ 12 - 13 días
Pollos en nido: 17 días



Escribano Hortelano
Emberiza hortulana

N.º normal: 4 - 6
Tamaño: 20 x 16 mm
2.ª puesta: Sí
Incubación: ♀ 11 - 14 días
Pollos en nido: 10 - 15 días



Gorrión Alpino
Montifringilla nivalis

N.º normal: 4 - 7
Tamaño: 23 x 17 mm
2.ª puesta: Rara
Incubación: ♂♀ 13 - 14 días
Pollos en nido: 21 días



Pechiazul
Luscinia svecica

N.º normal: 5 - 9
Tamaño: 19 x 14 mm
2.ª puesta: Rara
Incubación: ♀ 14 - 15 días
Pollos en nido: 14 días



Acentor Común
Prunella modularis

N.º normal: 4 - 6
Tamaño: 20 x 14 mm
2.ª puesta: Sí, a veces 3
Incubación: ♀ 12 - 13 días
Pollos en nido: 12 días



Treparriscos
Tichodroma muraria

N.º normal: 3 - 5
Tamaño: 21 x 14 mm
2.ª puesta: No
Incubación: ♀ 18 - 19 días
Pollos en nido: 21 - 26 días



Pollos

Pollo de Colirrojo Tizón



Los pollos de Colirrojo Tizón
nacen desnudos y ciegos
como corresponde a una
especie nidícola.

Abren los ojos
al 4º día de
edad y
completa su
desarrollo a
los 19 días.

El estímulo clave que condiciona
a todos los adultos de
las aves a la ceba
de sus polluelos,
es el paladar
vivamente
coloreado de
éstos.



Los jóvenes de la mayoría de los pájaros de Montaña tienen durante su primer año de vida un plumaje que difiere notablemente del de los adultos.

Resultan más pardos, manchados y en general suelen mimetizarse mejor con su medio ambiente.



JOV.

ACCENTOR
COMUN



JOV.

GORRIÓN ALPINO

PECHIAZUL

Recuerda al Petirrojo; tiene algo de castaño en la cola



JOV.

Otros pájaros de Montaña y Tundra

ESCRIBANO LAPÓN
Calcarius lapponicus
15 cm

El Escribano Lapón es uno de los passeriformes más abundantes de la tundra Euroasiática y Norteamericana.

Los machos tienen ceja clara, píleo castaño, partes inferiores claras y negro en ambos lados del pecho.

Aparición muy esporádica en el centro de Europa.



COLIAZUL CEUIBLANCO
Tarsiger cyanurus
14 cm

En los bosques de coníferas de las altas latitudes europeas vive este vistoso insectívoro de conducta escondidiza.

Los machos resultan muy contrastados por presentar dorso azul vivo, costados anaranjados

y píleo blanco.

Hembras y jóvenes tienen un plumaje de colorido más apagado.



MOSQUITERO BOREAL
Phylloscopus borealis
12 cm



Este pequeño
mosquitero de la
zona subártica
puede ser diferenciado
de sus congéneres por su
garganta blancuzca, ceja
oscura, franjas abares de
color crema y pico oscuro.

BISBITA GORGIRROJO
Anthus cervinus
14'5 cm



Este bisbita de la tundra
Euroasiática resulta lige-
ramente más grande
que el común. Presen-
ta dorso y pecho
muy moteados y
mancha roja en
pecho y gar-
ganta.

Raramente apare-
ce en nuestras
latitudes.

NO CIRCULANTE

CLASIFICACIÓN Y NOMENCLATURA

FAMILIA	GÉNERO	ESPECIE	CASTELLANO	CATALÁN	GALLEGO	VASCUENCE	BABLE
MOTACÍ- LIDAS	Anthus	<i>A. sp. spinoletta</i>	Bisbita Ribereño Alpino	Grasset de Muntanya	Pica Patinegra Montés		Zarapica
		<i>A. sp. petrosus</i>	Bisbita Ribereño Costero	Grasset d'Aigua	Pica Patinegra Mareira	Ur-gurita	
		<i>A. cervinus</i>	Bisbita Gorgirrojo	Fiula Golarroja	Pica da Gorxa Rubia	Gurita Lepagorri	
	Calcarius	<i>C. lapponicus</i>	Escribano Lapón	Repicatalons de Lapónia			
EMBERÍ- CIDAS	Emberiza	<i>E. hortulana</i>	Escribano Hortolano	Hortolá	Escribenta dos Hortas	Baratz Berdantz Elur Berdantz	Escribana Montesiná
	Plectrophenax	<i>P. nivalis</i>	Escribano Nival	Sit Blanc			
PLOCETIDAS	Montifringilla	<i>M. nivalis</i>	Gorrion Alpino	Pardal d'Ala Blanca	Gorrion Albar	Elur Txolarre	Gurrion de Neveru
SÍTIDAS	Tichodroma	<i>T. muraria</i>	Treparriscos	Pela-roques	Bubela Bermella	Arkaiz Txori	Llastrina
		<i>P. modularis</i>	Acentor Común	Pardal de Bardissa, Xalambri	Azulenta Común	Burnitxori	Cenicienta
PRUNÉ- LIDAS	Prunella	<i>P. collaris</i>	Acentor Alpino	Cercavores	Azulenta Papuda	Arkaiz- burnitxori	Neverin
		<i>M. saxatilis</i>	Roquero Rojo	Merla Roquera	Merla Rubia	Arkaiz Zozo	Roxu
TÚRDÍ- DAS	Monticola	<i>M. solitarius</i>	Roquero Solitario	Merla Blava, Pàssera	Merla Azul	Arkaiz Zozo -Urdin	Ñerbatu de Pedreru
		<i>Ph. phoenicurus</i>	Colirrojo Real	Cotxa Cua-roja	Curroxo Real	Buztangorri	Temblarrabos
	Phoenicurus	<i>Ph. ochruros</i>	Colirrojo Tizón, Colirrojo	Cotxa Fumada	Curroxo Común	Buztangorri Illun	Raitan Moru
	Luscinia	<i>L. svecica</i>	Pechiazul	Cotxa Blava, Blaveta	Papoazul	Paparo Urdin	
MUSCÍCA- PIDAS	Phylloscopus	<i>Ph. borealis</i>	Mosquitero Boreal	Mosquiter Boreal	Picafollas Boreal		
	Tarsiger	<i>T. cyanurus</i>	Coliazul Cejlblanco	Cotxa Cuabiava			

Cuadernos de Campo del Dr. Félix Rodríguez de la Fuente

Cada miércoles en su quiosco o librería

Títulos de la colección:

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1 - El Lince y el Gato Montés | 31 - Las Cigüeñas |
| 2 - Grandes Águilas | 32 - Peces de Mar |
| 3 - El Lobo | 33 - Palomas y Tórtolas |
| 4 - Rapaces Nocturnas | 34 - Aves Marinas |
| 5 - El Jabalí | 35 - Abubilla, Carraca
y Abejaruco |
| 6 - Pájaros Carpinteros | 36 - Rapaces del Bosque |
| 7 - La Cabra Montés y el
Muflón | 37 - Aves de la Costa |
| 8 - Pájaros del Bosque (I) | 38 - Pájaros del Campo
Abierto |
| 9 - Víboras y Culebras | 39 - La Gineta y el Meloncillo |
| 10 - Los Buitres | 40 - Somormujos y Zampullines |
| 11 - El Zorro | 41 - Pájaros del Bosque (III) |
| 12 - Aves de la Estepa | 42 - Anfibios |
| 13 - Pequeños Carnívoros | 43 - Perdices y Codornices |
| 14 - Peces de Río | 44 - Pájaros Cantores |
| 15 - Pájaros de Medio Urbano | 45 - Milanos y Aguiluchos |
| 16 - El Quebrantahuesos y el
Alimoche | 46 - Aves Viajeras (II) |
| 17 - Los Córvidos | 48 - Cisnes y Gansos |
| 18 - Peces de Lagos y
Marismas | 49 - Pequeños Carnívoros (II) |
| 19 - Halcones y Cernícalos | 50 - Aves Viajeras (III) |
| 20 - Lagartos y Lagartijas | 51 - Los Cérvidos |
| 21 - Las Garzas | 52 - Pájaros de los Sotos |
| 22 - Pequeñas Águilas | 53 - Invertebrados Marinos |
| 23 - Las Grullas | 54 - Gallos de Monte |
| 24 - Liebre y Conejo | |
| 25 - Los Patos | |
| 26 - Pájaros del Bosque (II) | |
| 27 - Pájaros de la Marisma | |
| 28 - Aves Viajeras (I) | |
| 29 - Pájaros de Río | |
| 30 - Aves Marinas Coloniales | |

Reserve su ejemplar



EDITORIAL MARIN S.A.