




Dr. Félix Rodríguez de la Fuente

CUADERNOS DE CAMPO

CISNES Y GANSOS



EDITORIAL MARIN S.A.

Cisne Común con cuello
recogido y alas semi-
desplegadas.
Postura de exhi-
bición.

Lago del
Parque
de María
Luisa
(Sevilla)



Combate entre ♂♂
de Cisnes Chicos




Cisnes Mudos despegan trabaja-
mente del
agua.



*Cuaderno de Campo
del Dr. Félix Rodríguez de la Fuente*

CISNES Y GANSOS 48



EDITORIAL
MARIN, S.A.

*Anser Campestre
en su cuartel de
invernada
Benavente (Zamora)
Enero 1977*



NO CIRCULANTE

Sumario

Notas de campo	2
Aspecto y dimensiones	6
Equipo	24
Distribución ecológica	26
Territorios	28
Alimentación	30
Técnicas de caza	32
Técnicas de defensa	34
Paradas nupciales	36
Cuadro cronológico	42
Nidos	44
Huevos	46
Pollos	50
Clasificación y nomenclatura	52

La familia de
cisnes perma-
nece unida.

La ♀ avanza
en cabeza con
algunos pollos
aún sobre su
dorso. Le siguen
otros pollos y
cierta la marcha
el ♂ que vigilará
y cuidará de
toda la familia

Donativo.

018044-02 \$ 5.00
990316

CUADERNOS DE CAMPO DEL DR. FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE

Idea y diseño de Editorial Marín, S. A.

Ilustración color JAN SEMMEL

Dibujos negro Juan Manuel Varela

Coordinación Joaquín Araujo

Dirección Félix Rodríguez de la Fuente

© EDITORIAL MARÍN, S. A. 1978

Nicaragua, 85-95, Barcelona-29, Spain

ISBN 84-7102-500-0 la Colección

ISBN 84-7102-548-5 Cisnes y Gansos

Impreso por Artes Gráficas Toledo, S. A.

Depósito Legal: To-

Distribuido por Marco Ibérica, D. de E., S. A.

Precio de este ejemplar: 100,- Ptas.

Impreso por Artes Gráficas Toledo, S. A.

Deposito Legal: To- 817-1978

Distribuido por Marco Ibérica, D. de E., S. A.

Precio: 100,- Ptas.



NOTAS DE CAMPO



Cisnes en vuelo. Como la mayoría de los anseriformes adoptan formaciones regulares



Maniobras de aterrizaje y despegue. Los cisnes aunque muy ágiles en vuelo y nadando resultan bastante torpes a la hora del despegue



Pocos espectáculos zoológicos comparables a las concentraciones de ansares en los primeros días del invierno. Hoy, el trasiego aéreo de los gansos sólo puede contemplarse en la marisma del Guadalquivir y en la laguna de Villafafila. En otros puntos de la Península se observan bandadas grandes o regulares, pero nunca llegan a reunirse los miles de especímenes que se concentran en Doñana o en la laguna zamorana. Sin embargo, mis primeros contactos con los ansares no tuvieron lugar en ninguno de estos aguarrales -donde, después, les he filmado con detenimiento- sino en la Laguna de la Nava, en Palencia, llamada el Mar de Castilla.

Estudiando Medicina en Valladolid, para un pequeño grupo de entusiastas de la naturaleza la excursión en invierno a la Nava constituía una de las más emocionantes e inolvidables experiencias. Llegábamos al borde de las inmensas y especulares aguas antes del amanecer y cuando los primeros rayos del sol castellano conseguían iluminar la inmensa laguna, ante nuestros ojos, llorosos de frío, tenía lugar una explosión de vida. Cientos, millares de gansos campestres que habían pasado la noche en las aguas someras y en los bancos arenosos, se alzaban describiendo círculos gloriosos, para repartirse después por la

inmensa llanura cerealista.
Las voces de los gansos lo
inundaban todo. El brillo
del sol oblicuo en
candía

sus fuertes
alas con brillos
metálicos. Era como
la gran señal. Después
de los gansos se levantan
las grullas, más ponderadas y
protocolarias, en geométricas formaciones,
lanzando los agudos trompetazos que cons-
tituirían el más adecuado contrapunto a la
garrula algarabía de los ansares. Y tras
ellas, entremezclándose con sus formacio-
nes, los veloces silbones, las cercetas, los ána-
des reales, y la infinidad de chorlitos,
chorlitejas, limícolas...

Hoy, el mar de Castilla es un secarral
cerealista que ha cambiado la gloria de
las aves viajeras por unas pobres casedias
de cebada. Los que conocimos la laguna
de la Nava en todo su esplendor, no po-
demos pasearnos por aquellos eriales
sin que una lágrima - y no de frío -
asome a nuestros ojos.




Aspecto y dimensiones

Tarro Blanco *Tadorna tadorna*

Altura:	57 cm
Peso:	♂ 1125-♀ 765 gr
Ala:	♂ 329-♀ 294 mm
Envergadura:	108 cm
Pico:	♂ 54-♀ 49 mm
Tarso:	53 mm
Cola:	110 mm


Protuberancia
en pico



Manchas alares
blancas



Jorón poco conspicuo



Anátida voluminosa. La cabeza y el nacimiento del cuello son verde-oscuros, mientras en el resto del cuerpo domina el blanco interrumpido en la base del cuello por una banda castaña que se alarga longitudinalmente por el vientre. Remiges primarias negras y espejuelo verde claro. El macho tiene el pico rojo con llamativa protuberancia en la base que falta en la hembra.

Tarro Canelo

Tadorna ferruginea

Altura: 58 cm

Peso: 1000 gr

Ala: ♂ 376-♀ 347 mm

Envergadura: 105 cm

Inconfundible por dominar en su plumaje el pardo amarillento, más pálido en la cabeza. El macho luce una fina línea negra en la base del cuello. Franja alar blanca y remiges negras.

Gran mancha
blanca en las
alas



Cola corta
y recta

Tonos dominantes
pardo terrosos



Cabeza
muy clara




Cabeza
de ♂

Collar negro

Remiges
negras

Extinto en las
marismas del Guadal-
quivir ha sido nueva-
mente introducido



Pico con poco
amarillo y negro

Cisne Chico *Cignus bewickii*

Altura:	114 cm
Peso:	3000-8000 gr
Ala:	♂ 537-♀ 500 gr
Envergadura:	190 cm
Pico:	97 mm
Tarso:	107 mm
Cola:	159 mm

Cuello no
muy largo



Cuerpo blanco

Joven, sin amarillo en
el pico. Pardo muy claro



Los cisnes resultan
inconfundibles por su gran
tamaño, cuello largo y su
plumaje totalmente blanco.
El Cisne Chico puede ser
reconocido por su tamaño
y gracilidad, su cuello
relativamente corto, perfil
de la cabeza redondeado y, sobre
todo, por su pico cónico con
pequeña mancha amarilla.


Cabeza
Voluminosa

Mancha
amarilla
grande

Cisne Cantor

Cygnus cygnus


Altura:	125 cm
Peso:	10.000 gr
Ala:	♂ 615-♀ 590 mm
Envergadura:	230 cm
Pico:	105 mm
Tarso:	116 mm
Cola:	170 mm



Habitantes de la
lejana Tundra los Cisnes
cantores raramente
alcanzan nuestras
latitudes, ni siquiera
en crudos inviernos

Joven muy similar

Una réplica del Cisne Chico, de
mayor tamaño pero con cabeza
claramente más grande, pico muy
largo con amplia mancha amarilla.



Pico
anaranjado
con base
negra

Gran
tamaño

Cuello
larguísimo



El tamaño de la
protuberancia del
pico permite
reconocer los
sexos

Cisne Vulgar

Cygnus olor

Altura:	150 cm
Peso:	16.000 gr
Ala:	581 mm
Envergadura:	226 cm
Pico:	79 mm
Tarso:	108 mm
Cola:	193 mm

Muy conocido por haber sido domesticado e introducido en muchísimos parques como ave de adorno. Cuello muy largo que puede llevar curvado hacia adelante. Puede esponjar el plumaje de las alas. Gran pico rosáceo con protuberancia negra.





*Infracobertoras
caudales blancas*

Barnacla Carinegra *Branta bernicla*

Altura:	53 cm
Peso:	1450 gr
Ala:	321 mm
Envergadura:	111 cm
Pico:	34 mm
Tarso:	61 mm
Cola:	102 mm

Las barnaclas y gansos son grandes y robustas anátidas de cuello ligeramente largo, patas cortas, pico corto y perfil achatado.

La Barnacla Carinegra tiene el cuello muy corto con ligera mancha blanca a sus lados. Cabeza, cuello y pecho negros. Dorso gris oscuro y partes ventrales gris claro o gris oscuro, pues existen dos razas diferenciables por esta característica. Infracobertoras caudales blancas.




*Joven, cuello
poco desarrollado*



Barnacla Cariblanca *Branta leucopsis*

Altura:	57 cm
Peso:	1700 gr
Ala:	402 mm
Envergadura:	121 cm
Pico:	30 mm
Tarso:	69 mm
Cola:	129 mm

Más estilizada que la Carinegra la Barnacla Cariblanca tiene nuca, cuello y pecho negros. Las partes ventrales resultan blancas como su faz, de la que toma el nombre. Dorso gris.



Sobre el agua se hace muy visible la popa blanca



Barnacle Cuellirroja


Branta ruficollis

Altura:	51 cm
Peso:	1600 gr
Ala:	357 mm
Envergadura:	—
Pico:	25 mm
Tarso:	55 mm
Cola:	104 mm



La más pequeña y achatada de las barnaclas resulta inconfundible por el diseño en mosaico de sus mejillas —con un rombo castaño enmarcado en blanco— y el cuello y pecho del mismo color que la mancha de las mejillas. En la base del pico luce otra mancha blanca; el resto de la cabeza es negro. Las partes ventrales, gris oscuras, quedan separadas del pecho por una franja blanca. Costados blancos, dorso gris y doble franja alar blanca.





Introducida en
varios puntos de
Europa se repro-
duce en libertad en
las islas Británicas

Barnacla Canadiense

Branta canadensis

Altura: 98 cm



Detalle
Cabeza

Grande y corpulenta, con cuello muy largo. La Barnacla Canadiense se caracteriza por su cabeza y cuello negros con una llamativa mancha blanca en la base de las mejillas. Pecho y partes ventrales gris perla muy vermiculadas. Infracobertoras caudales blancas. Dorso Gris.


Ansar Nival

Anser caerulescens

Altura: 74 cm

Este ganso norteamericano resulta inconfundible por su plumaje completamente blanco y su pico y patas rosáceas. Remiges primarias negras.

Pico ancho
de color rosado



Completamente blanco



Remiges
negras
↓

Sólo ocasionalmente
en nuestro conti-
nente y siempre
en las costas del
Atlántico Norte

Ansar Común

Anser anser

Altura:	76 cm
Peso:	3500 gr
Ala:	♂ 464-♀ 440 mm
Envergadura:	150 cm
Pico:	64 mm
Tarso:	78 mm
Cola:	139 mm



Raza
occidental/
pico amarillo

Infracobertoras
caudales blancas



Gris
claro,



Raza
oriental/
pico rosáceo

Región
caudal blanca


Patas
rosáceas



El Ansar Común puede ser diferenciado de otras anátidas de su porte por el dominio de los grises claros en su plumaje. La raza oriental se caracteriza por sus tonos más claros y su pico rosáceo, que en la raza occidental resulta amarillo-anaranjado. Remiges negras y cobertoras alares muy pálidas.


Ansar Campestre *Anser fabalis*

Altura:	68 cm
Peso:	3500 gr
Ala:	♂472-♀438 mm
Envergadura:	160 cm
Pico:	♂61-♀55 mm
Tarso:	79 mm
Cola:	131 mm



Pardo claro en partes inferiores

Algo más pequeño y grácil que el Común. Cuello algo más corto. Pico amarillo con negro en la base y en el ápice. Patas amarillas.



Ansar Careto Grande

Anser albifrons

Altura:	61 cm
Peso:	2500 gr
Ala:	410 mm
Envergadura:	102 cm
Pico:	46 mm
Tarso:	65 mm
Cola:	123 mm

Más oscuro que el Ansar Común.
Reconocible por conspicua mancha blanca en la base del pico que es rosáceo.

Patas anaranjadas. En la zona ventral tiene irregularmente repartidas varias manchas negras.



Raza
Euro-
asiática
←


Raza
de Groenlandia
→

← Blanco en
base del
pico

Cuello
← corto

← Joven sin
blanco en
base del
pico

Manchones
negros en
vientre





Pico muy corto



Muy pequeño



Vientre manchado

Anser Careto Chico *Anser erythropus*

Altura:	48 cm
Peso:	1800 gr
Ala:	370 mm
Envergadura:	104 cm
Pico:	31 mm
Tarso:	60 mm
Cola:	102 mm

Reproducción en pequeño del Grande, pero con pico notablemente pequeño y mancha blanca algo más extensa. Anillo ocular de color amarillo.

Patas amarillas



Ansar Piquicorto

Anser brachyrhynchus

Altura:	67 cm
Peso:	1700-3200 gr
Ala:	♂453-♀424 mm
Envergadura:	152 cm
Pico:	♂47-♀42 mm
Tarso:	76 mm

La cabeza y cuello casi negros contrastan con las partes dorsales grises muy claras. El ansar Piquicorto recibe denominación del pequeño pico rosado con manchas negras. Patas rosáceas.



Sólo en Islandia

Ansar Indico

Anser indicus

Pequeño anser que puede encontrarse libre en algunas localidades europeas. Fácil de identificar por su cabeza blanca con franjas negras. Pico corto de color amarillo. Dorso y partes ventrales, gris muy claro.



Pico amarillo



Banda blanca
en el cuello

sólo raramente en el
Sur de Europa.
En zoológicos viven
muchos ejemplares

Equipo

Ansar Careto
chico



Ansar Piquicorto




Picos



Tarro Blanco

Tarro Canelo

Detalle de
pico de ansar
con borde aserrado





Patas

Aunque algunos gansos tienen costumbres prácticamente terrestres, las palmeaduras de sus patas denotan sus facultades para nadar.

BIBLIOTECA DE
ISMAELILLO

Alas

Los ansares protagonizan las más espectaculares migraciones. Su capacidad para el vuelo les permite recorrer grandes distancias e, incluso, sobrevolar largos brazos de mar.



*Ansar
piquicorto*



*Barnacle
cuello rojo*



Tarro Blanco



*Ansar
Caretto
Grande*

NO CIRCULANTE

590
Rod
C 48
018054

Pico

El pico de los cisnes está adaptado a un régimen básicamente vegetariano.



Cisne Cantor



Cisne Cantor
(Joven)



Cisne
Chico
(Joven)



Cisne
Chico

En la distinta extensión y amplitud de las manchas claras del pico se basan los ornitólogos para reconocer no sólo la especie, sino también a muchos individuos.




Cisne Negro
de origen australiano pero común en parques y jardines como ave ornamental

Cuello

El largo cuello es utilizado principalmente para acceder a la vegetación subacuática.

Patas

Las palmeadas patas de los cisnes, como al resto de las anátidas, les faculta para la rápida progresión en el líquido elemento.




Andan muy torpemente por tener las patas situadas muy atrás en el cuerpo.


Alas

Los cisnes son excelentes voladores que pueden desplazarse a gran velocidad con el potente aleteo que produce su gran envergadura.



Distribución ecológica






Cisnes, gansos y tarros
ocupan siempre bioto-
pos acuáticos tanto en
los biomas de Taiga y
Tundra como en los
estrictamente húmedos



Territorios



● = *Cisne Común*
▲ = *Ganso Común*

Todos los anseriformes se comportan de forma gregaria, al menos durante sus migraciones, invernada y período de muda. A la hora de nidificar establecen una territorialidad relativamente laxa, que sólo les compromete en la defensa de un pequeño espacio en torno al nido. Muchas parejas, en efecto, pueden instalarse a poca distancia unas de otras. En cualquier caso, si un congénere osa violar los límites territoriales será expulsado sin contemplaciones.



Durante la formación de las parejas la intransigencia territorial alcanza sus más altas cotas.

Alimentación



Granos y
semillas



CISNES



Otros
vegetales

Moluscos
y otros
invertebrados

Crustáceos



Moluscos,
bivalvos



Crustáceos



Gangrejas

Algas



Insectos



TARROS

PRIMAVERA

Crustáceos



Algas y
vegetación
palustre



Granos y
semillas



Moluscos



GANSO

Granos y
semillas



Raíces



Bulbos



INVIERNO


Algas

Técnicas de caza

Los ansares pueden recurrir a varias modalidades de obtención de alimentos, lo que, evidentemente, amplía sus posibilidades de supervivencia.

Ansar Común arranca castañuela


Los pequeños —pero muy alimenticios— bulbos de la castañuela, planta acuática abundantísima en las marismas del Guadalquivir, constituyen la base alimentaria del Ansar Común quien durante el invierno los desentierra tirando del tallo.



Cisne pasta en fondos

El Cisne usa el largo cuello para alcanzar el *potamogeton* de los fondos.





Barnacle
Carinegra
pastando
algas

Barnaclas siegan zoosteras

La Barnacle Carinegra pasta literalmente sobre la pradera de algas marinas que queda al descubierto cuando baja la marea.

Los gansos precisan ingerir una considerable cantidad de arena o piedrecillas para que ésta, en el interior del buche contribuya al maceramiento de los alimentos ingeridos. La arena también resulta muy importante para los baños.



Ganso pastando

Técnicas de defensa

A través de la evolución algunos animales han ido adquiriendo un tamaño que les alejaba de sus predadores, o que les permitía excluir a sus competidores. La gran talla de las anseriformes aquí tratadas puede ser considerada como la mejor arma defensiva ya que supera ampliamente la de los predadores más comunes en los biotopos lacustres. A la corpulencia se suma, por otra parte, la

agresividad de estas aves en la defensa de sus polladas, que evidentemente sí quedarían al alcance de esos carnívoros. Cisnes, gansos y barnaclas tendrían el porvenir asegurado si el hombre, con sus armas capaces de matar a distancia y con las graves alteraciones que provoca en el medio ambiente, no hubiera roto el milenario equilibrio que mediaba entre estas aves y su entorno.



CISNE



ANSAR



BARNACLA



TARRO



AGUILUCHO
LAGUNERO



NUTRIA



LUCIO



HALCON

Postura defensiva
de Cisne Común o
Mudo. Con sus alas
semidesplegadas
cubre a la
pollada



Con tenacidad y
arrojo un ganso defiende
a su pollada de
cualquier enemigo



Paradas nupciales


Dentro del afable y polifacético mundo de los cortejos nupciales —fuente de innumerables estudios— las bodas de los ansares pueden ser consideradas como las más protocolarias. Han inspirado, además, algunos de los elementos base del conocimiento sobre el comportamiento de las aves. Los ansares son *monógamos* y, una vez emparejados, no se separan

de su consorte en momento alguno del año ni siquiera durante los viajes o la invernada.

Hasta el punto de que los que enviudan no vuelven a emparejarse. Aunque el pacto amoroso queda rigurosamente sellado desde que —a los cinco años— alcanzan la madurez sexual, todos los años se renueva mediante las posturas que aquí representamos.


PARADA NUPCIAL DEL ANSAR COMUN


1/ La ♀ incita al ♂
a atacar a un
adversario (real o no)



2/ El ♂ avanza hacia el
intruso con el
cuello estirado.


Agresividad
de gran intensidad






3/El ♂ ejecuta
postura de ame-
naza desplegan-
do alas y abatien-
do la cabeza.
Amenaza de baja
intensidad.


4/Regresa hacia
la ♀ en actitud
de triunfo con
gran aparato de
graznidos y batir
de alas.



5/La ♀ lo recibe con
movimiento de "bombeo"
de la cabeza.



Pre copulatorio



PARADA NUPCIAL DE LOS CISNES



cisne cantor

También en los cisnes encontraremos los elementos básicos del elaborado comportamiento nupcial común a las anátidas, realizado aquí por la incuestionable belleza y gracilidad de las aves que más emociones estéticas han inspirado al hombre.

1/ Amenaza a un intruso

Los prolegómenos de la parada nupcial de los cisnes constan de actitudes agresivas hacia posibles competidores

cisne,
común



2/ ♂ con cuello replegado se exhibe ante la ♀

Cisne
Común



3/ cabezas
enfrentados

Con movimientos lentos
los cisnes nadan hasta
cobrarse enfrentados
y rozar sus frentes

Cisne
Chico



4/ ♂ y ♀ se verguen

Fin de ceremonia.

Una vez realiza-
da la cópula ♂


y ♀ se ver-
guen, enfren-
tados los pechos,
y con las cabezas
cruzadas.

5/ tras la cópula el ♂
se aleja con
alas semi
desplegadas



Cisne Común

Alarde del ♂ de
Barnada Cuellirroja
tras la cópula




Ceremonia triunfal de ♂
de Barnacla Cariblanca



♂ Provocación de la ♀
en pareja de Barro Blanco

La ♀ incita al ♂ a
atacar a otro ♂
invasor.

(tomado de
Konrad Lorenz)



Cuadro cronológico



Tarro Blanco

Enero Febrero Marzo Abril Mayo



Cisne Común

Enero Febrero Marzo Abril Mayo



Cisne Chico

Enero Febrero Marzo Abril Mayo




Barnacla Carinegra

Enero Febrero Marzo Abril Mayo









Anzar Común

Enero Febrero Marzo Abril Mayo



Anzar Campestre


Enero Febrero Marzo Abril Mayo



■ Pollos en nido

* Permanecen con sus padres hasta la siguiente estación.

Nidos



Nido de Ganso

H = 40/50 cm

D = 80 x 50 cm

d = 20 x 25 cm

Gansos

Construido por la hembra. Consta de una amplia base de materiales sólidos y de un forro más mullido a base de raíces y, sobre todo, de plumón, que el ave arranca de su propio cuerpo.

BARNACLA

Las Barnaclos suelen aprovechar una suave depresión del terreno que forran de una ligera capa vegetal y recubren totalmente de abundante plumón propio.



Cisnes

Gigantesca plataforma de vegetación seca que puede llegar al metro de altura y a los dos metros de diámetro.

Tarro

Utiliza frecuentemente galerías que excava en la arena de la playa o en las dunas costeras; también en cualquier cavidad aparente entre rocas e, incluso, en el interior de huecos de árboles. Siempre cerca de la costa.



Huevos



Cisne Común *Cygnus olor*

N.º normal: 4 - 12
Tamaño: 115 x 74 mm
2.ª puesta: No
Incubación: ♂♀ 34-38 días
Pollos en nido: 4 meses

Cisne Chico

Cygnus bewickii

N.º normal: 3 - 5
Tamaño: 102 x 67 mm
2.ª puesta: No
Incubación: 29-30 días
Pollos en nido: —



Tarro Blanco

Tadorna tadorna

N.º normal: 8 - 15
Tamaño: 66 x 47 mm
2.ª puesta: No
Incubación: ♀ 28-30 días
Pollos en nido: 64 días

Barnacla Carinegra (*)
Branta bernicla

N.º normal: 2 - 8
Tamaño: 70 x 46 mm
2.ª puesta: No
Incubación: ♀ 24-26 días
Pollos en nido: 70 días

(*) Todos los jóvenes permanecen con sus padres hasta la siguiente estación.

Ansar Careto Chico
Anser erythropus

N.º normal: 3 - 7
Tamaño: 76 x 49 mm
2.ª puesta: No
Incubación: ♀ 25-28 días
Pollos en nido: 60 días ±

Ansar Careto Grande

Anser albifrons

N.º normal: 4 - 7
Tamaño: 79 × 52 mm
2.ª puesta: No
Incubación: ♀ 27-28 días
Pollos en nido: 60 días ±



Ansar Común

Anser anser

N.º normal: 3 - 8
Tamaño: 85 × 58 mm
2.ª puesta: No
Incubación: ♀ 27-28 días
Pollos en nido: 60-70 días

Pollos



El corto pico y la falta del blanco puro de los progenitores apenas permiten reconocer en el pollo de Cisne Común las elegantes características de sus mayores

Pollo de Cisne Común

Pollo de cisne
Cantor

Muy blanco y
de pico rosáceo →



Pollo de Anser Campestre



Más oscuro que el
de Anser Común

Pollo de Barnada
cuellinegra

Pico diminuto y
tonos pardos en
el dorso.



Pollo de Tarro Común

De 6 días. Caminan
muy erguidos.

Pico gris, dorso
oscuro y partes
inferiores blancas

Pollo de Anzar Común

Los anzarinos demuestran
una gran vitalidad
desde el momento de
la eclosión. Siguen a
sus padres dentro o
fuera del agua a las
pocas horas de haber
nacido.



CLASIFICACIÓN Y NOMENCLATURA

FAMILIA	GÉNERO	ESPECIE	CASTELLANO	CATALÁN	GALLEGO	VASQUEÑO
Cygnus	<i>C. olor</i>		Cisne Vulgar	Cigne Mut, Cigne Domèstic	Ciño Real	Belxarga
			Cisne Cantor, Cisne Salvaje	Cigne Cantaire	Ciño Grande	Belxarga Mokobeltz
	<i>C. bewickii</i>		Cisne Chico	Cigne Petit	Ciño Pequeno	Belxarga Txiki
	<i>A. anser</i>		Ansar Comùn, Oca Comùn, Auca	Oca Silvestre	Ansar Cincento	Anizar
			Ansar Campestre, Oca Salvaje, Auca Salvaje	Oca Salvatge	Ansar Bravo, Ganso de la Mies, Oca Silvestre	Soro Antzar
ANÁTI- DAS	Anser	<i>A. fabalis</i>				
		<i>A. albifrons</i>	Ansar Careto Grande	Oca Riallera Grossa	Ansar Careto Grande	Anizar Muturzuri
		<i>A. erythropus</i>	Ansar Careto Chico	Oca Riallera Petita	Ansar Careto Pequeno	Anizaratxo
		<i>A. brachyrhynchus</i>	Ansar Piquicorto	Oca de Bec Curt		Anizar Mokomotz
		<i>A. leucopteros</i>	Ansar Nival	Oca de les Neus		Alur Antzar
Branta	B.	<i>A. indicus</i>	Ansar Indio	Oca de l'India	Ansar Indico	
		<i>B. bernicla</i>	Barnacla Carinegra, Ganso Carinegro	Oca de Collar	Ganso Cabecinegro	Anizar Musubeltz
		<i>B. leucopsis</i>	Barnacla Cariblanca, Ganso Cariblanco	Oca de Galta Blanca	Ganso Saugano, Ganso Minjita, Ganso dos Percebes	Anizar Musuzuri
		<i>B. ruficollis</i>	Barnacla Cuellirroja	Oca de Coll Roig		
		<i>B. canadensis</i>	Barnacla de Canadá	Oca del Canadá	Ganso do Canadá	
Tadorna	<i>T. tadorna</i>		Tarro Blanco	Anec Blanc	Gansa Branca	Ekaitz Ate
		<i>T. ferruginea</i>	Tarro Canelo	Anec Canyella	Gansa Ferruxenta	Anizar Gorritza

FUENTES: Sociedad Española de Ornithología, Instituto Catalana d'Historia Natural, Angel Cabrera, J. Melquer i Sotres, Sociedade Gallega d'Historia Natural, Grupo de Ciencias Avanzadas, datos del autor y comunicaciones privadas.

Cuadernos de Campo del Dr. Félix Rodríguez de la Fuente

Cada miércoles en su quiosco o librería

Títulos de la colección:

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1 - El Lince y el Gato Montés | 31 - Las Cigüeñas |
| 2 - Grandes Águilas | 32 - Peces de Mar |
| 3 - El Lobo | 33 - Palomas y Tórtolas |
| 4 - Rapaces Nocturnas | 34 - Aves Marinas |
| 5 - El Jabalí | 35 - Abubilla, Carraca
y Abejaruco |
| 6 - Pájaros Carpinteros | 36 - Rapaces del Bosque |
| 7 - La Cabra Montés y el
Muflón | 37 - Aves de la Costa |
| 8 - Pájaros del Bosque (I) | 38 - Pájaros del Campo
Abierto |
| 9 - Víboras y Culebras | 39 - La Gineta y el Meloncillo |
| 10 - Los Buitres | 40 - Somormujos y Zampullines |
| 11 - El Zorro | 41 - Pájaros del Bosque (III) |
| 12 - Aves de la Estepa | 42 - Anfibios |
| 13 - Pequeños Carnívoros | 43 - Perdices y Codornices |
| 14 - Peces de Río | 44 - Pájaros Cantores |
| 15 - Pájaros de Medio Urbano | 45 - Milanos y Aguiluchos |
| 16 - El Quebrantahuesos y el
Alimoche | 46 - Aves Viajeras (II) |
| 17 - Los Córvidos | 47 - Pájaros de Montaña |
| 18 - Peces de Lagos y
Marismas | 49 - Pequeños Carnívoros (II) |
| 19 - Halcones y Cernícalos | 50 - Aves Viajeras (III) |
| 20 - Lagartos y Lagartijas | 51 - Los Cérvidos |
| 21 - Las Garzas | 52 - Pájaros de los Sotos |
| 22 - Pequeñas Águilas | 53 - Invertebrados Marinos |
| 23 - Las Grullas | 54 - Gallos de Monte |
| 24 - Liebre y Conejo | |
| 25 - Los Patos | |
| 26 - Pájaros del Bosque (II) | |
| 27 - Pájaros de la Marisma | |
| 28 - Aves Viajeras (I) | |
| 29 - Pájaros de Río | |
| 30 - Aves Marinas Coloniales | |

Reserve su ejemplar



EDITORIAL MARIN S.A.