




*Dr. Félix Rodríguez de la Fuente*

# CUADERNOS DE CAMPO

## AVES VIAJERAS(III)



EDITORIAL MARIN S.A.

El Chorlitejo  
Grande en vuelo  
muestra una  
potente franja  
alar blanca →



Chorlitejo Patinegro  
muy frecuente  
en las salinas de  
S. Fernando (Cádiz)  
Primavera 1968

Chorlitejo Patinegro ♀  
incuba en su nido tras  
la primera línea de  
dunas costeras  
Playa del Saler  
(Valencia)  
Mayo 1962



*Cuaderno de Campo  
del Dr. Félix Rodríguez de la Fuente*

# AVES VIAJERAS (III)

50




*Correlimos común  
con plumaje nupcial  
ya durante su viaje  
inmigratorio*

*Delta del Ebro  
(Tarragona)  
Abril 1974*



**EDITORIAL  
MARIN, S.A.**




*donativo*

## Sumario

018046-2 \$ 5.00  
990316

*chorlitejo chico  
en exhibición  
prenupcial.*

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Notas de campo .....               | 2  |
| Aspecto y dimensiones .....        | 6  |
| Equipo .....                       | 26 |
| Distribución ecológica .....       | 28 |
| Alimentación .....                 | 30 |
| Técnicas de caza .....             | 32 |
| Técnicas de defensa .....          | 34 |
| Paradas nupciales .....            | 36 |
| Cuadro cronológico .....           | 38 |
| Nidos .....                        | 40 |
| Huevos .....                       | 42 |
| Pollos .....                       | 46 |
| Clasificación y nomenclatura ..... | 48 |



590  
R00  
C  
U. 50

*chorlitejo  
Grande  
detalle de  
la cabeza*



## CUADERNOS DE CAMPO DEL DR. FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE

Idea y diseño de Editorial Marín, S. A.  
Ilustración color JAN SEMMEL  
Dibujos negro Juan Manuel Varela  
Coordinación Joaquín Araujo  
Dirección Félix Rodríguez de la Fuente  
© EDITORIAL MARÍN, S. A. 1978  
Nicaragua, 85-95, Barcelona-29, Spain  
ISBN 84-7102-500-0 la Colección  
ISBN 84-7102-550-7 Aves Viajeras III  
Impreso por Artes Gráficas Toledo, S. A.  
Depósito Legal: To- 819 - 1978  
Distribuido por Marco Ibérica, D. de E., S. A.

Precio: 100,— Ptas.

*Pollo de 4 días  
de edad*




*Andarriños de Terek*

NOTAS DE CAMPO



Bando de  
Chorlitos durante  
sus vuelos migratorios.  
Permanecen muy próximos

Correlimos Común  
revuelve las algas  
para localizar a los  
pequeños invertebrados  
de los que se  
alimenta.



Pasea uno, distraído, pendiente del suelo inestable que forman los cantos rodados en la llana ribera de un río, cuando, a escasos metros de la punta de las botas, se levanta un pájaro herido: da saltos torpes y aparatosos, arrastra un ala; parece que intenta levantar el vuelo pero no lo consigue, como consecuencia de la fractura que afecta a varios de sus miembros. El espectáculo enternece el corazón del amante de los animales: ¡Pobre avecilla! Es preciso socorrerla, apoderarse de ella curarla y ponerla nuevamente en libertad. El mismo espectáculo enciende la pasión depredadora en otro tipo de persona y la fácil presa le impulsa a una apasionada y no fácil persecución sobre el suelto pedregal.

La verdad es que ni uno ni otro llegan nunca a poner las manos sobre el Chorlito que está realizando una perfecta representación, una comedia que tiene precisamente la misión de hacerse perseguir para alejar al potencial enemigo del lugar donde se encuentra el nido.


La escena que acabo de relatar, ha llevado a muchos a pensar en la inteligencia de las aves, en el finalismo de sus actos, en la intencionalidad de su conducta.

El Chorlito debe ser inteligente para reproducir una situación tan angustiosa: ala quebrada, pata rota, incapacidad para levantar el vuelo. Y, además, dosificando la



representación, de tal manera que atraiga sobre sí al presunto enemigo pero sin caer en sus garras.

Los etólogos han venido a arrojar un jarro de agua fría sobre dicha teoría: toda la pauta de conducta que constituye tal representación teatral no sería más que una pulsión instintiva generada mediante la ritualización de lo que, filogenéticamente comenzó como una simple indeterminación: o huir ante el enemigo o quedarse sobre los pollos para protegerles. La selección natural iría matizando después los componentes de la pauta instintiva. Las aves que lograban alejar de sus crías al carnívoro conseguían que éstas sobrevivieran y les legaban los genes determinantes de una conducta más diferenciada.

Y así, se fué estructurando uno de los más complejos y admirables comportamientos de los animales vivientes.



# Aspecto y dimensiones




## Chorlitejo Grande *Charadrius hiaticula*

|              |        |
|--------------|--------|
| Altura:      | 18 cm  |
| Peso:        | 60 gr  |
| Ala:         | 132 mm |
| Envergadura: | 40 cm  |
| Pico:        | 15 mm  |
| Tarso:       | 25 mm  |
| Cola:        | 59 mm  |

Pequeño, algo rechoncho, casi carente de cuello, y de movimientos muy rápidos cuando camina. Tiene patas y pico amarillos, éste último con el ápice negro.

Diseño facial característico con amplio antifaz negro que se prolonga hasta el píleo dejando la frente blanca. Garganta y cuello blancos como las partes inferiores. Collar negro. Partes dorsales pardas con borde de las alas negro.





## Chorlitejo Chico

*Charadrius dubius*

|              |         |
|--------------|---------|
| Altura:      | 15 cm   |
| Peso:        | 42,5 gr |
| Ala:         | 115 mm  |
| Envergadura: | 35 cm   |
| Pico:        | 13 mm   |
| Tarso:       | 23 mm   |
| Cola:        | 55 mm   |

Réplica en pequeño del Chorlitejo Grande. Anillo ocular muy marcado. Carece de la franja alar de su pariente y pico y patas resultan más oscuros.






### Chorlitejo Patinegro *Charadrius alexandrinus*

|              |        |
|--------------|--------|
| Altura:      | 15 cm  |
| Peso:        | 40 gr  |
| Ala:         | 102 mm |
| Envergadura: | 34 cm  |
| Pico:        | 14 mm  |
| Tarso:       | 28 mm  |
| Cola:        | 44 mm  |

Además de las patas negras —característica que le da nombre— no presenta el diseño facial de sus congéneres. Tiene el píleo rojizo, ceja negra y frente blanca pero el collar no se cierra en la base del cuello. Tiene franja alar.







Vientre castaño  
y negro

### Chorlito Carambolo *Eudromias morinellus*

Altura: 25 cm  
Peso: 100 gr  
Ala: 150 mm  
Envergadura: 44 cm

Aspecto de Chorlito pequeño y más rechoncho que sus parientes. Tiene las partes ventrales de color castaño, pecho y dorso grises y ceja blanca muy llamativa. Píleo negruzco con punteaduras blancas.





Presencia  
accidental  
en el oeste  
y sur de  
Europa

### **Chorlito Dorado Chico**

*Pluvialis dominica*

Altura: 25 cm

Ala: ♂ 161-♀ 158 mm

Resulta prácticamente idéntico al Dorado Común, con la lógica diferencia de tamaño. Partes dorsales pardo-doradas con manchas negras. Mejillas negras, color que se extiende por pecho y partes ventrales.

Pico largo  
y recto

Muy pequeño

Dorso pardo  
& manchado

VERANO




INVIERNO

En invierno  
grisáceo

**Correlimos Menudo**  
*Calidris minuta*

|              |       |
|--------------|-------|
| Altura:      | 13 cm |
| Peso:        | 25 gr |
| Ala:         | 95 mm |
| Envergadura: | 30 cm |
| Pico:        | 17 mm |



Es el limícola más pequeño de Europa, del tamaño de un gorrión. Pardo muy manchado por encima y por los flancos. Partes inferiores blancas. Ceja poco marcada; franja alar blanca, patas negras y pico recto y grisáceo.




**Correlimos de Temminck**  
*Calidris temminckii*

|              |         |
|--------------|---------|
| Altura:      | 14,5 cm |
| Peso:        | 24 gr   |
| Ala:         | 90 mm   |
| Envergadura: | 30 cm   |

Más esbelto y alto que el Menudo. Pico muy corto algo decurvado y oscuro. Pardo moteado por encima y en el pecho. Garganta y vientre blancos. En vuelo se aprecia franja alar y bordes de la cola blancos.

Ceja blanca muy marcada →



Pico recto, largo  
y amarillo →

Dorso muy  
oscuro

**Correlimos Oscuro**  
*Calidris maritima*

Altura: 20 cm  
Peso: 55-90 gr  
Ala: ♂126-♀134 mm  
Envergadura: 39 cm  
Pico: ♂27-♀34 mm  
Tarso: 22 mm  
Cola: 57 mm

VERANO




patas amarillas



En invierno  
menos contrastado

INVIERNO

Grande y grueso con patas y pico amarillos. Todo el plumaje resulta muy oscuro por la presencia de muchas motas que, prácticamente, cubren el fondo leonado. En vuelo, franja blanca muy difusa en las alas y base de la cola gris clara.



Pico largo  
algo →  
decurvado

Muy moteado

Dorso castaño  
con motas  
negras ↓

Mancha  
ventral negra →

VERANO






Plumaje  
muy apagado  
gris claro  
INVIERNO

### Correlimos Común *Calidris alpina*

|              |                |
|--------------|----------------|
| Altura:      | 17,5 cm        |
| Peso:        | 47 gr          |
| Ala:         | ♂ 113-♀ 119 mm |
| Envergadura: | 36 cm          |
| Pico:        | ♂ 30-♀ 32 mm   |
| Tarso:       | 23 mm          |
| Cola:        | 49 mm          |

El Correlimos Común presenta un llamativo contraste entre las partes dorsales —pardas con motas negras— diseño que se extiende por el pecho, con la región ventral en la que lucen una amplia mancha negra bordeada de blanco. Pico y patas grises.






### **Correlimos Zarapitín** *Calidris ferruginea*

Altura: 19 cm

Ligeramente mayor que el Correlimos Común. Largo y decurvado pico —único en el género— y patas grises. El plumaje de verano resulta muy llamativo por su coloración castaño-oscuro con motas negras en dorso. Obispillo blanco y franja alar muy estrecha.



~~~~~  
CORPULENTO  
Y RECHONCHO

~~~~~  
INVIERNO

## Correlimos Gordo

*Calidris canutus*

Altura: 25 cm  
Ala: 165 mm

El más voluminoso del género. Pico corto y recto. Domina en su plumaje de verano una coloración rojiza, que se extiende por la faz y partes inferiores. Pileo moteado, como el dorso que tiene como color base el pardo claro.



Pardo muy moteado


MUY  
PEQUEÑO

↑  
Pico  
pequeño

Ventre blanco

← Patas negras con  
sólo tres dedos

VERANO



INVIERNO

## **Correlimos Tridáctilo**


*Calidris alba*

|              |         |
|--------------|---------|
| Altura:      | 20 cm   |
| Peso:        | 60 gr   |
| Ala:         | 124 mm  |
| Envergadura: | 36,5 cm |
| Pico:        | 25 mm   |
| Tarso:       | 24 mm   |
| Cola:        | 50 mm   |

La carencia del cuarto dedo no puede ser detectada normalmente en el campo. Es casi totalmente pardo dorado muy moteado a excepción del vientre que es blanco. Patas y pico negros.

↑  
Grisáceo

en invierno




### **Correlimos Falcinelo** *Calidris falcinellus*

|         |        |
|---------|--------|
| Altura: | 17 cm  |
| Peso:   | 40 gr  |
| Ala:    | 105 mm |

Aspecto y actitudes de Correlimos pero esquema cromático de Agachadiza. Pico muy largo ligeramente decurvado en el ápice. Ceja marcada blanca, como el vientre y la garganta.





↓  
Pico  
negro  
pequeño

Tonos  
castaños

↑  
Patas  
negras

Muy moteado

**Correlimos Canelo**  
*Calidris subruficollis*

Altura: 20 cm  
Ala: 136 mm

Uno de los pocos correlimos con  
cuello patente. Plumaje pardo  
dorado con motas negras. Faz y  
región ventral pardas muy claras  
sin listas ni manchas.



INVIERNO  
Tonos dominantes  
grises

Presencia  
ocasional en  
nuestro país

**Agujeta Escolopácea**  
*Limnodromus scolopaceus*

Altura: 29 cm

Aspecto de agachadiza por sus patas cortas y largo pico. Ceja patente. Partes dorsales gris claras con obispillo blanco. Región ventral totalmente blanca. Patas amarillas y pico grisáceo


Ceja  
patente

Tonos  
castaños  
muy  
moteado

VERANO

Proceden de Norteamérica,  
durante el otoño resultan  
más frecuentes

obispillo  
blanco



INVIERNO

Tonos  
Grisés







### **Archibebe Fino** *Tringa stagnatilis*

|              |            |
|--------------|------------|
| Altura:      | 22 cm      |
| Peso:        | 80 gr      |
| Ala:         | 137 mm     |
| Envergadura: | 41 cm      |
| Pico:        | ♂38-♀42 mm |
| Tarso:       | 48 mm      |
| Cola:        | 55 mm      |

Muy estilizado con patas y pico muy largos. Ceja ligeramente marcada. Muy moteado de negro sobre fondo pardo claro. Vientre blanquecino como el obispillo. Pico gris y patas verdes.

Se ve casi todos los inviernos en el sur de Iberia



# Archibebe Patigualdo Grande

*Tringa melanoleuca*

← Ambas especies  
aparecen con cierta  
periodicidad, sobre  
todo en invierno y otoño,  
en las costas atlánticas  
de nuestro continente

Pico  
largo  
↓

↗ Cuello,  
pecho y costados  
moteados de  
negro

↘ Vientre  
blanco

↗  
Patas amarillas

**Archibebe Patigualdo Chico**  
*Tringa flavipes*



Raros visitantes procedentes de Norteamérica, ambas especies resultan prácticamente idénticas salvo la diferencia de tamaño que se desprende de su denominación. Son ágiles limícolas de largo pico y patas amarillas. Obispillo blanco. Partes dorsales gris-ocráceas con motas, a excepción de las remiges que son negras. Región ventral blanca.

Más pequeño  
 y estilizado

596  
 Rod  
 C  
 018046  
 150



## Andarriós del Terek *Xenus cinereus*

|              |          |
|--------------|----------|
| Altura:      | 23 cm    |
| Peso:        | 60 gr    |
| Ala:         | 130 mm   |
| Envergadura: | 40 cm    |
| Pico:        | 37-52 mm |
| Tarso:       | 28 mm    |

PRIMAVERA

Dorso  
Grisáceo

INVIERNO

Patas  
amarillas



Reconocible por su largo y recurvado pico. Gris claro con pocas manchas. Garganta y región ventral blancas, patas amarillas.


**Correlimos de Bartram**  
*Bartramia longicauda*

Pequeño correlimos de pico corto y cabeza reducida. La cola acabada en cuña resulta bastante larga. Obispillo negro. Plumaje dorsal dorado con manchas oscuras. Flanco y pecho barredo.

*Sin marcas  
distintivas en  
vuelo*



*Pico corto*



*Pardo muy  
moteado*

*Patas  
amarillas* →

*Sin manchas  
blancas*

---

*Aparece ocasional-  
mente en Europa  
procedente del  
Nuevo Mundo*

---

# Equipo

## PICOS Y CABEZAS



↑  
Correlimos  
común



Chorlitejo  
Grande




↑  
Correlimos  
común




←  
Chorlitejo  
Grande

### Colas

La funcionalidad de la cola resulta mínima en los limícolas que maniobran utilizando las alas.




*Correlimos Común*



↑  
*Chorlito Chico*

*Correlimos Tridáctilo*



*Correlimos Común*




## Alas

Infatigables voladores, los limícolos alcanzan grandes velocidades con su vuelo de trayectoria lineal. Su capacidad de maniobra resulta espectacular cuando se agrupan en enormes bandos—incluso de varios miles de ejemplares— que se desplazan en el mismo sentido y que realizan bruscos cambios de dirección o auténticas acrobacias.

## Patas

Aunque muchos limícolos tienen las patas relativamente cortas, como los que aquí tratamos, todos pueden vadear aguas someras e incluso nadan con facilidad.

# Distribución ecológica





**Correlimos  
Tridáctilo**

El *habitat* de los limícolos es la tundra durante la época de reproducción y la costa arenosa y las zonas marismas durante la invernada. Su presencia en zonas húmedas intercaladas dentro de otros biomas queda reflejada en el cuadro de distribución.



**Correlimos Canelo**



**Chorlitejo Patinegro**



**Ríos, lagos  
y marismas**



**Costa**

# Alimentación

|                                                                                                                   | Crustáceos | Moluscos | Dípteros<br>y larvas |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------------------|
| <br><b>Chorlitejo Grande</b>     | +          | +        | +                    |
| <br><b>Chorlitejo Patinegro</b>  | +          | +        | +                    |
| <br><b>Correlimos Común</b>      | +          | +        | +                    |
| <br><b>Correlimos Tridactilo</b> | +          | +        | +                    |
| <br><b>Correlimos Gordo</b>     | +          | +        | +                    |
| <br><b>Chorlito Carambolo</b>  |            | +        | +                    |

| Anélidos terrestres y marinos | Material vegetal | Arácnidos | Pulgas de arena | Animales compuestos |
|-------------------------------|------------------|-----------|-----------------|---------------------|
| +                             | +                | +         | +               |                     |
| +                             | +                |           | +               |                     |
| +                             | +                |           | +               | +                   |
| +                             | +                | +         | +               | +                   |
| +                             | +                |           | +               |                     |
| +                             | +                | +         |                 |                     |

# Técnicas de caza


## Correlimos Tridáctilo

El Correlimos Tridáctilo captura muchas presas en las playas, precisamente en la zona batida por las olas. Para no ser alcanzado por el agua emprende rapidísimas carreras hacia la parte seca para, una vez que se ha retirado la ola, volver de forma igualmente veloz.




## **Correlimos Común**

Sobre las algas en putrefacción se congregan los correlimos comunes y otros pequeños limícolas para aprovechar los numerosísimos invertebrados que allí pululan.



## **Chorlito Carambolo**

En la Tundra y altas cotas de Montaña el Chorlito Carambolo persigue a sus pequeñas presas con cortas carreras.




## Técnicas de defensa

Chorlitejo Grande fingiéndose herido ante predador para atraerlo sobre sí, y alejarlo de su nido y pollada.



Los limícolas, también como otras aves, emplean el agrupamiento en bandos como sistema de defensa.





Huevos

### Las variantes del mimetismo en el Chorlitejo Patinegro

La mayoría de las aves procuran imitar con su plumaje los tonos dominantes en sus biotopos. En realidad pasar inadvertido es la más válida de las defensas frente a los predadores. Pero de esa inadvertibilidad están aún más necesitados los huevos y pollos que no pueden huir ante la proximidad del peligro.

Precisamente por ello los diseños y colores de las cáscaras y los primeros plumones suelen ser miméticos. Todos estos caracteres alcanzan un alto grado de eficacia en la mayoría de los limícolas ya que anidan en el suelo y no ocultan su nido. Evidentemente no existe mejor protección para un huevo que parecer una piedra y para un póllo que se le tome por arena.

Ave incubando




Pollos




# Paradas nupciales

## CHORLITEJO GRANDE



## CHORLITEJO CHICO

Hace pequeñas depresiones en el suelo arenoso como invitación a la ♀ para que acepte nidificar en su territorio



## CORRELIMOS TRIDÁCTILO



CORRELIMOS  
COMÚN

Vuelo en  
círculos sobre  
localidad de  
nidificación.


Sonido chirriante  
como un despertador.

↑  
fase  
ascendente



Territorio

3/  
vuelo  
nupcial  
de fijación  
territorial


# Cuadro cronológico



**Chorlitejo Grande**



**Correlimos Común**




**Correlimos Oscuro**








**Correlimos Gordo**



**Chorlito Carambolo**





■ Celo y construcción nido
 ■ Incubación
 ■ Pollos en nido

# Nidos

CORRELIMOS COMÚN ,  
Y CORRELIMOS TRIDÁCTILO

Utilizan como forro  
un poco de hierba  
seca. Entre vegetación  
no densa, aprovechan  
una ligera depresión.



Nido mimético de Chorlitejo  
en dunas y arenales





CHORLITEJO  
PATINEGRO

Los chorlitejos anidan en el suelo sin preocuparse en proporcionar soporte alguno a sus huevos, aunque si busca zonas de guijarros que contri buirán a camuflar su puesta. Ocasionalmente aprovechan ligeras depresiones como una huella dejada por un gran mamífero

CHORLITEJO  
CHICO



# Huevos

## Correlimos Oscuro *Calidris maritima*

N.º normal: 3 - 4  
Tamaño: 37 × 26 mm  
2.ª puesta: No  
Incubación: ♂♀ 21 - 22 días  
Pollos en nido: 21 - 28 días



## Correlimos Común *Calidris alpina*

N.º normal: 2 - 6  
Tamaño: 36 × 25 mm  
2.ª puesta: No  
Incubación: ♂♀ 21 - 22 días  
Pollos en nido: 28 días



## Correlimos Tridáctilo *Calidris alba*

N.º normal: 4  
Tamaño: 35 × 24 mm  
2.ª puesta: Rara  
Incubación: ♂♀ 23-24 días  
Pollos en nido: 17 días



### Correlimos Falcinelo

*Calidris falcinellus*

|                 |            |
|-----------------|------------|
| N.º normal:     | 4          |
| Tamaño:         | 32 × 23 mm |
| 2.ª puesta:     | No         |
| Incubación:     | —          |
| Pollos en nido: | —          |



### Chorlitejo Grande

*Gharadrius hiaticula*

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| N.º normal:     | 3 - 5         |
| Tamaño:         | 36 × 26 mm    |
| 2.ª puesta:     | Sí. 3.ª rara. |
| Incubación:     | ♂♀ 23-26 días |
| Pollos en nido: | 25 días       |



### Chorlitejo Chico

*Charadrius dubius*

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| N.º normal:     | 3 - 5         |
| Tamaño:         | 30 × 22 mm    |
| 2.ª puesta:     | Rara          |
| Incubación:     | ♂♀ 24-26 días |
| Pollos en nido: | 20 - 24 días  |





**Chorlitejo Patinegro**  
*Charadrius alexandrinus*

N.º normal: 2 - 4  
Tamaño: 33 x 23 mm  
2.ª puesta: Sí  
Incubación: ♂♀ 24 días  
Pollos en nido: 25 días



**Correlimos Menudo**  
*Calidris minuta*

N.º normal: 3 - 4  
Tamaño: 29 x 21 mm  
2.ª puesta: No  
Incubación: —  
Pollos en nido: —



**Correlimos Temminck**  
*Calidris temminckii*

N.º normal: 3 - 4  
Tamaño: 28 x 20 mm  
2.ª puesta: Rara  
Incubación: ♂♀ 21-22 días  
Pollos en nido: 15 - 18 días



**Chorlito Carambolo**  
*Eudromias morinellus*

N.º normal: 3 - 4  
Tamaño: 44 x 29 mm  
2.ª puesta: No  
Incubación: ♂ 21-26 días  
Pollos en nido: 28 días

# Pollos

Aunque no muy acentuadas la pequeñas diferencias que existen entre los pollos nidifugos de las diferentes limícolas nos permitirán su identificación



Correlimos merudo



Chorlitejo ↑  
Patinegro



↑ Correlimos  
Canelo



Chorlitejo →  
Dorado  
chico



↑ Correlimos de  
Temminck



↑ Correlimos  
común




Correlimos  
Gordo



Correlimos  
Tridáctilo



Correlimos ↑  
Falcinelo



Archibebo  
Fino



Correlimos  
Oscuro



Correlimos Zarapitín



Andarrios del Terek

# CLASIFICACIÓN Y NOMENCLATURA

| FAMILIA            | GÉNERO                | ESPECIE                        | CASTELLANO               | CATALÁN                                  | GALLEGO/BABLE                      | VASCUENCE           |
|--------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
|                    |                       | <i>Ch. hiaticula</i>           | Chorlitejo Grande        | Corriol Gros<br>Passarius,<br>Corricabut | Pillara Real                       | Txirritxo Aundi     |
| <b>CHARA-</b>      | <b>Charadrius</b>     | <i>Ch. diuus</i>               | Chorlitejo Chico         | Corriol Petit,                           | Pillara Careta,<br><i>Mazaricu</i> | Txirritxo Txiki     |
| <b>DRIDAS</b>      |                       | <i>Ch. alexandrinus</i>        | Chorlitejo Patinegro     | Corriol<br>Camañegre                     | Pillara Papuda,                    | Txirritxo Ankabeltz |
|                    | <b>Eudromias</b>      | <i>E. morinellus</i>           | Chorlito Carambollo      | Corriol Pit-roig                         |                                    | Ipar Txirri         |
|                    | <b>Pluvialis</b>      | <i>P. dominica</i>             | Chorlito Dorado<br>Chico | Daurada Petita                           |                                    | Urre Txirri         |
|                    |                       | <i>C. falcinellus</i>          | Correlimos Falcinelo     | Territ Becadell                          |                                    | Txirri Itar-moko    |
|                    |                       | <i>C. subruficollis</i>        | Correlimos Canelo        | Territ Rogenc                            |                                    |                     |
|                    |                       | <i>C. maritima</i>             | Correlimos Oscuro        | Territ Fosc                              | Pilro Cincento                     | Txirri Ilum         |
|                    |                       | <i>C. canutus</i>              | Correlimos Gordo         | Territ Gros                              | Pilro Groso                        | Txirri Lodi         |
| <b>Calidris</b>    |                       | <i>C. alpina</i>               | Correlimos Común         | Territ Variant                           | Pilro Curlibico                    | Txirri              |
|                    |                       | <i>C. alba</i>                 | Correlimos Tridáctilo    | Territ Tresdits                          | Pilro Bulebule                     | Txirri Iruatz       |
| <b>ESCOLO-</b>     | <b>C. ferruginea</b>  | Correlimos Zarapitín           | Territ Bec-llarg         | Pilro Cubranco                           |                                    | Txirri Kurlinka     |
| <b>PÁCIDAS</b>     | <b>C. minuta</b>      | Correlimos Menudo              | Terretitona              | Pilriño Patimouro                        |                                    | Txirri Kulixka      |
|                    | <b>C. temminckii</b>  | Correlimos de<br>Temminck      | Terretita                | Pilriño Patimarelo                       |                                    | Temminck Txirri     |
| <b>Tringa</b>      | <b>T. melanoleuca</b> | Archibebe Patigualdo<br>Grande | Gamba Gropa<br>Grossa    | Bilurico Patimarelo<br>Grande            |                                    |                     |
|                    | <b>T. flavipes</b>    | Archibebe Patigualdo<br>Chico  | Gamba Gropa<br>Petita    | Bilurico Patimarelo<br>Pequeno           |                                    |                     |
|                    | <b>T. stagnatilis</b> | Archibebe Fino                 | Siseta                   |                                          |                                    | Zingira Zaldun      |
| <b>Limnodromus</b> | <b>L. scolopaceus</b> | Agujeta Escolopácea            | Tetotlet Bec-llarg       |                                          |                                    |                     |
| <b>Xenus</b>       | <b>X. cinereus</b>    | Andarríos del Terek            | Siseta Cendrosa          |                                          |                                    | Terek Zalduntxa     |
| <b>Bartramia</b>   | <b>B. longicauda</b>  | Correlimos de<br>Bartram       | Territ Guallarg          |                                          |                                    |                     |

# ***Cuadernos de Campo del Dr. Félix Rodríguez de la Fuente***

**Cada miércoles en su quiosco o librería**

*Títulos de la colección:*

- |                                          |                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 - El Lince y el Gato Montés            | 31 - Las Cigüeñas                     |
| 2 - Grandes Águilas                      | 32 - Peces de Mar                     |
| 3 - El Lobo                              | 33 - Palomas y Tórtolas               |
| 4 - Rapaces Nocturnas                    | 34 - Aves Marinas                     |
| 5 - El Jabalí                            | 35 - Abubilla, Carraca<br>y Abejaruco |
| 6 - Pájaros Carpinteros                  | 36 - Rapaces del Bosque               |
| 7 - La Cabra Montés y el<br>Muflón       | 37 - Aves de la Costa                 |
| 8 - Pájaros del Bosque (I)               | 38 - Pájaros del Campo<br>Abierto     |
| 9 - Víboras y Culebras                   | 39 - La Gineta y el Meloncillo        |
| 10 - Los Buitres                         | 40 - Somormujos y Zampullines         |
| 11 - El Zorro                            | 41 - Pájaros del Bosque (III)         |
| 12 - Aves de la Estepa                   | 42 - Anfibios                         |
| 13 - Pequeños Carnívoros                 | 43 - Perdices y Codornices            |
| 14 - Peces de Río                        | 44 - Pájaros Cantores                 |
| 15 - Pájaros de Medio Urbano             | 45 - Milanos y Aguiluchos             |
| 16 - El Quebrantahuesos y el<br>Alimoche | 46 - Aves Viajeras (II)               |
| 17 - Los Córvidos                        | 47 - Pájaros de Montaña               |
| 18 - Peces de Lagos y<br>Marismas        | 48 - Cisnes y Gansos                  |
| 19 - Halcones y Cernícalos               | 49 - Pequeños Carnívoros (II)         |
| 20 - Lagartos y Lagartijas               | 51 - Los Cérvidos                     |
| 21 - Las Garzas                          | 52 - Pájaros de los Sotos             |
| 22 - Pequeñas Águilas                    | 53 - Invertebrados Marinos            |
| 23 - Las Grullas                         | 54 - Gallos de Monte                  |
| 24 - Liebre y Conejo                     |                                       |
| 25 - Los Patos                           |                                       |
| 26 - Pájaros del Bosque (II)             |                                       |
| 27 - Pájaros de la Marisma               |                                       |
| 28 - Aves Viajeras (I)                   |                                       |
| 29 - Pájaros de Río                      |                                       |
| 30 - Aves Marinas Coloniales             |                                       |

***Reserve su ejemplar***



EDITORIAL MARIN S.A.